

# 予防接種の間違いを防ぐためのポイント

## 各ステップで確認事項を明確に！




※各ステップでの確認のポイントは「予防接種における間違いを防ぐために(2019年改訂版)」をご覧ください

## こんな時はとくに注意！

例えば・・・

兄(3歳、日本脳炎ワクチン)と  
弟(1歳、MRワクチン)が  
同時に予防接種を受けにきた



**兄弟・姉妹の同時受診時は  
接種するワクチンを  
間違えないように！**



**ワクチンを準備する時  
ワクチンの種類や  
有効期限を確認！**

## ワクチンの取り扱いに注意！

### 掲示板

#### 予防接種外来

水曜日の午前中  
(要予約)



ワクチンは一度に  
準備せず接種直前に！

## 接種量・接種方法に注意！

多くのワクチンは「1回に0.5mLを皮下接種」ですが  
以下は接種量や接種方法を**間違いやすい**ワクチンです

**DT2期** : 1回に**0.1mL**を皮下接種

**B型肝炎** : **10歳未満**は1回に**0.25mL**を皮下接種

**日本脳炎1期** : **3歳未満**は1回に**0.25mL**を皮下接種

**インフルエンザ** : **3歳未満**は1回に**0.25mL**を皮下接種

**BCG** : 管針を用いて**2箇所**に圧刺（経皮接種）

## 接種器具の取り扱いに注意！



接種後は直ちに  
専用の廃棄容器に！