

経皮的エタノール注入療法を受ける患者様へ

経皮的エタノール注入療法(PEIT)パス【02011-00】

患者氏名： _____ 様 入院病棟： _____ 病棟 主治医： _____ 受け持ち看護師： _____ No1

日付	/	/	/	/	
入院日数	1日目	2日目		3日目	4日目
イベント	入院日	治療前	治療後	治療後1日目	退院
目標 毎日看護師と評価します	<input type="checkbox"/> 治療計画がわかる	<input type="checkbox"/> 治療計画がわかる <input type="checkbox"/> 予定通り術前検査・処置が受けられる	<input type="checkbox"/> 2時間の安静が守られる <input type="checkbox"/> 出血や腹痛などの合併症が起こらない	<input type="checkbox"/> 出血や腹痛などの合併症が起こらない	<input type="checkbox"/> 退院後の生活の注意点が理解できる
活動範囲			<input type="checkbox"/> 2時間の安静後トイレ歩行可 途中行きたくなくなった場合ナースコールしてください		
食事 飲水		<input type="checkbox"/> 朝食以降は食べたり飲んだりしないでください	<input type="checkbox"/> 2時間安静後、夕食は食べられます <input type="checkbox"/> 水分は飲んででもかまいません		
清潔			<input type="checkbox"/> シャワー浴は不可	<input type="checkbox"/> 絆創膏を剥がした後、創部の異常がなければシャワー浴が可能です	
排泄					
ケア		<input type="checkbox"/> 午後 時 分 <input type="checkbox"/> 場所：病棟処置室で行います <input type="checkbox"/> 所要時間：約30分 <input type="checkbox"/> 手順 1. 排尿を済ませてください 2. 15分前より点滴を開始します 3. リラックスできるように少し眠くなる注射をします 4. 検査時はお腹を出して仰向けに寝て、右腕を頭の方に上げます 5. エコーで肝臓の位置を確認します 6. エコーを当てながら薬を注入します 7. 終了後はベッドに横になったまま帰室 8. 点滴は終了次第抜去します	<input type="checkbox"/> 穿刺した部位にアイスノンを当てて、2時間右向きのまま安静にしてください。 2時間後に治療後のガーゼを見ます	<input type="checkbox"/> 絆創膏を剥がします	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">退院基準：発熱や頭痛などの副作用症状がない</div>
検査		<input type="checkbox"/> 医師の指示があれば採血があります		<input type="checkbox"/> 採血があります 	
薬剤	<input type="checkbox"/> 医師の指示で抗凝固剤が中止になっている方、血圧、糖尿病、心臓病の薬を飲んでいる方は申し出てください			<input type="checkbox"/> 抗凝固剤を内服していた方は、再開の日時をお知らせします	
説明 指導	<input type="checkbox"/> 同意書を提出してください <input type="checkbox"/> 診断書が必要な方は申し出てください			<input type="checkbox"/> パンフレットを用いて、退院後の生活の注意点について、説明があります	<input type="checkbox"/> 精算準備ができましたら、医事課担当者からお伝えしますので、お部屋で待っててください。支払いは1階の自動支払機か2番窓口でお願いします

注) 現時点で考えられる予定であり変更になることがあります