









レミケード点滴療法を受けられる患者様へ

消化器内科レミケードパス【02015-00】

患者氏名： _____ 様 入院病棟： _____ 病棟 主治医： _____ 受け持ち看護師： _____ No1/1

日付	/			/
入院日数	1 日目			2 日目
イベント	入院日：レミケード投与前	入院日：レミケード投与中	入院日：レミケード投与後	退院
目標 毎日看護師と評価します	<ul style="list-style-type: none"> 治療の流れが理解できる 	<ul style="list-style-type: none"> 副作用出現時、看護師に知らせることができる 血圧の低下がない 	<ul style="list-style-type: none"> 副作用出現時、看護師に知らせることができる 	<ul style="list-style-type: none"> 退院後の注意点が理解できる 体調に変化がみられない
内服 注射	<ul style="list-style-type: none"> 点滴前に抗アレルギー薬を使用する場合があります 持参薬の確認を行います 	<ul style="list-style-type: none"> 医師が個別に指示した薬剤量を準備し、点滴します  		<ul style="list-style-type: none"> 退院時処方がある場合はお渡しします
検査	<ul style="list-style-type: none"> 身長、体重を測定します  治療前に採血があります ★採血の結果で薬剤投与の可否を医師が決定します 	<ul style="list-style-type: none"> 開始 15 分後、終了時に血圧・脈拍・体温を測定します 皮膚に異常がないか確認させていただきます  	<ul style="list-style-type: none"> 血圧・脈拍・体温を測定します 皮膚に異常がないか確認させていただきます 	<ul style="list-style-type: none"> 血圧・脈拍・体温を測定します 副作用の徴候が認められる場合は、医師に報告し、診察させていただきます
治療 処置	<ul style="list-style-type: none"> 採血と一緒に、点滴の針を刺します。 治療前に血圧・脈拍・体温を測定します  	<ul style="list-style-type: none"> 点滴中は輸液ポンプを使用します アラーム音が鳴りましたら、ナースコールを押して看護師にお知らせ下さい 副作用の徴候が認められる場合は、点滴を中止して血圧・脈拍・体温を測定し、皮膚状態を見せていただきます 副作用の徴候が認められる場合は、医師に報告し、診察させていただきます 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴が終了したら針を抜きます  	
食事 飲水	<ul style="list-style-type: none"> ★食事は低残渣食です。 個別でパン・乳製品抜きとなる場合がありますので、確認させていただきます 		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 退院基準：アレルギー反応など副作用を認めない 投与前と比べてバイタルサインの異常がない </div>	
清潔	<ul style="list-style-type: none"> 特に制限はありません 		<ul style="list-style-type: none"> 点滴終了後、シャワー浴が可能です  	
排泄	<ul style="list-style-type: none"> 特に制限はありません 			
安静 活動	<ul style="list-style-type: none"> 特に制限はありません 	<ul style="list-style-type: none"> 点滴中、トイレ以外はできるだけ横になって安静にお過ごし下さい。 		<ul style="list-style-type: none"> 午前退院となります
説明 指導	<ul style="list-style-type: none"> 同意書を提出して下さい ※ご不明な点や心配なことがありましたら、医師または看護師にお声がけください  	<ul style="list-style-type: none"> 薬剤投与確定の指示を確認後、治療を開始します 点滴治療中、低血圧・咽頭違和感・頭痛・発熱・皮疹・発赤等の症状が出現した場合は、直ちにナースコールを押して看護師にお知らせ下さい  	<ul style="list-style-type: none"> ★次回予約票、診察券をお渡しします。 ★退院オリエンテーションを行います。 レミケード投与後は抵抗力が低下し、数日経過してから症状が出現する場合がありますため、次のことに気をつけて生活して下さい。 規則正しい生活を送る ・人混みを避ける ・手洗い、うがいを行う 咳や痰が続いたら、無理せず速やかに主治医に相談して下さい。 投与後 3 日目以降に次のような症状（遅発性過敏症）が出現しましたら、速やかに主治医に連絡して下さい。 …発疹、じんま疹、手・顔面のむくみ、発熱、頭痛など 	

注) 現時点で考えられる予定であり変更になることがあります

市立札幌病院 消化器内科・6階東病棟 2017年2月、2023年9月、2024年3月改訂