

患者氏名： \_\_\_\_\_ 様      入院病棟： \_\_\_\_\_ 病棟      主治医： \_\_\_\_\_      受け持ち看護師： \_\_\_\_\_      No1/1

日付	/		/		/	
入院日数	1日目		2日目		3日目	
イベント	入院日		2日目：検査当日・検査前		2日目：検査当日・検査後	
目標	検査について理解する		検査の合併症が出現しない			
毎日看護師と評価します						
内服 注射	・（ ）手から点滴をします 20時から点滴開始です 		・（ ）手に点滴(補液)をします   ・希望時、緊張を和らげる薬（安定剤）を飲みます。 ・薬の中止は（ ）です ・薬の追加は（ ）です ・インスリンの注射をしている方は（ ）です			
検査	・便検査を行います。 外来でキットをもらい、自宅で採って持参してください		・車椅子に乗って検査・治療室へ行きます。(肘の場合はストレッチャー（寝たまま移動できる台車）で移動することになります) 		・朝、採血をします 	
治療 処置	・必要時、手首や肘の毛を剃ります		・カテーテルを刺す部位は、（ ）手首・肘になります ・1時間くらい前に痛み止めのテープを貼ります。 ・着替え、胸や足に検査で使用する心電図の電極を貼ります。 ・眼鏡・入れ歯・時計・指輪などの金属類は外して、検査・治療へ行きます。		・終了後は（ ）手首・肘を圧迫固定し、シーネ（板）をあてます。検査・治療で動脈を刺しているため、動かすと出血してしまう危険があります。手首や肘を曲げないようにしてください ・手首の場合は2時間後に医師が、肘の場合は3時間で看護師が固定を外します ・止血が十分でない場合は、圧迫時間が延長されることがあります	
					・日中で検査部位の消毒をします <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">                         退院基準：                          ・検査の穿刺部に問題がない                          ・胸部症状がない                     </div>	
食事 飲水			・昼食は軽食(パン食)、夕食は食べやすいよう、おにぎり食になっています ・検査の順番により食事時間をずらすことがあります ・帰宅後、吐き気などがなければ食事・飲水は可能です			
清潔	・許可された方はシャワー浴をしてください 				検査部位が問題なければ、検査24時間後からシャワー浴ができます 	
排泄			・トイレまでの歩行が可能です			
安静 活動			・検査・治療後は、トイレ・洗面のみの歩行です。翌朝まで、病棟内でお過ごしください 		・安静度は通常通りになりますが、検査結果によって変更になる場合があります	
説明 指導						

注) 現時点で考えられる予定であり変更になることがあります