

# 経カテーテル大動脈弁置換術を受ける患者様へ

日付	/ ~ /	/	/	/ ~ /	/ ~ /	/
入院日数	入院日1～3日目	4日目	5日目	6～8日目	9～11日目	12日目
イベント	手術3日～1日前	手術当日	手術後1日目	手術後2～4日目	手術後5～7日目	術後8日目 退院
目標 毎日看護師と評価します	○治療の必要性について理解できる ○疾患について理解できる ○治療への不安がない	○血圧、脈拍が安定している ○合併症の症状がない ○検査結果に問題がない	○血圧、脈拍が安定している ○合併症の症状がない ○検査結果に問題がない	○血圧、脈拍が安定している ○合併症の症状がない ○検査結果に問題がない	○血圧、脈拍が安定している ○合併症の症状がない ○生活上の注意点について理解できる ○検査結果に問題がない	○血圧、脈拍が安定している ○合併症の症状がない ○感染の徴候がない ○退院後の自宅での生活の注意点を理解し退院できる
内服 注射	中止薬がある場合があります（ ） 手術前日（ / ）の20時から点滴を行う場合があります	朝の薬は6時に少量の水で内服します 点滴をしながら手術に行きます 抗生剤の点滴があります	抗生剤の点滴があります 抗血小板薬の内服が始まります	術後3日目（ / ）まで抗生剤点滴があります		
検査	血液検査があります	手術後に血液・レントゲン検査があります	血液・レントゲン検査があります	術後4日目（ / ）血液・レントゲン検査があります	術後5日目（ / ）心エコー・CT検査があります レントゲン削除されました	
治療 処置	退院まで心電図モニターを装着します 手術前日に足の付け根の毛をそります 首の管を入れます	長病衣に着替えます ストレッチャーで手術室に行きます 手術後は4階西病棟で経過観察を行います 手術後（ ）時間後に血が止まっているか確認します	首の点滴の管を抜き、手に点滴の針を入れます 4階東病棟に戻ります 毎日体重測定をします （ ）kg	体重 /（ ）kg /（ ）kg /（ ）kg	術後5日目（ / ）に抜糸をします 体重 /（ ）kg /（ ）kg /（ ）kg	体重 /（ ）kg
食事 飲水	（ / ）時から食事はできません ストロー付きコップを用意しておいて下さい	食事はできません （ ）時から水も飲めません	医師の許可があれば朝から食事を開始します 1日（ ）mlまでの飲水制限があります			
清潔	入浴できます		入浴はできません タオルでからだを拭きます		術後5日目（ / ）シャワー浴できます	
排泄	手術前に便が出るように処置をします T字帯またはテープ式オムツを用意して下さい	手術室で尿の管を挿入します	尿の管を抜きます 尿量を測定するため、尿をためてください		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>&lt;退院基準&gt;                      血圧・脈拍が安定している                      合併症の症状がない                      発熱など感染の徴候がない                      退院後の日常生活の分からないことを聞くことができる</p> </div>	
安静 活動	特に制限はありません	手術後ベッド上安静です	歩行できます リハビリテーションを開始します			
説明 指導	治療について医師から説明があります 麻酔科医師の診察があります 手術室看護師が訪問します			食事内容や生活習慣について振り返りを行います	退院後の生活の注意点について説明します	栄養指導があります 退院後の外来受診について説明します

注)現時点で考えられる予定であり変更になることがあります