

患者氏名： _____ 様 入院病棟： _____ 病棟 主治医： _____ 受け持ち看護師： _____ No1/1

日付	/	/	/ ~ /	/ ~ /
入院日数	1日目		2日目	
イベント	入院日		3～5日目	
目標	抗がん剤治療当日		点滴治療	
内服注射	治療～退院日			
<p>目標 毎日看護師と評価します</p> <ul style="list-style-type: none"> ・検査データに異常がない ・38度以上の発熱がない ・日常生活動作ができる ・治療について理解出来る 	<ul style="list-style-type: none"> ・体温、血圧、脈拍、酸素の濃度に異常がない ・不安なく治療に望むことができる ・副作用について理解出来る ・日常生活動作ができる 	<ul style="list-style-type: none"> ・体温、血圧、脈拍、酸素の濃度に異常がない ・副作用症状がコントロールできる ・日常生活動作ができる 	<ul style="list-style-type: none"> ・38度以上の発熱がない ・血小板の著しい低下がない ・日常生活動作ができる 	
<p>内服注射</p> <ul style="list-style-type: none"> ・尿のアルカリ化を防ぐ薬（メイロン）の入った点滴を開始します。 	<ul style="list-style-type: none"> ・利尿剤注射（6時と18時頃） ・吐き気止めの点滴 ・凶ソトレキセート（3～4時間）点滴 ・壺分の点滴 24時間 	<ul style="list-style-type: none"> ・尿のアルカリ化を防ぐ薬の入った水分の点滴を24時間毎に交換します ・利尿剤注射（6時と18時頃） ・ロイコボリンの注射（メソトレキセートの副作用予防） (時・ 時・ 時) 	<ul style="list-style-type: none"> ・検査の結果によりロイコボリン（メソトレキセートの副作用予防）の注射がある場合もあります 	
<p>検査</p> <ul style="list-style-type: none"> ・採血、尿検査、レントゲン、心電図の検査があります 	<ul style="list-style-type: none"> ・尿のPHを測定するため1日に3回、6時、14時、21時に尿検査をします/時間になったら尿カップに採尿してください ・毎日、朝1回体重をはかってください ・3日目、4日目、5日目、7日目に採血があります・変更がある場合は、その都度お伝えします 		<ul style="list-style-type: none"> ・医師の指示により採血があります 	
<p>治療処置</p> <ul style="list-style-type: none"> ・点滴の管を入れる処置をすることがあります 			<p>退院基準：体調に問題無く退院出来る</p>	
<p>食事飲水</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特に制限はありません ・医師の指示により、制限のあるときはお伝えします 	<ul style="list-style-type: none"> ・抗がん剤治療の日は水分を1L程度とってください ・吐き気があるときや食欲がない時はお知らせください 	<ul style="list-style-type: none"> ・特に制限はありません ・吐き気の症状や食欲が無い時はお知らせください 		
<p>清潔</p> <ul style="list-style-type: none"> ・点滴の管を入れた後、当日はシャワー浴できません 	<ul style="list-style-type: none"> ・5日間24時間点滴があります ・点滴を止めてシャワーに入ることはできますが、点滴の管は保護が必要です ・管の入っている方はシャワーの時間を看護師と相談おねがいします 		<ul style="list-style-type: none"> ・制限はありません ・点滴の管が入っている場合は保護してシャワー浴する必要があります ・ご自身で保護が難しい場合、17時までにおねがいします 	
<p>排泄</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入院中は朝6時から翌朝6時まで24時間ごと排泄回数をカウントしてください 	<ul style="list-style-type: none"> ・抗がん剤投与後、48時間は尿に抗がん剤が出るため、トイレは座って排泄してください ・トイレ後は蓋を閉めて2回流してください ・副作用で下痢になることがあるので、症状が起きた時はすぐに看護師に教えてください 			
<p>安静活動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・制限はありません 	<ul style="list-style-type: none"> ・点滴中、必要時以外は病棟内で過ごしてください 		<ul style="list-style-type: none"> ・特に制限はありません 	
<p>説明指導</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師、看護師から説明があります ・薬剤師から化学療法のオリエンテーションがあります 	<ul style="list-style-type: none"> ・以下の場合はすぐにナースコールで知らせてください。 ・点滴刺入部の痛み、赤み、腫れがあるとき ・吐き気などの副作用症状が出現したとき ・抗がん剤投与後48時間までは尿や便に抗がん剤が排泄されます/そのため、衣類やシーツなどを汚染した場合は看護師までお知らせください 			

注) 現時点で考えられる予定であり変更になることがあります