

療養判定アプリ（こくちまる）について

電話による陽性告知

- ・ 検査結果等簡易な内容
- ・ SMS送付の可否確認



こびまる™ 2020
Sapporo Medical University

※隔離希望、ハイリスクは療養判定へ

SMS送付→本人が「こくちまる」入力

- ・ 療養意向、リスク、健康状態等
- ・ パルス、療養セットの希望も確認

2月本格稼働
約13,000人の
療養判定

パルスオキシメーター、
自宅療養セットを配送

再度電話で
詳細聞き取り

療養判定

入院



※健康状態に問題なし

パルスオキシメーター、
自宅療養セットを配送

**必要な医療へのアクセスを
しっかりと確保**


健康観察アプリ「こびまる」

自宅療養



宿泊療養

入院待機
ステーション



ワクチン追加接種（3回目接種）の前倒し対応について

2022/02/10
保) ワクチン接種担当部

札幌市における追加接種前倒しの実施

	2回目接種からの間隔					
	国からの通知			札幌市の対応		
	従前	前倒し後		接種間隔	接種券送付時期	
① 医療従事者等	6カ月	6カ月		6カ月	送付済み	
② ①以外の高齢者 (65歳以上)	2月 から	2月 まで	3月 から	2月中旬 から		
	7カ月	7カ月	6カ月	6カ月		
③ ①②以外の方 (18歳以上64歳以下)	8カ月	2月 まで	3月 から	2月中旬 から	2月下旬 から	
				7カ月	6カ月	2月中旬に8カ月を迎える方
		予約枠に 空きが あれば	6カ月	初回接種時の優先接種 対象者(注)が該当		2月中旬に7カ月を迎える方
					2月中旬に6カ月を迎える方	2/14 2/18
					2月中旬に6カ月を迎える方	2/25 2/28 (以降、毎週金曜日に発送)
					(注) 基礎疾患を有する方、エッセンシャルワーカーの方	

追加接種会場の稼働状況

■ 接種時期の前倒しに伴い、札幌サンプラザ会場の稼働開始日を3月⇒2月に前倒し

【札幌市内にて追加接種を行う会場】

集団接種	札幌サンプラザ（新規）	2月22日（火）開設	2月：最大500回程度/日、3月以降：最大1,500回程度/日
		各区民センター	実施中
	札幌市医師会館	実施中	200～400回/日
	個別接種（各医療機関）	実施中	最大12,000回/日程度

■ 医療機関・集団接種会場とも、お手元に接種券が届いた方から順次予約が可能

新型コロナウイルスワクチン追加接種（3回目接種）について

2022/02/10
保) ワクチン接種担当部

オミクロン株への効果

※ 第29回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料（2022/01/26）より抜粋

■ 発症予防効果

デルタ株に対する効果と比較すると低いが一定程度の発症予防効果がある。
ただし、発症予防効果は時間経過とともに低下する。

- 2回目接種後の発症予防効果
 - ・ 2～4週間後：対オミクロン株…65～70% / 対デルタ株…約90%
 - ・ 20週後：対オミクロン株…約10% / 対デルタ株…約65%

■ 追加接種による発症予防効果の回復

デルタ株に対する回復と比較すると低いが追加接種により発症予防効果は回復する。

- 3回目接種後の発症予防効果
 - ・ 2～4週間後：対オミクロン株…65～75% / 対デルタ株…約90%

■ 入院予防効果

ワクチン接種には入院予防効果があるが時間経過により低下する。しかし、追加接種により入院予防効果は回復する。

- オミクロン株に対する入院予防効果
 - ・ 2回目接種後：2～24週…64% ➔ 25週以降…44%
 - ・ 追加接種後2週以降…89%

交接種について

※ 第27回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料（2021/12/16）より抜粋

■ 副反応

アメリカの研究によると、交接種による副反応は初回接種において報告された副反応と同程度で、交接種と同種接種で差がなかったと報告されている。

■ 安全性

イギリスの研究によると、交接種による副反応は安全性の面で許容されると報告されている。諸外国でも、初回接種で使用されたワクチンの種類にかかわらず、追加接種でmRNAワクチンを推奨する国が多く存在（カナダ、イギリス、フランス、ドイツなど）。

※ 追加接種にかかる武田/モデルナ社ワクチンについて

武田/モデルナ社のワクチンにおける3回目接種は、1・2回目接種で用いた量の半量（100 μ g➔50 μ g）。

接種後の副反応等は初回接種時と同程度であり、アメリカ疾病予防管理センターのデータによると、追加接種後1週間以内に見られた様々な症状（局所及び全身性の反応や、健康状態、日常生活や勤務への支障等）は、2回目接種後と比較してその発現割合が低いとの報告もある。

経口治療薬の処方体制の強化

令和4年2月10日
保健福祉局保健所

(1) ラゲブリオ (モルヌピラビル)

※年度内に国内で**60万回分**の供給が予定されている。

・重点医療機関

入院患者等に院内処方

・発熱外来など

診察を行い、「対応薬局」にて処方。順次、拡大予定

・対応薬局

経口治療薬を扱う薬局の更なる拡大を図り、供給体制を強化した。

市内**243**か所に在庫配置済

登録数

37/39

対応可能数

205



○内の数字：在庫配置済の薬局の数

(2) パキロビッド (ニルマトレルビル)

- ・ **2月10日、厚生労働省の専門家部会で承認の可否を審議**との発表があり、**2月中旬**に実用化の見込み
- ・ 薬事承認後、ファイザー社から日本政府に**200万回分を供給**することで合意
- ・ 臨床試験において、**入院や死亡のリスクが9割近く低下**。オミクロン株にも有効
- ・ ラゲブリオの処方体制を活用可能



➡ 今後とも、経口治療薬を積極的に活用していく。

保育士向け抗原定性検査無料検査所の開設について

1 目的等

新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者等に求めている自宅などでの7日間の待機期間について、社会機能の維持に欠かせない「エッセンシャルワーカー」については、抗原定性検査キットによる検査で陰性だった場合は、5日目から待機解除を認めるとの方針が政府から示されている。

濃厚接触者等の指定により、出勤不能となる保育士等が増加しており、社会機能の維持に大きな影響を及ぼしていることから、札幌市においても早期の職場復帰を支援し、休園中の保育園の1日でも早い再開を推し進める必要がある。

現在、市中において検査キットの入手が困難となっている状況から、以下の通り、札幌市において今週から保育士向け抗原定性検査所を開設したところ。

2 開設期間（予定）

令和4年2月7日(月)～2月28日(月)

※ 感染状況や抗原検査キットの流通状況等により、開設期間は変動の可能性あり

3 検査体制

- (1) 場 所 非公表（本事業の性質上、ご配慮をお願いします）
- (2) 開所時間 月～日曜日 午前9時～午後5時30分
- (3) 検 査 枠 49件／日

4 対象施設

市内に所在する認可保育所、認定こども園、特定地域型保育事業所及び札幌市一時預かり事業を実施している幼稚園

5 その他

- ・検査の実施は、市内の薬局運営会社に委託
- ・検査会場は、市内各地域に存在する保育施設従業員の利便性を考慮し、交通の便を考慮した場所に設置
- ・2/7～9の間で約40人（80件）の検査利用あり