I 大氣環境

大気環境に対する札幌市の取組と概況

1 大気汚染物質濃度の測定

大気汚染物質等の濃度を監視し、環境基準の適合性を確認しています。また、測定したデータは「札幌市大気環境観測データ速報システム」を通してリアルタイムで市民に公開しています (<http://air.city.sapporo.jp/>)。

測定項目	測定場所	測定頻度
二酸化硫黄 (SO ₂) 一酸化炭素 (CO) 浮遊粒子状物質 (SPM) 二酸化窒素 (NO ₂) 光化学オキシダント (Ox) 微小粒子状物質 (PM2.5) 炭化水素	大気汚染測定局 市内 16 か所 (一般局 11 か所) (自排局 5 か所)	連続測定 (365 日、24 時間)

2 有害大気汚染物質濃度の測定

有害大気汚染物質等の濃度を監視し、環境基準等の適合性を確認しています。

測定項目	測定場所	測定頻度
ベンゼン トリクロロエチレン テトラクロロエチレン ジクロロメタン アクリロニトリル 塩化ビニルモノマー 水銀及びその化合物 ニッケル化合物 クロロホルム 1,2-ジクロロエタン 1,3-ブタジエン	ヒ素及びその化合物 マンガン及び無機マンガン化合物 塩化メチル アセトアルデヒド トルエン ホルムアルデヒド 酸化エチレン ベリリウム及びその化合物 ベンゾ [a] ピレン クロム及びその化合物	大気汚染測定局 市内 4 か所 (一般局 2 か所) (自排局 2 か所) 年 12 回 (毎月 1 回)

3 微小粒子状物質（PM2.5）の成分分析

国ガイドラインに基づいた PM2.5 の成分分析を行い、分析結果は生成メカニズムの解明等に利用されています。

測定項目	測定場所	測定頻度
イオン成分 無機元素成分 炭素成分 特殊成分	大気汚染測定局 市内 1 か所 (センター局)	年 4 回 (季節ごと)

4 一般環境中アスベスト濃度の測定

一般環境中のアスベスト濃度が、全国的な濃度と同等であるか確認しています。

測定項目	測定場所	測定頻度
大気中のアスベスト濃度 (総繊維数濃度)	大気汚染測定局 市内 10 か所	年 1 回

5 酸性雨の調査

降雨水の酸性度やイオン濃度を監視しています。

測定項目	測定場所	測定頻度
pH イオン濃度	衛生研究所 市内 1 か所	年 3 回

<大気環境の概況>

- 大気汚染物質濃度は、光化学オキシダントを除き、環境基準を満たしている。
(光化学オキシダントは、全国の 99%以上で環境基準を超過している)
- 大気汚染物質濃度は、HP 上でリアルタイムに市民に公表している。
- 有害大気汚染物質濃度は、全ての項目で環境基準や指針値を満たしている。
- 一般環境中のアスベスト濃度は、全国的な濃度（1 本/L 未満）と同等である。

1 環境基準等

(1) 環境基準・指針値

表 1-1-1 環境基準（二酸化硫黄等）

物質名	環境基準	評価方法	適合状況（令和3年度）※1	
			一般局	自排局
二酸化硫黄	1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。	<短期的評価> 1時間値の1日平均値又は各1時間値（一酸化炭素については1時間値の8時間平均値）を環境基準と比較して評価を行う。	5/5 (短期的評価) 5/5 (長期的評価)	—
一酸化炭素	1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。	<長期的評価> 日平均値の年間2%除外値(1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高いほうから数えて2%の範囲にある測定値(365日分の測定値がある場合は7日分の測定値)を除外した後の最高値)を環境基準と比較して評価を行う。ただし、2日連続して日平均値が環境基準を超えた場合は環境基準未達成となる。年間の環境基準達成の判定は、長期的評価にて行う。	—	1/1 (短期的評価) 1/1 (長期的評価)
浮遊粒子状物質	1時間値の1日平均値が0.10mg/m ³ 以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m ³ 以下であること。	長期基準に関する評価は、測定結果の1年平均値を長期基準(1年平均値)と比較する。短期基準に関する評価は測定結果の1日平均値のうち年間98%値を代表値として選択して、これを短期基準(1日平均値)と比較する。長期基準に関する評価及び短期基準に関する評価の両方を達成した場合環境基準達成となる。	3/3 (短期的評価) 3/3 (長期的評価)	5/5 (短期的評価) 5/5 (長期的評価)
微小粒子状物質	1年平均値が15μg/m ³ 以下であり、かつ、1日平均値が35μg/m ³ 以下であること。	長期基準に関する評価は、測定結果の1年平均値を長期基準(1年平均値)と比較する。短期基準に関する評価は測定結果の1日平均値のうち年間98%値を代表値として選択して、これを短期基準(1日平均値)と比較する。長期基準に関する評価及び短期基準に関する評価の両方を達成した場合環境基準達成となる。	5/5 (長期基準に関する評価) 5/5 (短期基準に関する評価)	5/5 (長期基準に関する評価) 5/5 (短期基準に関する評価)
二酸化窒素	1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。	<長期的評価> 日平均値の98%値で評価を行う。	3/3 (長期的評価)	5/5 (長期的評価)
光化学オキシダント	1時間値が0.06ppm以下であること。	<短期的評価> 測定を行った日についての各1時間値を環境基準と比較して評価を行う。	0/11※2 (短期的評価)	—

※1 分子：環境基準適合測定局数 分母：測定局数

※2 全ての局で環境基準不適合となったが、緊急時の注意報の発令基準である0.12ppmを超過した測定局はなかった。

表 1-1-2 環境基準（有害大気汚染物質）

物質名	環境基準
ベンゼン	1年平均値が 0.003 mg/m ³ 以下であること
トリクロロエチレン	1年平均値が 0.13 mg/m ³ 以下であること
テトラクロロエチレン	1年平均値が 0.2 mg/m ³ 以下であること
ジクロロメタン	1年平均値が 0.15 mg/m ³ 以下であること

表 1-1-3 指針値（環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値）

物質名	指針値
アクリロニトリル	1年平均値が $2\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること
アセトアルデヒド	1年平均値が $120\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること
塩化ビニルモノマー	1年平均値が $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること
塩化メチル	1年平均値が $94\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること
クロロホルム	1年平均値が $18\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること
1,2-ジクロロエタン	1年平均値が $1.6\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること
水銀及びその化合物	1年平均値が $40\text{ngHg}/\text{m}^3$ 以下であること
ニッケル化合物	1年平均値が $25\text{ngNi}/\text{m}^3$ 以下であること
ヒ素及びその化合物	1年平均値が $6\text{ngAs}/\text{m}^3$ 以下であること
1,3-ブタジエン	1年平均値が $2.5\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること
マンガン及びその化合物	1年平均値が $140\text{ngMn}/\text{m}^3$ 以下であること

(2) 硫黄酸化物の排出基準

次の式により算出した硫黄酸化物の量 q [m^3/h] (0°C 、 1atm^* の状態)

$$q = K \times 10^{-3} \times He^2$$

(注) K : 札幌では 4.0、山間部等一部の地域（図 1-1-1 中 ）では 17.5

He : 有効煙突高さ[m] ※ 1atm : 標準大気圧 (1013.25 ヘクトパスカル)

(3) 硫黄分に係る燃料規制基準

表 1-1-4 硫黄分に係る燃料規制基準（大気汚染防止法及び札幌市生活環境の確保に関する条例）

対象施設	規制期間	硫黄含有率
A地域に設置されている法対象施設	10月1日から翌年3月31日まで	0.5%以下
	4月1日から9月30日まで	0.8%以下
A地域に設置されている条例対象施設	通年	0.8%以下
A地域以外の札幌市域内に設置されている法・条例対象施設		

(4) 窒素酸化物の排出基準

窒素酸化物の濃度は次の式により算出する。

$$C = \frac{21 - O_n}{21 - O_s} \times C_s$$

C: 窒素酸化物の濃度[ppm] O_n: 表中の O_n 値に掲げる値[%]

O_s: 排出ガス中の酸素の濃度[%] (20%を超える場合は 20%とする)

C_s: 窒素酸化物の実測値[ppm]

表 1-1-5 窒素酸化物の排出基準 (抄) (1)

大 防 法 施 行 令 別 表 第 1 の 項	ばい煙発生施設の 種類 (注1)	規模 最大排出ガ ス量 [万 m ³ /h] (注2)	O _n [%]	排出基準値 [ppm]						
				設置期間						
				~ \$48.8.9	\$48.8.10 ~ \$50.12.9	\$50.12.10 ~ \$52.6.17	\$52.6.18 ~ \$52.9.9	\$52.9.10 ~ \$54.8.9	\$54.8.10 ~ \$58.9.9	\$58.9.10 ~
1 (注3) (注4) (注5) (注6)	ガス専焼 ボイラー	4~10	5	130	130	130	100	100	100	100
		1~4	5	150	150	130	130	130	130	130
		1未満	5	150	150	150	150	150	150	150
	固体燃焼 ボイラー	4~10	6	450	350	300	300	300	300	250(注 14)
		0.5~4	6	450	380	350	350	350	350	350
		0.5未満	6	480	480	480	380	380	380	350
	液体燃焼 ボイラー	4~10	4	190	180	150	150	150	150	150
1~4		4	230	230	150	150	150	150	150	
1未満		4	250	250	250	180	180	180	180	
2	ガス発生 炉・ 加熱炉(注 7)	—	7	170	170	170	170	170	150	150
5	金属溶解 炉 (注8)	—	12	200	200	200	200	200	180	180
6	金属加熱 炉 (注9)	0.5~1	11	170	170	170	150	150	150	150
		0.5未満	11	200	200	200	180	180	180	180
9	窯業製品 製造用焼成 炉 (注10)	—	15	200	200	200	200	200	180	180
10	反応炉・直火 炉 (注11)	—	6	200	200	200	200	200	180	180
11	乾燥炉	—	16	250	250	250	250	250	230	230
13	廃棄物焼却 炉(連続 炉)(注 12)	4以上 4未満	12	300	300	300	250 300	250 300	250	250
	廃棄物焼却 炉(連続炉 以外)	4以上	12	—	—	—	250	250	250	250

表 1-1-5 窒素酸化物の排出基準 (抄) (2)

大 防 法 施 行 令 別 表 第 1 の 項	ばい煙発生施設の 種類	規模 最大排出ガ ス量[万 m ³ /h]	On [%]	排出基準値 [ppm]				
				設置期間				
				～ S63.1.31	S63.2.1 ～ H1.7.31	H1.8.1 ～ H3.1.31	H3.2.1 ～ H6.1.31	H6.2.1 ～
29	ガス専焼 ガスタービ ン (注13)	4.5 以上	16	—	70	70	70	70
		4.5 未満		—	90	70	70	70
	液体燃焼 ガスタービ ン (注13)	4.5 以上		—	100	100	70	70
		4.5 未満		—	120	100	70	70
30	ディーゼ ル 機 関 (注 13)	シリンダー内 径 400mm 以上	13	—	1600	1400	1200	1200
		400mm 未満		—	950	950	950	950
31	ガス機関 (注13)	—	0	2000	2000	2000	1000	600
32	ガソリン機 関 (注13)	—	0	2000	2000	2000	1000	600

(注 1) 電気炉(熱源として電気を使用するもの)を除く。

(注 2) 大規模なものは省略

(注 3) 石炭、原油タールを燃焼するものは省略

(注 4) 硫酸酸化物処理施設が付属している液体燃焼ボイラーは省略

(注 5) 液体燃焼の水管、炉筒煙管ボイラーのうち昭和 52 年 9 月 10 日前に設置された排出ガス量が 0.5 万 m³/h 未満の過負荷燃焼のものは、適用除外

(注 6) 小型ボイラー(伝熱面積 10m² 未満かつ重油換算燃焼能力 50L/h 以上)に対する特別ガス専焼ボイラー、灯油・軽油・A 重油専焼ボイラー、既設ボイラー(昭和 60 年 9 月 9 日までに設置されたもの)は適用除外

(注 7) 水素製造用(天井バーナー燃焼方式のものに限る)は省略

(注 8) キューボラは適用除外

(注 9) ラジアントチューブ型、鍛接鋼管用は省略

(注 10) 石灰、セメント、耐火物原料及び耐火レンガ製造用は省略

(注 11) 硫酸カリウム、硫酸製造用反応炉は省略

(注 12) 浮遊回転燃焼式、特殊廃棄物は省略

(注 13) 非常用は適用除外

(注 14) 昭和 62 年 3 月 31 日までに設置された施設は 300ppm

表 1-1-6 小型ボイラーに対する規制 (単位: ppm)

ばい煙発生施設の種 類	設置期間		
	～ S60.9.9	S60.9.10 ～ H2.9.9	H2.9.10 ～
ガス・灯油・軽油・A 重油燃焼のボイラー	当分の間適用しない	当分の間適用しない	当分の間適用しない
液体燃料ボイラー (上記以外)		300	260
固体燃料ボイラー		350	350

(5) ばいじんの排出基準

ア 大気汚染防止法

ばいじんの量は次の式により算出する。

$$C = \frac{21 - O_n}{21 - O_s} C_s$$

C: ばいじんの量[g/m³N] O_n: 表中の O_n 値に掲げる値[%]

O_s: 排出ガス中の酸素の濃度[%] (20%を超える場合は20%とする)

C_s: ばいじんの実測値[g/m³N]

表 1-1-7 ばいじんの排出基準 (抄)

大防 法 施 行 令 別 表 第 1 の 項	ばい煙発生施設	区分	規模 最大排出ガ ス量 [万 m ³ /h] (注 1)	排出基準値[g/m ³ N]		O _n [%]
				設置期間		
				～ S57.5.31	S57.6.1 ～	
1	ボイラー (注 2) (注 3)	ガス専焼	4 以上	0.05	0.05	5
			4 未満	0.10	0.10	5
		重油その他の液体 燃料(黒液を除く) 専焼	20 以上	0.07	0.05	4
			4～20	0.18	0.15	4
			1～4	0.25	0.25	4
			1 未満	0.30	0.30	0s
		上記以外	4 以上	0.30	0.30	0s
			4 未満	0.40	0.30	0s
2	ガス発生炉	—	—	0.05	0.05	7
	加熱炉	—	—	0.10	0.10	7
5	金属溶解炉(注 4)	—	4 未満	0.20	0.20	0s
6	金属加熱炉	—	4 未満	0.25	0.20	0s
9	窯業製品製造用 焼成炉・溶融炉(注 5)	その他	4 未満	0.25	0.25	0s
10	無機化学工業品・食料品製 造用反応炉・直火炉(注 6)	—	4 未満	0.20	0.20	0s
11	乾燥炉(注 7)	骨材乾燥炉	2 以上	0.50	0.50	16
			2 未満	0.60	0.50	16
		その他	1～4	0.30	0.20	16
			1 未満	0.35	0.20	16
12	銑鉄等製造用電気炉(注 8)	—	—	0.10	0.10	0s
				～ H10.6.3	H10.7.1 ～	
13	廃棄物焼却炉	焼却能力 4t/h 以上	—	0.08	0.04	12
		焼却能力 2～4t/h	—	0.15	0.08	12
		焼却能力 2t/h 未満	—	0.25	0.15	12
				～ S63.1.31	S63.2.1 ～	
29	ガスタービン(注 9)	—	—	—	0.05	16
30	ディーゼル機関(注 9)	—	—	—	0.10	13
31	ガス機関(注 9)	—	—	0.05	0.05	0

- (注1) 大規模なものは省略
 (注2) 小型ボイラー(伝熱面積10m²未満かつ重油換算能力50L/h以上)に対する特則
 ガス専焼ボイラー、灯油・軽油・A重油専焼ボイラー、既設ボイラー(昭和60年9月9日までに設置されたもの)は適用除外
 (注3) 黒液燃焼、石炭燃焼、触媒再生塔に附属するボイラーは省略
 (注4) アルミニウム地金又は合金用製造用溶解炉、アルミニウム再生用反射炉は省略
 (注5) 石灰、セメント、耐火レンガ又は耐火物原料製造用焼成炉、溶融炉は省略
 (注6) 活性炭製造用反応炉は省略
 (注7) 直接熱風乾燥炉では0mは適用猶予
 (注8) 合金鉄及びカーバイド製造用電気炉は省略
 (注9) 非常用は適用猶予

表 1-1-8 小型ボイラーに対する規制

(単位：g/m³_N)

ばい煙発生施設の種 類	設置期間	
	S60.9.10 ～ H2.9.9	H2.9.10 ～
ガス・灯油・軽 油・A重油燃焼の ボイラー	当分の間適用しない	
液体燃焼ボイラー (上記以外)	0.50	0.30
固体燃焼ボイラー	0.50	0.30

イ 札幌市生活環境の確保に関する条例

表 1-1-9 ばいじんの排出基準 (抄)

ばい煙発生施設の 種類	区分	排出基準値[g/m ³ _N]		
		設置期間		
		～ H11.6.30	H11.7.1 ～ H15.2.25	H15.2.26 ～
ボイラー	ガス専焼	0.1		
	液体燃料	0.4		0.3
	固体燃料	0.8		0.3
加熱炉・直火炉・乾 燥炉	ガス専焼	0.8		0.3
	液体燃料	0.4		0.3
	固体燃料	0.8		0.3
溶融炉・溶解炉		0.8		0.3
廃棄物焼却炉		0.25		0.15

2 常時監視

(1) 測定局概要

ア 大気汚染測定項目と地点数

表 1-2-1 大気汚染測定項目と地点数

(令和 4 年 3 月 31 日現在)

測定項目		測定地点数	測定地点数の推移		
降下ばいじん (北大式デポジット・ゲージ法)		0	昭和 34 年度 10 地点 昭和 58 年度 2 地点 平成 18 年度 3 地点	昭和 44 年度 14 地点 平成 16 年度 3 地点 平成 22 年度 0 地点	昭和 53 年度 3 地点 平成 17 年度 2 地点
二酸化硫黄 (SO _x)	(溶液導電率法による自動記録計)	0	昭和 38 年度 1 地点 昭和 52 年度 7 地点 平成 10 年度 10 地点 平成 20 年度 5 地点	昭和 40 年度 5 地点 昭和 53 年度 8 地点 平成 11 年度 8 地点 平成 21 年度 1 地点	昭和 50 年度 6 地点 昭和 54 年度 9 地点 平成 18 年度 7 地点 平成 22 年度 0 地点
	(紫外線蛍光法による自動記録計)	5	平成 19 年度 1 地点、 平成 22 年度 5 地点	平成 20 年度 3 地点	平成 21 年 4 地点
浮遊粒子状物質 (SPM) (β線吸収法による自動記録計)		8	昭和 58 年度 10 地点 平成 10 年度 13 地点 平成 14 年度 14 地点、 平成 18 年度 14 地点 平成 21 年度 8 地点	平成 4 年度 11 地点 平成 12 年度 12 地点 平成 15 年度 15 地点 平成 19 年度 15 地点	平成 7 年度 12 地点 平成 13 年度 13 地点 平成 16 年度 16 地点 平成 20 年度 16 地点
窒素酸化物 (NO _x) (化学発光法による自動記録計)		8	平成 13 年度 3 地点 平成 16 年度 12 地点 平成 20 年度 15 地点 令和 3 年度 8 地点	平成 14 年度 4 地点 平成 18 年度 12 地点 平成 21 年度 16 地点	平成 15 年度 6 地点 平成 19 年度 14 地点 令和 2 年度 9 地点
光化学 オキシダント (O ₃)	(中性ヨウ化カリウム溶液を用いた吸光光度法による自動記録計)	0	昭和 47 年度 1 地点 昭和 50 年度 6 地点 昭和 54 年度 9 地点、 平成 18 年度 5 地点 平成 21 年度 2 地点	昭和 48 年度 2 地点 昭和 52 年度 7 地点 平成 10 年度 10 地点 平成 19 年度 6 地点、 平成 22 年度 0 地点	昭和 49 年度 5 地点 昭和 53 年度 8 地点 平成 16 年度 9 地点 平成 20 年度 3 地点
	(紫外線吸収法による自動記録計)	11	平成 16 年度 1 地点 平成 21 年度 8 地点	平成 18 年度 3 地点 平成 22 年度 10 地点	平成 20 年度 7 地点 令和 2 年度 11 地点
一酸化炭素 (CO) (非分散型赤外線分析法による自動記録計)		1	昭和 46 年度 1 地点		
炭化水素 (HC) (水素炎イオン化検出器を用いたガスクロマトグラフ法による自動記録計)		4	昭和 54 年度 1 地点 平成 25 年度 4 地点	昭和 56 年度 3 地点	平成 16 年度 2 地点
微小粒子状物質 (PM _{2.5})	質量濃度 (β線吸収法による自動記録計)	12	平成 23 年度 3 地点 平成 26 年度 8 地点	平成 24 年度 6 地点 令和 2 年度 10 地点	平成 25 年度 7 地点 令和 3 年度 12 地点
	成分分析	1	平成 25 年度 1 地点		

イ 大気汚染測定局の整備状況

表 1-2-2 大気汚染測定局の整備状況

(令和4年3月31日現在)

区分	番号	測定局	所在地	用途地域	設置年度	テレメータ	二酸化硫黄	浮遊粒子状物質	窒素酸化物	光化学オキシダント	一酸化炭素	炭化水素	物質質量濃度	微小粒子状物質成分分析	微小粒子状物質成分分析
						初期整備年度									
一般環境局	1	センター	中央区北1条西2丁目 市役所庁舎4F	商業	S38		GFS-327C GFS-312B DUB-317C			GUX -353B		GHC -355B			
						S47	S38	S58		S46		S54			
	2	東	東区北18条東5丁目 北光まちづくりセンター	準住	S40					GUX -353B					
							S47			S49					
	3	篠路	北区篠路4条9丁目 篠路小学校	一住	S50		GFS-327C GFS-312B DUB-317C	GLN -354	GUX -353B		GHC -355	FPM 377C-2			
						S50	S50	S50	S50	S51		S59	H23		
	4	発寒	西区発寒5条7丁目 発寒中学校	二中	S52		GFS-327C GFS-312B DUB-317C	GLN -354D	GUX -353B		GHC -355	FPM 377C-2			
						S52	S52	S58	S52	S53		H25	H24		
	5	東月寒	豊平区月寒東4条18丁目 しらかば台小学校	一低	S53		GFS -352B			GUX -353B					
						S53	S52			S54					
	6	手稲	手稲区前田2条12丁目 手稲鉄北小学校	一住	S54					GUX -353B			FPM 377C-2		
					S54				S55			R3			
7	厚別	厚別区厚別中央4条3丁目 信濃小学校	近商	H9			GLN -354D	GUX -353B		GHC -355	FPM 377-2				
					H9		H9	H9		H25	H26				
8	北白石	白石区菊水元町8条3丁目 豊平川水再生プラザ	準工	H11					GUX -353B			FPM 377C-2			
					H11				S49			R3			
9	山鼻	中央区南23条西13丁目 山鼻中学校	二中	H19		GFS -352B			GUX -353B						
					H19	H21			H19						
10	駒岡	南区真駒内602 豊平・南清掃事務所	調整区域	H30					GUX -353B			FPM 377C-2			
					H30				R1			R1			
11	清田	清田区平岡1条1丁目 清田区役所	準工	R1					GUX -353B			FPM 377C-2			
					R1				R1			R1			
自動車排出ガス局	12	北1条	中央区北1条西2丁目 市役所敷地内	商業	S56		GLN-347C DUB-317C GLN-314B			GFC -351B		FPM 377-2	FRM 2025i		
						H1	H7	S56		S56		H24	H25		
	13	月寒中央	豊平区月寒中央通7丁目 つきさっぶ中央公園	商業	S57		GLN-347D DUB-317C GLN-314D					FPM 377-2			
						S59	S58	S57				H23			
	14	南14条	中央区南14条西10丁目 山鼻小学校	近商	H1		GLN-347D DUB-317C GLN-314D					FPM 377-2			
					H1	H14	H1				H23				
15	北19条	北区北19条西2丁目 幌北小学校	近商	H3		GLN-347 DUB-317 GLN-314					FPM 377-2				
					H3	H13	H3				H24				
16	東18丁目	東区北33条東18丁目 東区土木センター	近商	H4		GLN-347D DUB-317C GLN-314D					FPM 377-2				
					H4	H4	H4				H25				

ウ 大気汚染測定局の周辺状況

表 1-2-3 大気汚染測定局の周辺状況

(令和4年3月31日現在)

区分	番号	測定局	周辺	主要事業所	主要道路
一般環境局	1	センター	都心部の中心に位置している。	地域暖房 (北北東 1000m) 総合病院 (北北西 1800m)	国道 12 号線 (北 20m)、 大通 (南 50m)、 国道 5 号線 (東 200m)
	2	東	都心部と郊外の間位置し、周囲は住宅及び学校などがある。	総合病院 (西南西 1400m) 地域暖房 (南南西 1500m)	東 8 丁目通 (東 400m) 国道 5 号線 (西 500m)
	3	篠路	郊外の住宅地		
	4	発寒	都心部と郊外の間位置する住宅地	製鋼所 (北 1500m) 清掃工場 (北 2300m)	北 5 条・手稲通 (南西 550m)
	5	東月寒	郊外の住宅地		東北通 (北 300m)
	6	手稲	郊外の住宅地	列車運転所 (西北西 1200m)	石狩・手稲通 (南東 300m)
	7	厚別	郊外の住宅及び商業地。流通センターや厚別副都心が近い。		国道 12 号線 (南東 400m)
	8	北白石	都心部と郊外の間位置している。	清掃工場・汚泥焼却施設 (北東 3000m)、 中小工場 (最短で北西 1000m)	環状通 (西 500m) 道央自動車道・国道 274 号線 (東 600m)
	9	山鼻	都心部と郊外の間位置する住宅地		国道 230 号線 (東 450m)
	10	駒岡	郊外	清掃工場 (東 30m)	国道 453 号線 (西 1000m)
	11	清田	郊外に位置し、周囲は住宅、病院及び学校などがある。	総合病院 (西 100m)	国道 36 号線 (南 300m)
自動車排出ガス局	12	北 1 条	都心部の中心に位置している。		国道 12 号線 (北 5m)
	13	月寒中央	都心部と郊外の間位置している。		国道 36 号線 (南西 5m)
	14	南 14 条	都心部と郊外の間位置している。		国道 230 号線 (東 3m)
	15	北 19 条	都心部と郊外の間位置している。		国道 5 号線 (東 7m)
	16	東 18 丁目	都心部と郊外の間位置している。		国道 274 号線 (北 9m) 札幌自動車道 (国道 274 号線高架部)

図 1-2-1 大気汚染測定局位置

(2) 有害大気汚染物質の調査概要

ア 調査物質

表 1-2-4 優先取組物質中 本市で調査を実施している物質

区分	物質名
環境基準設定物質	ジクロロメタン、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン
指針値設定物質	アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、1,3-ブタジエン、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物、塩化メチル、アセトアルデヒド
発生源由来物質	酸化エチレン、ベリリウム及びその化合物、クロム及びその化合物
自動車由来物質	ベンゾ [a] ピレン、ホルムアルデヒド、トルエン

※有害大気汚染物質のうち、優先取組物質に指定されている 23 物質のうち、表 1-2-4 の物質について、大気の汚染状況を把握するための調査を実施している（ダイオキシン類は別途調査）。

イ 調査期間

毎年度 4 月から 3 月まで月 1 回

ウ 調査地点

表 1-2-5 調査地点

地域分類	調査地点	所在地
一般環境	篠路局	北区篠路 4 条 9 丁目 篠路小学校
	南保健センター	南区真駒内幸町 1 丁目 3-2
沿道	北 1 条局	中央区北 1 条西 2 丁目 札幌市役所
	東 18 丁目局	東区北 3 3 条東 1 8 丁目 東区土木センター

図 1-2-2 有害大気汚染物質調査地点

(3) 測定結果

ア 二酸化硫黄

表 1-2-6 二酸化硫黄 (SO₂) 年平均値の経年変化 (単位: ppm)

測定局	昭和				平成									令和		
	45	50	55	60	2	7	12	17	22	27	28	29	30	1	2	3
センター	0.049	0.025	0.014	0.011	0.009	0.008	0.005	0.005	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
東	0.026	0.023	0.010	0.009	0.007	0.007	0.005	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
篠路	-	△ 0.006	0.006	0.006	0.004	0.004	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
発寒	-	-	0.009	0.006	0.006	0.005	0.004	0.003	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001
東月寒	-	-	0.007	0.005	0.005	0.004	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.000	0.000	0.000
手稲	-	-	0.007	0.007	0.005	0.004	0.004	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
厚別	-	-	-	-	-	-	0.004	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
山鼻	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

(注) △は有効測定時間が6000時間に満たなかったもの

表 1-2-7 二酸化硫黄 (SO₂) 冬期平均値の経年変化 (単位: ppm)

測定局	昭和				平成									令和		
	45	50	55	60	2	7	12	17	22	27	28	29	30	1	2	3
センター	0.063	0.031	0.019	0.014	0.011	0.010	0.007	0.007	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002
東	0.031	0.023	0.014	0.011	0.009	0.009	0.005	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-
篠路	-	0.006	0.007	0.008	0.005	0.005	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
発寒	-	-	0.012	0.008	0.007	0.006	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
東月寒	-	-	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
手稲	-	-	0.010	0.009	0.006	0.005	0.004	0.004	-	-	-	-	-	-	-	-
厚別	-	-	-	-	-	-	0.004	0.003	-	-	-	-	-	-	-	-
山鼻	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

(注) 冬期平均値は10月～3月の平均値

表 1-2-8 二酸化硫黄 (SO₂) 日平均値の2%除外値の経年変化 (単位: ppm)

測定局	昭和				平成									令和		
	45	50	55	60	2	7	12	17	22	27	28	29	30	1	2	3
センター	*0.111	*0.057	*0.040	0.031	0.019	0.019	0.012	0.011	0.005	0.003	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004
東	-	0.038	0.034	0.028	0.016	0.015	0.010	0.008	-	-	-	-	-	-	-	-
篠路	-	△ 0.015	0.021	0.023	0.009	0.008	0.007	0.007	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003
発寒	-	-	*0.035	0.024	0.015	0.016	0.008	0.008	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003
東月寒	-	-	0.024	0.019	0.013	0.010	0.007	0.006	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001
手稲	-	-	0.025	0.026	0.013	0.010	0.008	0.007	-	-	-	-	-	-	-	-
厚別	-	-	-	-	-	-	0.007	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-
山鼻	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	0.003	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002

(注) △は有効測定時間が6000時間に満たなかったもの

*は日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したもの

図 1-2-3 二酸化硫黄 (SO₂) 冬期平均値及び日平均値の2%除外値の経年変化

表 1-2-9 二酸化硫黄 (SO₂) 令和3年度 年間値

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値が0.1ppmを超えた時間数とその割合		日平均値が0.04ppmを超えた日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が0.04ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が0.04ppmを超えた日数
	日	時間	ppm	時間	%	日	%	ppm	ppm	ppm	有:× 無:○	日
センター	364	8706	0.001	0	0	0	0	0.011	0.004	0.004	○	0
篠路	365	8717	0.001	0	0	0	0	0.016	0.002	0.003	○	0
発寒	365	8715	0.001	0	0	0	0	0.011	0.002	0.003	○	0
東月寒	365	8720	0	0	0	0	0	0.005	0.003	0.001	○	0
山鼻	365	8719	0.001	0	0	0	0	0.007	0.002	0.002	○	0

表 1-2-10 二酸化硫黄 (SO₂) 令和3年度 月間値

測定局	項目		令和3年									令和4年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
センター	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	718	740	717	736	742	717	742	706	739	738	670	741	8710
	月平均値	ppm	0	0	0	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.004	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004	0.005	0.005	0.009	0.01	0.011	0.007	0.011
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0	0	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.004	0.003	0.004
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	741	718	737	741	716	741	716	736	742	670	741	8717
	月平均値	ppm	0.001	0	0	0	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.007	0.004	0.004	0.007	0.003	0.005	0.007	0.003	0.005	0.01	0.016	0.005	0.013
	日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002
発寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	741	718	735	742	714	742	716	737	742	670	741	8717
	月平均値	ppm	0	0	0	0	0.001	0.001	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.003	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.003	0.005	0.005	0.01	0.011	0.006	0.009
	日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002
東月寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	742	712	742	741	718	741	717	742	737	669	741	8722
	月平均値	ppm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.001	0.001	0.001	0
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	0.003	0.001	0.001	0.005	0.004	0.003	0.007
	日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0	0.002	0.002	0.001	0.003
山鼻	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	742	712	742	741	717	742	718	739	738	669	741	8726
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0	0	0	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	1時間値が0.1ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.005	0.005	0.006	0.007	0.005	0.007	0.006
	日平均値の最高値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002

図 1-2-4 二酸化硫黄 (SO₂) 令和 3 年度 月平均値及び日平均値の最高値の月間変化

イ 窒素酸化物

表 1-2-11 二酸化窒素 (NO₂) 年平均値の経年変化 (単位: ppm)

測定局	昭和			平成									令和		
	50	55	60	2	7	12	17	22	27	28	29	30	1	2	3
センター	*0.02 4	*0.02 8	*0.03 0	*0.03 0	*0.03 0	*0.02 9	△ 0.022	0.020	0.017	0.018	0.017	0.015	0.014	0.012	-
東	*0.01 5	*0.02 0	*0.02 1	*0.02 4	*0.02 1	*0.02 3	0.021	0.017	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	-	-
篠路	△ *0.01 0	*0.01 0	*0.01 0	*0.01 5	*0.01 4	*0.01 5	0.014	0.011	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.008	0.008
発寒	-	*0.01 7	*0.01 7	*0.01 9	*0.01 8	*0.01 9	*0.01 9	0.011	0.010	0.009	0.010	0.008	0.009	0.008	0.009
東月寒	-	*0.01 5	*0.01 6	*0.01 8	*0.01 7	*0.01 8	0.016	0.013	0.011	0.011	0.010	0.01	0.009	-	-
手稲	-	*0.01 5	*0.01 6	*0.02 0	*0.02 4	*0.02 3	0.019	0.015	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	-	-
厚別	-	-	-	-	-	*0.02 2	*0.02 3	0.015	0.013	0.013	0.012	0.011	0.011	0.011	0.011
北白石	-	-	-	-	-	*0.02 1	0.019	0.016	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	-	-
山鼻	-	-	-	-	-	-	-	0.012	0.010	0.010	0.009	0.009	0.008	-	-
駒岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.004	-	-
清田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 0.016	-	-
北1条	-	-	-	0.040	0.038	0.036	0.038	0.026	0.022	0.021	0.020	0.018	0.017	0.014	0.015
月寒中央	-	-	0.027	0.035	0.030	0.030	0.028	0.018	0.015	0.013	0.014	0.013	0.012	0.011	0.012
南14条	-	-	-	0.025	0.025	0.026	0.019	0.019	0.016	0.016	0.015	0.014	0.013	0.012	0.013
北19条	-	-	-	-	0.030	0.026	0.023	0.019	0.015	0.015	0.015	0.013	0.013	0.012	0.013
東18丁目	-	-	-	-	0.029	0.028	0.024	0.022	0.017	0.018	0.016	0.016	0.015	0.014	0.014

(注) *は吸光度法による測定値 (ザルツマン係数は 0.84) △は有効測定時間が 6000 時間に満たなかったもの

表 1-2-12 二酸化窒素 (NO₂) 日平均値の 98% 値の経年変化 (単位: ppm)

測定局	昭和			平成									令和		
	50	55	60	2	7	12	17	22	27	28	29	30	1	2	3
センター	*0.042	*0.053	*0.052	*0.050	*0.050	*0.051	△ 0.039	0.041	0.038	0.042	0.038	0.033	0.034	0.031	-
東	*0.036	*0.047	*0.052	*0.051	*0.049	*0.052	0.046	0.042	0.036	0.041	0.036	0.036	0.035	-	-
篠路	△ *0.031	*0.033	*0.032	*0.037	*0.038	*0.041	0.033	0.035	0.027	0.030	0.026	0.023	0.024	0.026	0.029
発寒	-	*0.046	*0.046	*0.044	*0.042	*0.042	*0.048	0.029	0.030	0.031	0.027	0.024	0.033	0.027	0.032
東月寒	-	*0.040	*0.041	*0.043	*0.041	*0.043	0.039	0.032	0.030	0.037	0.031	0.029	0.030	-	-
手稲	-	*0.045	*0.050	*0.049	*0.051	*0.052	0.046	0.041	0.034	0.040	0.037	0.033	0.034	-	-
厚別	-	-	-	-	-	*0.045	*0.052	0.036	0.030	0.038	0.033	0.028	0.030	0.032	0.034
北白石	-	-	-	-	-	*0.048	0.048	0.039	0.034	0.039	0.038	0.031	0.031	-	-
山鼻	-	-	-	-	-	-	-	0.030	0.029	0.034	0.028	0.027	0.028	-	-
駒岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.013	-	-
清田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 0.029	-	-
北1条	-	-	-	0.061	0.059	0.057	0.060	0.046	0.041	0.045	0.040	0.036	0.036	0.035	0.039
月寒中央	-	-	0.043	0.058	0.050	0.048	0.049	0.032	0.032	0.031	0.032	0.03	0.030	0.027	0.032
南14条	-	-	-	0.048	0.047	0.048	0.041	0.036	0.036	0.040	0.037	0.033	0.034	0.032	0.035
北19条	-	-	-	-	0.057	0.054	0.049	0.044	0.039	0.043	0.038	0.036	0.036	0.036	0.041
東18丁目	-	-	-	-	0.059	0.057	0.048	0.046	0.038	0.043	0.040	0.038	0.037	0.035	0.042

(注) *は吸光度法による測定値 (ザルツマン係数は 0.84) △は有効測定時間が 6000 時間に満たなかったもの

図 1-2-5 二酸化窒素 (NO₂) 年平均値及び日平均値の98%値の経年変化 (1)

図 1-2-5 二酸化窒素 (NO₂) 年平均値及び日平均値の98%値の経年変化 (2)

表 1-2-13 二酸化窒素 (NO₂) 令和3年度 年間値

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	1時間値が0.2ppmを超えた時間数とその割合		1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数とその割合		日平均値が0.06ppmを超えた日数とその割合		日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数とその割合		日平均値の年間98%値	98%値評価による日平均値が0.06ppmを超えた日数
	日	時間	ppm	ppm	ppm	時間	%	時間	%	日	%	日	%	ppm	日
篠路	365	8721	0.008	0.073	0.04	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.029	0
発寒	365	8719	0.009	0.072	0.04	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.032	0
厚別	365	8718	0.011	0.083	0.045	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.034	0
北1条	364	8699	0.015	0.09	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	7	1.9	0.039	0
月寒中央	365	8716	0.012	0.075	0.037	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.032	0
南14条	365	8716	0.013	0.067	0.042	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0.035	0
北19条	365	8716	0.013	0.086	0.049	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3	0.041	0
東18丁目	365	8716	0.014	0.081	0.046	0	0.0	0	0.0	0	0.0	11	3	0.042	0

表 1-2-14 一酸化窒素 (NO) 令和3年度 年間値

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の年間98%値
	日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm
篠路	365	8721	0.003	0.177	0.051	0.018
発寒	365	8719	0.002	0.158	0.035	0.02
厚別	365	8718	0.005	0.264	0.060	0.034
北1条	364	8699	0.01	0.184	0.05	0.035
月寒中央	365	8716	0.007	0.182	0.041	0.024
南14条	365	8716	0.007	0.135	0.035	0.028
北19条	365	8716	0.007	0.249	0.068	0.041
東18丁目	365	8716	0.009	0.280	0.059	0.047

表 1-2-15 窒素酸化物 (NO_x) 令和3年度 年間値

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値	1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の年間98%値	年平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)
	日	時間	ppm	ppm	ppm	ppm	%
篠路	365	8721	0.011	0.248	0.092	0.044	75.4
発寒	365	8719	0.011	0.23	0.074	0.051	78
厚別	365	8718	0.016	0.347	0.105	0.065	70
北1条	364	8699	0.025	0.254	0.092	0.074	60.8
月寒中央	365	8716	0.018	0.257	0.075	0.056	63.2
南14条	365	8716	0.02	0.2	0.075	0.062	63.4
北19条	365	8716	0.020	0.335	0.117	0.08	64.9
東18丁目	365	8716	0.023	0.353	0.105	0.088	60.8

表 1-2-16 二酸化窒素 (NO₂) 令和3年度 月間値 (1)

測定局	項目		令和3年									令和4年			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	718	742	718	736	741	717	742	718	737	742	670	740	8721	
	月平均値	ppm	0.005	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.007	0.009	0.012	0.017	0.015	0.014	0.008
	1時間値の最高値	ppm	0.035	0.019	0.015	0.011	0.016	0.020	0.038	0.040	0.051	0.071	0.073	0.070	0.073	
	日平均値の最高値	ppm	0.010	0.008	0.007	0.006	0.008	0.007	0.016	0.021	0.026	0.040	0.031	0.033	0.040	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
発寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	717	742	718	735	742	716	742	718	737	742	670	740	8719	
	月平均値	ppm	0.006	0.005	0.004	0.003	0.003	0.004	0.007	0.009	0.014	0.019	0.016	0.013	0.009	
	1時間値の最高値	ppm	0.027	0.037	0.014	0.013	0.013	0.027	0.036	0.046	0.049	0.071	0.072	0.067	0.072	
	日平均値の最高値	ppm	0.011	0.013	0.007	0.006	0.006	0.008	0.017	0.024	0.028	0.040	0.035	0.027	0.040	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	717	742	712	740	742	716	742	718	737	742	670	740	8718	
	月平均値	ppm	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	0.010	0.013	0.018	0.023	0.022	0.016	0.011	
	1時間値の最高値	ppm	0.038	0.034	0.034	0.017	0.020	0.028	0.038	0.053	0.053	0.083	0.073	0.061	0.083	
	日平均値の最高値	ppm	0.012	0.011	0.010	0.007	0.007	0.009	0.019	0.022	0.034	0.038	0.045	0.030	0.045	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
北1条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364	
	測定時間	時間	718	740	718	735	742	716	742	706	735	737	670	740	8699	
	月平均値	ppm	0.012	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.014	0.017	0.022	0.027	0.025	0.023	0.015	
	1時間値の最高値	ppm	0.039	0.035	0.033	0.031	0.027	0.038	0.047	0.059	0.071	0.070	0.090	0.063	0.090	
	日平均値の最高値	ppm	0.018	0.018	0.014	0.014	0.017	0.013	0.021	0.028	0.036	0.046	0.042	0.042	0.046	
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	7	

表 1-2-16 二酸化窒素 (NO₂) 令和3年度 月間値 (2)

測定局	項目		令和3年									令和4年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	741	717	736	742	717	742	715	741	738	669	741	8716
	月平均値	ppm	0.009	0.007	0.006	0.005	0.005	0.006	0.010	0.013	0.018	0.024	0.021	0.018	0.012
	1時間値の最高値	ppm	0.032	0.033	0.030	0.022	0.022	0.029	0.033	0.048	0.050	0.075	0.061	0.056	0.075
	日平均値の最高値	ppm	0.017	0.015	0.012	0.012	0.011	0.009	0.016	0.023	0.027	0.037	0.032	0.032	0.037
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
南14条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	740	718	735	741	717	742	716	742	737	669	741	8716
	月平均値	ppm	0.009	0.008	0.006	0.006	0.006	0.007	0.011	0.015	0.020	0.025	0.023	0.019	0.013
	1時間値の最高値	ppm	0.043	0.027	0.020	0.017	0.019	0.030	0.049	0.053	0.065	0.064	0.067	0.062	0.067
	日平均値の最高値	ppm	0.014	0.013	0.009	0.009	0.010	0.013	0.018	0.028	0.034	0.042	0.033	0.033	0.042
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
北19条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	742	711	742	742	716	741	718	741	736	670	740	8716
	月平均値	ppm	0.009	0.007	0.006	0.005	0.006	0.007	0.012	0.015	0.020	0.026	0.023	0.021	0.013
	1時間値の最高値	ppm	0.045	0.029	0.024	0.015	0.018	0.034	0.050	0.056	0.075	0.086	0.072	0.074	0.086
	日平均値の最高値	ppm	0.016	0.014	0.011	0.008	0.011	0.011	0.025	0.031	0.040	0.049	0.043	0.045	0.049
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	11	
東18丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	740	711	742	742	717	742	714	742	737	670	741	8716
	月平均値	ppm	0.011	0.008	0.007	0.005	0.006	0.008	0.013	0.015	0.021	0.027	0.026	0.023	0.014
	1時間値の最高値	ppm	0.043	0.030	0.028	0.020	0.021	0.034	0.052	0.051	0.081	0.073	0.078	0.068	0.081
	日平均値の最高値	ppm	0.019	0.016	0.015	0.012	0.013	0.012	0.024	0.030	0.042	0.046	0.045	0.044	0.046
	1時間値が0.2ppmを超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値0.06ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日平均値0.04ppm以上0.06ppm以下の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	3	2	11	

表 1-2-17 一酸化窒素 (NO) 令和 3 年度 月間値

測定局	項目		令和 3 年										令和 4 年			年間値
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月		
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	718	742	718	736	741	717	742	718	737	742	670	740	8721	
	月平均値	ppm	0.001	0.000	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.009	0.007	0.004	0.003	
	1 時間値の最高値	ppm	0.025	0.005	0.007	0.006	0.045	0.016	0.036	0.078	0.112	0.177	0.138	0.087	0.177	
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.006	0.008	0.018	0.051	0.037	0.018	0.018	
登寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	717	742	718	735	742	716	742	718	737	742	670	740	8719	
	月平均値	ppm	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.002	0.004	0.009	0.006	0.003	0.002	
	1 時間値の最高値	ppm	0.018	0.010	0.005	0.008	0.005	0.022	0.049	0.056	0.084	0.143	0.158	0.116	0.158	
	日平均値の最高値	ppm	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.008	0.008	0.018	0.035	0.030	0.020	0.020	
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	717	742	712	740	742	716	742	718	737	742	670	740	8718	
	月平均値	ppm	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.005	0.010	0.015	0.013	0.005	0.005	
	1 時間値の最高値	ppm	0.021	0.012	0.009	0.007	0.009	0.026	0.048	0.070	0.182	0.264	0.183	0.065	0.264	
	日平均値の最高値	ppm	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.010	0.012	0.034	0.041	0.060	0.014	0.034	
北 1 条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364	
	測定時間	時間	718	740	718	735	742	716	742	706	735	737	670	740	8699	
	月平均値	ppm	0.006	0.004	0.005	0.006	0.005	0.006	0.009	0.012	0.015	0.022	0.016	0.013	0.010	
	1 時間値の最高値	ppm	0.038	0.030	0.029	0.040	0.024	0.036	0.068	0.081	0.170	0.184	0.152	0.101	0.184	
	日平均値の最高値	ppm	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.010	0.016	0.020	0.040	0.048	0.050	0.029	0.035	
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	717	741	717	736	742	717	742	715	741	738	669	741	8716	
	月平均値	ppm	0.005	0.003	0.003	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.012	0.016	0.013	0.008	0.007	
	1 時間値の最高値	ppm	0.033	0.031	0.023	0.020	0.026	0.025	0.038	0.052	0.085	0.182	0.097	0.064	0.182	
	日平均値の最高値	ppm	0.010	0.008	0.009	0.009	0.010	0.009	0.012	0.013	0.022	0.041	0.025	0.017	0.024	
南 14 条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	718	740	718	735	741	717	742	716	742	737	669	741	8716	
	月平均値	ppm	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.006	0.009	0.013	0.016	0.014	0.009	0.007	
	1 時間値の最高値	ppm	0.023	0.016	0.019	0.023	0.019	0.030	0.040	0.050	0.095	0.112	0.135	0.059	0.135	
	日平均値の最高値	ppm	0.007	0.006	0.007	0.009	0.007	0.009	0.010	0.018	0.029	0.033	0.035	0.016	0.028	
北 19 条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	717	742	711	742	742	716	741	718	741	736	670	740	8716	
	月平均値	ppm	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.005	0.006	0.013	0.020	0.015	0.010	0.007	
	1 時間値の最高値	ppm	0.022	0.020	0.015	0.019	0.016	0.033	0.060	0.061	0.175	0.249	0.190	0.138	0.249	
	日平均値の最高値	ppm	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.007	0.013	0.017	0.046	0.068	0.055	0.043	0.041	
東 18 丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	718	740	711	742	742	717	742	714	742	737	670	741	8716	
	月平均値	ppm	0.005	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.007	0.007	0.016	0.026	0.020	0.013	0.009	
	1 時間値の最高値	ppm	0.040	0.029	0.020	0.020	0.024	0.041	0.076	0.088	0.252	0.280	0.173	0.141	0.280	
	日平均値の最高値	ppm	0.012	0.008	0.007	0.009	0.007	0.009	0.016	0.019	0.056	0.059	0.056	0.045	0.047	

表 1-2-18 窒素酸化物 (NOx) 令和 3 年度 月間値 (1)

測定局	項目		令和 3 年									令和 4 年			年間値
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
篠路	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	742	718	736	741	717	742	718	737	742	670	740	8721
	月平均値	ppm	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.005	0.009	0.011	0.017	0.026	0.021	0.018	0.011
	1 時間値の最高値	ppm	0.047	0.019	0.016	0.013	0.058	0.028	0.065	0.103	0.163	0.248	0.211	0.150	0.248
	日平均値の最高値	ppm	0.010	0.009	0.008	0.006	0.009	0.010	0.019	0.024	0.044	0.092	0.066	0.051	0.092
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	88.3	89.1	84.8	83.4	82.3	84.9	80.1	80	73.1	64.6	68.5	79.2	75.4
発寒	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	742	718	735	742	716	742	718	737	742	670	740	8719
	月平均値	ppm	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.009	0.011	0.019	0.029	0.021	0.017	0.011
	1 時間値の最高値	ppm	0.044	0.039	0.018	0.019	0.018	0.042	0.084	0.099	0.125	0.214	0.230	0.183	0.230
	日平均値の最高値	ppm	0.013	0.014	0.008	0.007	0.007	0.010	0.022	0.032	0.046	0.074	0.056	0.046	0.074
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	89.6	92.1	89	88.3	89.1	84.8	77.9	81.5	76.9	67.9	73.9	80.9	78
厚別	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	742	712	740	742	716	742	718	737	742	670	740	8718
	月平均値	ppm	0.009	0.006	0.006	0.005	0.005	0.007	0.013	0.018	0.028	0.037	0.035	0.021	0.016
	1 時間値の最高値	ppm	0.054	0.039	0.042	0.024	0.025	0.044	0.079	0.113	0.228	0.347	0.248	0.122	0.347
	日平均値の最高値	ppm	0.015	0.014	0.012	0.008	0.009	0.012	0.027	0.034	0.057	0.079	0.105	0.044	0.105
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	85.7	86.5	80.1	73.2	76.4	78.6	76.2	73.1	64.6	61	63.7	77.3	70
北 1 条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
	測定時間	時間	718	740	718	735	742	716	742	706	735	737	670	740	8699
	月平均値	ppm	0.018	0.014	0.013	0.014	0.014	0.015	0.023	0.029	0.036	0.049	0.041	0.035	0.025
	1 時間値の最高値	ppm	0.072	0.060	0.049	0.070	0.051	0.061	0.109	0.139	0.241	0.254	0.223	0.161	0.254
	日平均値の最高値	ppm	0.026	0.026	0.022	0.023	0.026	0.023	0.036	0.047	0.074	0.092	0.087	0.071	0.092
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	67.8	68.4	63.4	57.2	62	59.9	60.5	59.6	59.6	56	61	64.2	60.8
月寒中央	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	717	741	717	736	742	717	742	715	741	738	669	741	8716
	月平均値	ppm	0.014	0.010	0.008	0.007	0.008	0.010	0.015	0.020	0.029	0.040	0.034	0.026	0.018
	1 時間値の最高値	ppm	0.059	0.059	0.049	0.040	0.047	0.043	0.070	0.078	0.135	0.257	0.156	0.114	0.257
	日平均値の最高値	ppm	0.025	0.022	0.021	0.019	0.022	0.018	0.028	0.031	0.047	0.075	0.056	0.050	0.075
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	66.9	67.9	67.0	65.8	64.7	61.9	61.9	62.8	61.1	59.1	62.5	68.0	63.2
南 14 条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	測定時間	時間	718	740	718	735	741	717	742	716	742	737	669	741	8716
	月平均値	ppm	0.013	0.011	0.010	0.010	0.010	0.012	0.016	0.024	0.034	0.042	0.037	0.028	0.020
	1 時間値の最高値	ppm	0.054	0.037	0.030	0.034	0.037	0.048	0.076	0.099	0.160	0.170	0.200	0.112	0.200
	日平均値の最高値	ppm	0.019	0.017	0.014	0.016	0.013	0.022	0.027	0.047	0.062	0.075	0.068	0.049	0.075
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	70.3	71.0	63.6	57.1	59.6	60.6	65.9	62.3	61.1	61.3	62.7	68.5	63.4

表 1-2-18 窒素酸化物 (NO_x) 令和3年度 月間値 (2)

測定局	項目		令和3年										令和4年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
北19条	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	717	742	711	742	742	716	741	718	741	736	670	740	8716	
	月平均値	ppm	0.011	0.009	0.008	0.008	0.008	0.010	0.017	0.021	0.034	0.046	0.038	0.030	0.020	
	1時間値の最高値	ppm	0.049	0.043	0.028	0.030	0.030	0.052	0.099	0.115	0.250	0.335	0.261	0.201	0.335	
	日平均値の最高値	ppm	0.020	0.018	0.014	0.012	0.015	0.016	0.039	0.048	0.086	0.117	0.091	0.087	0.117	
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	78.0	76.5	72.8	65.2	70.4	70.9	70.0	71.6	60.3	56.0	60.6	67.6	64.9	
東18丁目	有効測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	測定時間	時間	718	740	711	742	742	717	742	714	742	737	670	741	8716	
	月平均値	ppm	0.015	0.011	0.010	0.008	0.009	0.012	0.020	0.023	0.038	0.053	0.046	0.036	0.023	
	1時間値の最高値	ppm	0.066	0.054	0.038	0.040	0.041	0.056	0.108	0.134	0.333	0.353	0.246	0.207	0.353	
	日平均値の最高値	ppm	0.030	0.023	0.021	0.020	0.019	0.022	0.038	0.044	0.098	0.105	0.097	0.088	0.105	
	月平均値 NO ₂ /(NO+NO ₂)	%	69.5	71.0	70.7	66.3	68.5	65.6	63.9	67.5	56.5	51.3	56.7	64.1	60.8

図 1-2-6 二酸化窒素 (NO₂) 令和3年度 月平均値及び日平均値の最大値の月間変化 (1)

図 1-2-6 二酸化窒素 (NO₂) 令和3年度 月平均値及び日平均値の最大値の月間変化 (2)

ウ 一酸化炭素

表 1-2-19 一酸化炭素 (CO) 年平均値の経年変化 (単位: ppm)

測定局	昭和			平成									令和		
	50	55	60	2	7	12	17	22	27	28	29	30	1	2	3
北1条	2.5	1.7	1.5	1.2	0.9	1.0	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3

(注) 昭和56年11月にセンターを北1条に改称

表 1-2-20 一酸化炭素 (CO) 日平均値の2%除外値の経年変化 (単位: ppm)

測定局	昭和			平成									令和		
	50	55	60	2	7	12	17	22	27	28	29	30	1	2	3
北1条	5.1	3.2	3.0	2.4	1.9	1.8	1.3	0.8	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5

(注) 昭和56年11月にセンターを北1条に改称

図 1-2-7 一酸化炭素 (CO) 年平均値及び日平均値の2%除外値の経年変化

表 1-2-21 一酸化炭素 (CO) 令和3年度 年間値

測定局	測定時間	年平均値	8時間値が20ppmを超えた回数とその割合		日平均値が10ppmを超えた日数とその割合		1時間値が30ppm以上の日数とその割合		1時間値の最高値	日平均値の最高値	日平均値の2%除外値	日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続したことの有無	環境基準の長期的評価による日平均値が10ppmを超えた日数
			回	%	日	%	日	%					
北1条	8691	0.3	0	0	0	0	0	0	1.1	0.7	0.5	○	0

表 1-2-22 一酸化炭素 (CO) 令和3年度 月間値

測定局	項目	令和3年										令和4年			年間値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
北1条	有効測定日数	日	30	31	29	31	31	30	31	29	31	31	26	31	361
	測定時間	時間	718	742	711	739	742	717	742	706	742	738	653	741	8691
	月平均値	ppm	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3
	8時間値が20ppmを超えた回数	回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が10ppmを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1時間値の最高値	ppm	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.8	1.1	1.1	1	0.8	0.7	1.1
	日平均値の最高値	ppm	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7
	1時間値が30ppm以上の日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

図 1-2-8 一酸化炭素 (CO) 月平均値及び日平均値の月間変化

エ 光化学オキシダント

表 1-2-23 光化学オキシダント (Ox) 昼間*の夏季平均値の経年変化 (単位: ppm)

測定局	昭和			平成									令和		
	50	55	60	2	7	12	17	22	27	28	29	30	1	2	3
センター	0.040	0.016	0.018	0.015	0.014	0.016	0.019	0.031	0.030	0.030	0.031	0.031	0.033	0.032	0.033
東	0.035	0.025	0.025	0.026	0.020	0.025	0.026	0.038	0.035	0.033	0.035	0.035	0.037	0.035	0.035
篠路	-	0.031	0.034	0.033	0.031	0.031	0.032	0.038	0.034	0.033	0.036	0.036	0.038	0.034	0.037
発寒	-	0.029	0.031	0.030	0.025	0.028	0.035	0.038	0.037	0.035	0.037	0.036	0.038	0.034	0.037
東月寒	-	0.027	0.031	0.031	0.031	0.033	0.030	0.041	0.036	0.035	0.037	0.034	0.037	0.034	0.035
手稲	-	0.027	0.028	0.033	0.024	0.028	0.026	0.036	0.034	0.033	0.034	0.035	0.037	0.033	0.036
厚別	-	-	-	-	-	0.029	0.025	0.039	0.034	0.032	0.034	0.037	0.036	0.034	0.036
北白石	-	-	-	-	-	0.027	0.027	0.038	0.035	0.033	0.035	0.034	0.038	0.034	0.037
山鼻	-	-	-	-	-	-	-	0.040	0.038	0.036	0.036	0.035	0.038	0.034	0.038
駒岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.035	0.039
清田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.034	0.035

*光化学オキシダントのデータ整理は昼間(5時~20時の時間帯)について行う。

(環境大気常時監視マニュアル第6版より抜粋)

表 1-2-24 環境基準超過日数の経年変化 (単位: 日)

測定局	昭和			平成									令和		
	50	55	60	2	7	12	17	22	27	28	29	30	1	2	3
センター	25	0	0	0	1	0	0	13	8	4	12	16	11	6	4
東	35	0	1	9	1	0	2	24	10	8	18	22	20	7	9
篠路	-	8	12	13	5	11	11	27	9	8	23	25	22	2	10
発寒	-	5	19	16	4	11	19	31	26	12	25	25	22	11	15
東月寒	-	1	9	14	7	25	9	41	23	11	18	18	14	6	4
手稲	-	3	10	21	3	6	1	20	13	9	20	24	21	7	12
厚別	-	-	-	-	-	4	3	22	13	9	15	26	15	4	6
北白石	-	-	-	-	-	0	6	32	15	8	17	22	21	5	7
山鼻	-	-	-	-	-	-	-	42	28	11	20	24	25	7	14
駒岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	14
清田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	6	6

図 1-2-9 光化学オキシダント (Ox) 昼間の最高値、年平均値の経年変化 (1)

図 1-2-9 光化学オキシダント (Ox) 昼間の最高値、年平均値の経年変化 (2)

表 1-2-25 光化学オキシダント (Ox) 令和3年度 年間値

測定局	昼間測定		昼間の1時間値の年平均値	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数		昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数		昼間の1時間値の最高値	昼間の日最高1時間値の年平均値
	日数	時間		日	時間	日	時間		
センター	365	5458	0.028	4	15	0	0	0.068	0.036
東	365	5467	0.031	9	25	0	0	0.070	0.040
篠路	365	5467	0.032	10	27	0	0	0.071	0.041
発寒	365	5462	0.032	15	41	0	0	0.073	0.041
東月寒	365	5467	0.031	4	13	0	0	0.067	0.039
手稲	365	5465	0.030	12	35	0	0	0.073	0.040
厚別	365	5462	0.031	6	18	0	0	0.067	0.039
北白石	365	5466	0.031	7	21	0	0	0.07	0.04
山鼻	365	5466	0.033	14	45	0	0	0.072	0.042
駒岡	365	5456	0.036	14	54	0	0	0.073	0.043
清田	365	5464	0.029	6	22	0	0	0.069	0.038

表 1-2-26 光化学オキシダント (Ox) 令和3年度 月間値 (1)

測定局	項目		令和3年										令和4年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
センター	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	昼間測定時間	時間	450	465	450	465	462	450	465	440	465	465	416	465	5458	
	昼間の1時間値の月平均値	ppm	0.038	0.039	0.036	0.024	0.026	0.027	0.025	0.022	0.019	0.018	0.026	0.032	0.028	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	日	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	
		時間	0	1	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	15	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.06	0.061	0.068	0.058	0.06	0.05	0.049	0.05	0.037	0.034	0.062	0.049	0.068	
昼間の日最高1時間値の月平均値	ppm	0.045	0.047	0.044	0.033	0.034	0.036	0.034	0.031	0.027	0.027	0.034	0.041	0.036		
東	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	昼間測定時間	時間	450	465	450	465	462	450	465	450	465	465	415	465	5467	
	昼間の1時間値の月平均値	ppm	0.041	0.041	0.037	0.028	0.030	0.030	0.027	0.024	0.021	0.022	0.030	0.035	0.031	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	日	0	1	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	9	
		時間	0	3	14	3	4	0	0	0	0	0	1	0	25	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.059	0.062	0.067	0.070	0.063	0.052	0.056	0.051	0.038	0.039	0.061	0.052	0.070	
昼間の日最高1時間値の月平均値	ppm	0.048	0.048	0.046	0.037	0.038	0.039	0.037	0.034	0.031	0.032	0.041	0.045	0.040		

表 1-2-26 光化学オキシダント (Ox) 令和3年度 月間値 (2)

測定局	項目		令和3年									令和4年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
篠路	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	昼間測定時間	時間	450	465	450	465	461	450	465	450	465	465	416	465	5467
	昼間の1時間値の月平均値	ppm	0.043	0.043	0.038	0.029	0.031	0.030	0.027	0.026	0.024	0.026	0.034	0.038	0.032
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	日	0	1	6	0	2	0	0	0	0	0	1	0	10
		時間	0	4	18	0	4	0	0	0	0	0	1	0	27
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.059	0.065	0.071	0.058	0.066	0.055	0.055	0.051	0.039	0.040	0.063	0.054	0.071
昼間の日最高1時間値の月平均値	ppm	0.049	0.049	0.047	0.037	0.040	0.039	0.038	0.034	0.033	0.035	0.042	0.046	0.041	
発寒	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	昼間測定時間	時間	450	465	450	464	458	450	465	450	465	465	415	465	5462
	昼間の1時間値の月平均値	ppm	0.043	0.043	0.039	0.030	0.032	0.031	0.029	0.026	0.023	0.023	0.031	0.037	0.032
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	日	2	2	6	2	2	0	0	0	0	0	1	0	15
		時間	2	5	23	3	5	0	0	0	0	0	3	0	41
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.065	0.065	0.073	0.071	0.069	0.055	0.056	0.053	0.040	0.038	0.061	0.052	0.073
昼間の日最高1時間値の月平均値	ppm	0.050	0.050	0.049	0.041	0.041	0.039	0.038	0.035	0.031	0.033	0.040	0.045	0.041	
東月寒	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	昼間測定時間	時間	450	465	450	465	462	450	465	450	465	465	415	465	5467
	昼間の1時間値の月平均値	ppm	0.042	0.042	0.037	0.026	0.029	0.030	0.027	0.025	0.022	0.023	0.030	0.037	0.031
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	日	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
		時間	0	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.060	0.062	0.067	0.055	0.055	0.049	0.053	0.051	0.041	0.041	0.058	0.054	0.067
昼間の日最高1時間値の月平均値	ppm	0.049	0.048	0.045	0.034	0.036	0.038	0.037	0.034	0.032	0.034	0.041	0.046	0.039	
手稲	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	昼間測定時間	時間	450	465	450	465	462	447	465	450	465	465	416	465	5465
	昼間の1時間値の月平均値	ppm	0.041	0.042	0.039	0.030	0.030	0.029	0.026	0.024	0.021	0.020	0.027	0.035	0.030
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	日	1	2	6	1	1	0	0	0	0	0	1	0	12
		時間	1	5	23	1	2	0	0	0	0	0	3	0	35
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.061	0.067	0.073	0.065	0.069	0.056	0.053	0.054	0.040	0.039	0.068	0.053	0.073
昼間の日最高1時間値の月平均値	ppm	0.049	0.049	0.049	0.041	0.040	0.038	0.036	0.034	0.031	0.031	0.038	0.046	0.040	

表 1-2-26 光化学オキシダント (Ox) 令和3年度 月間値 (3)

測定局	項目		令和3年									令和4年			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
厚別	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	昼間測定時間	時間	450	465	450	463	462	450	463	450	465	465	414	465	5462	
	昼間の1時間値の月平均値	ppm	0.041	0.042	0.038	0.028	0.030	0.030	0.027	0.024	0.021	0.023	0.028	0.035	0.031	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	日	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		時間	0	5	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	18
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.058	0.063	0.067	0.057	0.063	0.052	0.053	0.050	0.042	0.039	0.056	0.051	0.067	
昼間の日最高1時間値の月平均値	ppm	0.048	0.048	0.046	0.036	0.039	0.039	0.037	0.034	0.032	0.033	0.039	0.045	0.039		
北白石	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	昼間測定時間	時間	450	465	450	465	462	450	465	450	465	465	414	465	5466	
	昼間の1時間値の月平均値	ppm	0.042	0.043	0.039	0.029	0.031	0.030	0.026	0.024	0.020	0.022	0.028	0.035	0.031	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	日	0	1	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	7	
		時間	0	2	16	0	2	0	0	0	0	0	1	0	21	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.059	0.064	0.070	0.059	0.063	0.050	0.055	0.052	0.041	0.039	0.061	0.052	0.070	
昼間の日最高1時間値の月平均値	ppm	0.049	0.050	0.047	0.037	0.039	0.039	0.037	0.034	0.031	0.032	0.039	0.046	0.040		
山鼻	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	昼間測定時間	時間	450	465	450	465	462	450	465	450	465	465	414	465	5466	
	昼間の1時間値の月平均値	ppm	0.043	0.044	0.040	0.030	0.032	0.031	0.029	0.026	0.023	0.024	0.032	0.039	0.033	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	日	2	2	5	4	0	0	0	0	0	0	1	0	14	
		時間	3	9	23	7	0	0	0	0	0	0	3	0	45	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.065	0.066	0.072	0.067	0.059	0.052	0.056	0.055	0.041	0.040	0.067	0.056	0.072	
昼間の日最高1時間値の月平均値	ppm	0.050	0.051	0.049	0.040	0.040	0.039	0.039	0.035	0.033	0.034	0.041	0.047	0.042		
駒岡	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	昼間測定時間	時間	450	456	450	465	461	450	465	450	465	465	414	465	5456	
	昼間の1時間値の月平均値	ppm	0.047	0.046	0.040	0.029	0.031	0.031	0.031	0.030	0.030	0.031	0.040	0.045	0.036	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	日	2	4	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	14	
		時間	5	16	22	3	1	0	0	0	0	0	7	0	54	
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.069	0.068	0.073	0.066	0.061	0.051	0.057	0.057	0.042	0.043	0.070	0.059	0.073	
昼間の日最高1時間値の月平均値	ppm	0.053	0.052	0.049	0.039	0.039	0.040	0.040	0.038	0.037	0.038	0.045	0.050	0.043		

表 1-2-26 光化学オキシダント (Ox) 令和3年度 月間値 (4)

測定局	項目		令和3年										令和4年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
清田	昼間測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	昼間測定時間	時間	450	465	450	465	462	450	463	450	465	465	415	464	5464	
	昼間の1時間値の月平均値	ppm	0.041	0.041	0.037	0.026	0.028	0.028	0.025	0.023	0.02	0.022	0.028	0.036	0.029	
	昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数と時間数	日	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
		時間	1	7	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
	昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数と時間数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	昼間の1時間値の最高値	ppm	0.062	0.064	0.069	0.055	0.057	0.046	0.052	0.053	0.042	0.038	0.058	0.053	0.069	
昼間の日最高1時間値の月平均値	ppm	0.048	0.048	0.045	0.034	0.036	0.037	0.035	0.032	0.031	0.033	0.039	0.044	0.038

図 1-2-10 光化学オキシダント (Ox) 令和3年度 昼間の月最高値、月平均値の月間変化 (1)

図 1-2-10 光化学オキシダント (Ox) 令和3年度 昼間の月最高値、月平均値の月間変化 (2)

オ 炭化水素

表 1-2-27 非メタン炭化水素 (NMHC) 令和3年度 年間値

測定局	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6時～9時3時間平均値		6時～9時3時間平均値が0.20ppmC ^{※1} を超えた日数とその割合		6時～9時3時間平均値が0.31ppmC ^{※1} を超えた日数とその割合	
					最高値	最低値	日	%	日	%
	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC	日	%	日	%
センター	8687	0.08	0.08	363	0.29	0.01	3	0.8	0	0
篠路	8699	0.05	0.05	365	0.31	0.01	3	0.8	0	0
発寒	8697	0.08	0.10	364	0.46	0	24	6.6	4	1.1
厚別	8680	0.08	0.10	364	0.48	0.01	26	7.1	5	1.4

※1 光化学オキシダント生成防止のための大気中炭化水素濃度の指針・・・光化学オキシダントの日最高1時間値0.06ppmに対応する午前6時から9時までの非メタン炭化水素の3時間平均値は0.20ppmC～0.31ppmCの範囲にある。(S51. 8. 13 環境省通知)

表 1-2-28 メタン (CH₄) 令和3年度 年間値

測定局	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6時～9時3時間平均値	
					最高値	最低値
	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC
センター	8687	2	2.01	363	2.25	1.85
篠路	8699	1.97	1.98	365	2.39	1.78
発寒	8697	1.99	2	364	2.35	1.83
厚別	8680	2	2.02	364	2.65	1.85

表 1-2-29 全炭化水素 (THC) 令和3年度 年間値

測定局	測定時間	年平均値	6～9時における年平均値	6～9時測定日数	6時～9時3時間平均値	
					最高値	最低値
	時間	ppmC	ppmC	日	ppmC	ppmC
センター	8687	2.08	2.09	363	2.55	1.91
篠路	8699	2.02	2.04	365	2.47	1.83
発寒	8697	2.07	2.1	364	2.8	1.88
厚別	8680	2.08	2.12	364	2.98	1.93

表 1-2-30 非メタン炭化水素 (NMHC) 令和3年度 月間値

測定局	項目		令和3年									令和4年			年間値	
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
センター	測定時間	時間	716	740	714	735	740	716	740	706	739	735	668	738	8687	
	月平均値	ppmC	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	
	6~9時における月平均値	ppmC	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	
	6~9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	28	31	363	
	6~9時3時間平均値	最高値	ppmC	0.13	0.18	0.14	0.21	0.13	0.16	0.20	0.16	0.16	0.29	0.14	0.28	0.29
		最低値	ppmC	0.03	0.03	0.03	0.04	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.04	0.03	0.01
	6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	3	
	6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
篠路	測定時間	時間	716	740	716	735	739	716	740	716	734	740	668	739	8699	
	月平均値	ppmC	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	
	6~9時における月平均値	ppmC	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	
	6~9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365	
	6~9時3時間平均値	最高値	ppmC	0.05	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08	0.13	0.22	0.20	0.31	0.17	0.20	0.31
		最低値	ppmC	0.02	0.01	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01
	6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	3	
	6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
発寒	測定時間	時間	715	740	716	735	740	715	740	716	733	740	668	739	8697	
	月平均値	ppmC	0.06	0.07	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	
	6~9時における月平均値	ppmC	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.12	0.11	0.10	0.12	0.10	0.12	0.10	
	6~9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364	
	6~9時3時間平均値	最高値	ppmC	0.19	0.22	0.18	0.21	0.15	0.21	0.32	0.24	0.37	0.36	0.27	0.46	0.46
		最低値	ppmC	0.03	0.01	0.03	0.04	0.03	0.04	0.02	0.02	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00
	6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	0	1	0	1	0	1	5	4	1	6	2	3	24	
	6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	4	
厚別	測定時間	時間	715	726	711	737	740	715	740	715	733	741	668	739	8680	
	月平均値	ppmC	0.06	0.07	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	
	6~9時における月平均値	ppmC	0.06	0.07	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.13	0.13	0.13	0.09	0.10	
	6~9時測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364	
	6~9時3時間平均値	最高値	ppmC	0.18	0.17	0.11	0.19	0.19	0.14	0.16	0.26	0.37	0.48	0.33	0.21	0.48
		最低値	ppmC	0.02	0.02	0.04	0.05	0.05	0.05	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01
	6~9時3時間平均値が0.20ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	3	5	8	9	1	26	
	6~9時3時間平均値が0.31ppmCを超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	5	

表 1-2-31 メタン (CH₄) 令和3年度 月間値

測定局	項目		令和3年									令和4年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
センター	測定時間	時間	716	740	714	735	740	716	740	706	739	735	668	738	8687
	月平均値	ppmC	1.99	1.97	1.97	1.92	1.95	2.00	2.01	2.04	2.06	2.06	2.04	2.04	2.00
	6～9時における月平均値	ppmC	2.00	1.97	1.97	1.92	1.95	2.00	2.01	2.05	2.07	2.09	2.05	2.06	2.01
	6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	28	31	363
	6～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.09	2.03	2.10	2.03	2.07	2.12	2.12	2.17	2.19	2.25	2.16	2.18
最低値		ppmC	1.96	1.94	1.92	1.85	1.85	1.94	1.94	1.97	1.97	2.01	2.02	1.99	1.85
篠路	測定時間	時間	716	740	716	735	739	716	740	716	734	740	668	739	8699
	月平均値	ppmC	1.95	1.92	1.94	1.88	1.93	1.98	1.99	2.00	2.01	2.01	1.98	2.00	1.97
	6～9時における月平均値	ppmC	1.95	1.93	1.94	1.89	1.95	2.00	2.02	2.02	2.03	2.03	2.01	2.03	1.98
	6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	6～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.05	2.06	2.17	2.11	2.21	2.22	2.18	2.27	2.39	2.24	2.21	2.17
最低値		ppmC	1.90	1.89	1.88	1.79	1.78	1.89	1.92	1.93	1.92	1.94	1.95	1.95	1.78
発寒	測定時間	時間	715	740	716	735	740	715	740	716	733	740	668	739	8697
	月平均値	ppmC	1.98	1.96	1.96	1.91	1.93	1.97	2.00	2.01	2.03	2.04	2.03	2.04	1.99
	6～9時における月平均値	ppmC	2.00	1.97	1.97	1.91	1.94	1.99	2.03	2.03	2.03	2.06	2.04	2.07	2.00
	6～9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
	6～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.15	2.07	2.10	2.00	2.11	2.12	2.32	2.18	2.09	2.28	2.16	2.35
最低値		ppmC	1.97	1.94	1.93	1.84	1.83	1.94	1.94	1.97	1.97	2.00	2.01	2.00	1.83
厚別	測定時間	時間	715	726	711	737	740	715	740	715	733	741	668	739	8680
	月平均値	ppmC	1.98	1.97	1.98	1.92	1.95	2.00	2.02	2.03	2.05	2.06	2.04	2.04	2.00
	6～9時における月平均値	ppmC	2.00	1.98	1.98	1.93	1.96	2.03	2.04	2.04	2.08	2.09	2.07	2.07	2.02
	6～9時測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
	6～9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.09	2.04	2.08	2.06	2.08	2.24	2.26	2.12	2.21	2.37	2.65	2.28
最低値		ppmC	1.96	1.94	1.94	1.85	1.85	1.94	1.96	1.97	1.97	2.00	2.00	2.01	1.85

表 1-2-32 全炭化水素 (THC) 令和3年度 月間値

測定局	項目		令和3年									令和4年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
センター1	測定時間	時間	716	740	714	735	740	716	740	706	739	735	668	738	8687
	月平均値	ppmC	2.06	2.03	2.04	2.00	2.02	2.07	2.10	2.13	2.15	2.16	2.12	2.12	2.08
	6~9時における月平均値	ppmC	2.07	2.03	2.03	2.00	2.02	2.08	2.10	2.13	2.15	2.18	2.13	2.14	2.09
	6~9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	30	28	31	363
	6~9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.22	2.21	2.22	2.24	2.18	2.21	2.27	2.31	2.34	2.55	2.31	2.47
最低値		ppmC	2.00	1.98	1.96	1.92	1.91	1.99	1.99	2.02	2.03	2.04	2.06	2.03	1.91
篠路	測定時間	時間	716	740	716	735	739	716	740	716	734	740	668	739	8699
	月平均値	ppmC	1.98	1.96	1.99	1.94	1.98	2.02	2.04	2.06	2.07	2.07	2.04	2.06	2.02
	6~9時における月平均値	ppmC	1.98	1.97	1.99	1.95	2.00	2.04	2.07	2.09	2.10	2.10	2.07	2.09	2.04
	6~9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	365
	6~9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.09	2.11	2.23	2.18	2.29	2.30	2.24	2.42	2.47	2.44	2.34	2.25
最低値		ppmC	1.93	1.92	1.92	1.83	1.83	1.94	1.96	1.96	1.97	1.97	1.98	1.97	1.83
発寒	測定時間	時間	715	740	716	735	740	715	740	716	733	740	668	739	8697
	月平均値	ppmC	2.05	2.04	2.05	2.00	2.01	2.04	2.09	2.09	2.12	2.14	2.11	2.12	2.07
	6~9時における月平均値	ppmC	2.08	2.04	2.05	2.01	2.02	2.08	2.15	2.14	2.13	2.18	2.14	2.19	2.10
	6~9時測定日数	日	30	31	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	364
	6~9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.31	2.29	2.29	2.17	2.23	2.22	2.64	2.36	2.43	2.64	2.42	2.80
最低値		ppmC	2.00	1.97	1.97	1.91	1.88	1.97	2.01	2.02	2.02	2.02	2.04	2.04	1.88
厚別	測定時間	時間	715	726	711	737	740	715	740	715	733	741	668	739	8680
	月平均値	ppmC	2.05	2.04	2.05	2.01	2.05	2.08	2.10	2.11	2.14	2.16	2.13	2.11	2.08
	6~9時における月平均値	ppmC	2.06	2.05	2.05	2.02	2.05	2.12	2.13	2.14	2.21	2.23	2.20	2.16	2.12
	6~9時測定日数	日	30	30	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	364
	6~9時3時間平均値	最高値	ppmC	2.23	2.19	2.19	2.20	2.21	2.38	2.40	2.36	2.52	2.67	2.98	2.49
最低値		ppmC	1.99	1.97	2.00	1.95	1.93	2.01	2.01	2.01	2.02	2.02	2.04	2.03	1.93

図 1-2-11 非メタン炭化水素 (NMHC) 令和 3 年度 6 時～9 時における月平均値、3 時間平均値の最高値の月間変化

力 浮遊粒子状物質

表 1-2-33 浮遊粒子状物質 (SPM) 令和3年度 年平均値の経年変化 (単位: mg/m³)

測定局	昭和	平成											令和		
	60	2	7	12	17	22	25	26	27	28	29	30	1	2	3
センター	0.026	0.028	0.016	0.015	0.011	0.010	0.009	0.011	0.011	0.012	0.013	0.012	0.010	0.009	0.009
東	0.023	0.025	0.015	0.016	0.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
篠路	0.019	0.022	0.014	0.013	0.011	0.014	0.012	0.014	0.013	0.014	0.013	0.010	0.010	0.009	0.009
発寒	0.023	0.022	0.013	0.014	0.011	0.012	0.011	0.013	0.013	0.013	0.010	0.008	0.009	0.008	0.008
東月寒	0.020	0.020	0.012	0.012	0.009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手稲	0.022	0.023	0.016	0.013	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚別	-	-	-	0.018	0.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北白石	-	-	-	-	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北1条	-	-	-	0.020	0.016	0.016	0.012	0.014	0.013	0.013	0.014	0.013	0.011	0.009	0.009
月寒中央	0.031	0.031	0.014	0.018	0.014	0.015	0.013	0.016	0.015	0.015	0.011	0.013	0.011	0.010	0.009
南14条	-	-	-	-	0.016	0.014	0.012	0.013	0.012	0.012	0.013	0.011	0.010	0.009	0.009
北19条	-	-	-	-	0.012	0.015	0.012	0.014	0.012	0.012	0.011	0.009	0.008	0.008	0.009
東18丁目	-	-	0.021	0.017	0.018	0.014	0.012	0.015	0.013	0.013	0.012	0.012	0.010	0.008	0.008

表 1-2-34 浮遊粒子状物質 (SPM) 令和3年度 日平均値の2%除外値の経年変化 (単位: mg/m³)

測定局	昭和	平成											令和		
	60	2	7	12	17	22	25	26	27	28	29	30	1	2	3
センター	0.054	0.053	0.035	0.035	0.030	0.030	0.026	0.036	0.031	0.028	0.029	0.036	0.024	0.023	0.022
東	0.055	0.053	0.033	0.038	0.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
篠路	0.040	0.047	0.033	0.034	0.030	0.032	0.032	0.041	0.034	0.030	0.033	0.033	0.025	0.022	0.021
発寒	0.054	0.047	0.031	0.035	0.032	0.032	0.027	0.037	0.031	0.030	0.028	0.027	0.022	0.020	0.020
東月寒	0.046	0.044	0.027	0.031	0.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手稲	0.058	0.052	0.041	0.033	0.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
厚別	-	-	-	0.044	0.033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北白石	-	-	-	-	0.042	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北1条	-	-	-	0.044	0.040	0.037	0.033	0.041	0.032	0.029	0.035	0.037	0.024	0.024	0.022
月寒中央	0.065	0.059	0.027	0.040	0.035	0.031	0.033	0.043	0.035	0.033	0.032	0.035	0.024	0.023	0.021
南14条	-	-	-	-	0.049	0.035	0.028	0.039	0.030	0.032	0.030	0.038	0.024	0.022	0.021
北19条	-	-	-	-	0.032	0.041	0.034	0.038	0.033	0.030	0.029	0.031	0.019	0.021	0.020
東18丁目	-	-	0.053	0.040	0.042	0.035	0.032	0.040	0.035	0.030	0.029	0.035	0.022	0.021	0.018

図 1-2-12 浮遊粒子状物質 (SPM) 年平均値及び日平均値の2%除外値の経年変化 (1)

図 1-2-12 浮遊粒子状物質 (SPM) 年平均値及び日平均値の2%除外値の経年変化 (2)

表 1-2-35 浮遊粒子状物質 (SPM) 令和3年度 年間値

測定局	有効測定日数	測定時間	年平均値 mg/m ³	1時間値が0.20mg/m ³ を超えた時間数とその割合		日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数とその割合		1時間値の最高値 mg/m ³	日平均値の最高値 mg/m ³	日平均値の2%除外値 mg/m ³	日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日が2日以上連続したことの有無 有:× 無:○	環境基準の長期的評価による日平均値が0.10mg/m ³ を超えた日数 日
	日	時間		時間	%	日	%					
センター	362	8703	0.009	0	0	0	0	0.097	0.031	0.022	○	0
篠路	363	8715	0.009	0	0	0	0	0.058	0.028	0.021	○	0
発寒	363	8716	0.008	0	0	0	0	0.116	0.027	0.02	○	0
北1条	362	8697	0.009	0	0	0	0	0.078	0.030	0.022	○	0
月寒中央	363	8710	0.009	0	0	0	0	0.095	0.027	0.021	○	0
南14条	363	8711	0.009	0	0	0	0	0.072	0.032	0.021	○	0
北19条	363	8718	0.009	0	0	0	0	0.052	0.028	0.02	○	0
東18丁目	363	8711	0.008	0	0	0	0	0.054	0.024	0.018	○	0

表 1-2-36 浮遊粒子状物質 (SPM) 令和 3 年度 月間値 (1)

測定局	項目		令和 3 年									令和 4 年			年間値
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
センター	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	362
	測定時間	時間	719	717	719	739	743	719	743	707	741	742	671	743	8703
	月平均値	mg/m ³	0.009	0.009	0.010	0.011	0.011	0.008	0.007	0.008	0.007	0.008	0.010	0.010	0.009
	1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値の最高値	mg/m ³	0.033	0.043	0.027	0.056	0.097	0.023	0.026	0.038	0.024	0.041	0.056	0.028	0.097
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.019	0.023	0.016	0.025	0.031	0.014	0.015	0.022	0.014	0.015	0.029	0.018	0.031
篠路	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	719	718	718	742	743	718	742	717	741	743	671	743	8715
	月平均値	mg/m ³	0.009	0.009	0.010	0.011	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.009	0.010	0.009
	1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値の最高値	mg/m ³	0.045	0.046	0.027	0.036	0.054	0.035	0.024	0.032	0.028	0.030	0.058	0.031	0.058
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.023	0.026	0.016	0.021	0.026	0.014	0.014	0.022	0.015	0.016	0.028	0.017	0.028
発寒	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	719	716	719	741	743	719	743	717	742	743	671	743	8716
	月平均値	mg/m ³	0.008	0.008	0.009	0.010	0.010	0.007	0.007	0.007	0.006	0.007	0.009	0.009	0.008
	1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値の最高値	mg/m ³	0.029	0.055	0.022	0.087	0.116	0.030	0.021	0.032	0.024	0.035	0.054	0.028	0.116
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.018	0.023	0.016	0.022	0.026	0.013	0.015	0.022	0.013	0.012	0.027	0.016	0.027
北 1 条	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	29	31	31	28	31	362
	測定時間	時間	719	716	719	740	743	718	743	707	737	742	671	742	8697
	月平均値	mg/m ³	0.010	0.009	0.010	0.011	0.011	0.008	0.007	0.008	0.008	0.008	0.010	0.011	0.009
	1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値の最高値	mg/m ³	0.032	0.049	0.028	0.067	0.078	0.029	0.023	0.035	0.034	0.042	0.060	0.034	0.078
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.020	0.025	0.016	0.025	0.025	0.015	0.015	0.025	0.015	0.015	0.030	0.018	0.030
月寒中央	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	719	714	719	741	743	718	742	717	743	742	670	742	8710
	月平均値	mg/m ³	0.011	0.010	0.010	0.011	0.011	0.008	0.007	0.008	0.007	0.008	0.009	0.010	0.009
	1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値の最高値	mg/m ³	0.037	0.054	0.023	0.045	0.095	0.030	0.025	0.029	0.026	0.036	0.051	0.024	0.095
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.020	0.025	0.015	0.022	0.027	0.016	0.016	0.022	0.014	0.013	0.026	0.016	0.027

表 1-2-36 浮遊粒子状物質 (SPM) 令和 3 年度 月間値 (2)

測定局	項目		令和 3 年									令和 4 年			年間値
			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	
南 14 条	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	719	713	719	741	743	718	743	717	743	742	671	742	8711
	月平均値	mg/m ³	0.010	0.009	0.011	0.011	0.011	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.011	0.011	0.009
	1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値の最高値	mg/m ³	0.047	0.058	0.023	0.066	0.048	0.040	0.021	0.033	0.025	0.037	0.072	0.048	0.072
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.020	0.026	0.015	0.022	0.023	0.014	0.015	0.024	0.015	0.015	0.032	0.021	0.032
北 19 条	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	719	715	719	743	743	719	743	717	743	743	671	743	8718
	月平均値	mg/m ³	0.009	0.009	0.010	0.011	0.010	0.008	0.007	0.007	0.007	0.008	0.010	0.010	0.009
	1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値の最高値	mg/m ³	0.036	0.050	0.022	0.041	0.044	0.023	0.020	0.033	0.027	0.042	0.052	0.031	0.052
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.020	0.026	0.015	0.020	0.023	0.014	0.015	0.024	0.015	0.015	0.028	0.017	0.028
東 18 丁目	有効測定日数	日	30	29	30	31	31	30	31	30	31	31	28	31	363
	測定時間	時間	719	716	717	743	743	718	743	714	743	742	671	742	8711
	月平均値	mg/m ³	0.008	0.008	0.008	0.009	0.008	0.007	0.006	0.007	0.007	0.008	0.010	0.010	0.008
	1 時間値が 0.20mg/m ³ を超えた時間数	時間	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	日平均値が 0.10mg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 時間値の最高値	mg/m ³	0.028	0.042	0.021	0.043	0.054	0.038	0.019	0.028	0.031	0.035	0.047	0.025	0.054
	日平均値の最高値	mg/m ³	0.018	0.021	0.014	0.019	0.018	0.014	0.013	0.020	0.013	0.015	0.024	0.015	0.024

図 1-2-13 浮遊粒子状物質 (SPM) 令和 3 年度 月平均値及び日平均値の最大値の月間変化

キ 微小粒子状物質

表 1-2-37 微小粒子状物質 (PM2.5) 年平均値の経年変化 (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

測定局	平成								令和		
	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
篠路	13.5	11.4	8.9	10.8	7.9	7.6	7.8	8.0	7.3	6.1	6.3
発寒	-	8.2	6.7	9.2	7.9	7.2	6.4	6.8	6.2	5.4	5.6
手稲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.6
厚別	-	-	-	10.1	7.6	6.8	6.7	5.9	5.3	4.9	4.7
北白石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9
駒岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.8	5.0
清田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.9	5.9
北1条	-	11.4	9.7	12.1	9.9	8.8	8.3	7.3	6.8	8.5	8.1
月寒中央	13.9	12.6	10.7	12.7	10.8	10.2	9.0	8.8	7.7	8.2	7.3
南14条	13.8	12.4	10.1	12.3	10.0	9.7	8.4	7.9	7.0	8.1	7.6
北19条	-	11.2	9.8	11.6	9.6	9.2	7.9	7.3	7.7	8.3	8.2
東18丁目	-	-	10.2	11.9	9.8	8.9	7.7	7.3	6.4	5.6	6.5

表 1-2-38 微小粒子状物質 (PM2.5) 日平均値の98%値の経年変化 (単位: $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

測定局	平成								令和		
	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
篠路	28.0	23.3	25.3	33.3	24.0	23.8	21.3	24.8	17.2	15.9	14.1
発寒	-	20.3	22.6	31.6	20.8	20.3	18.0	24.5	16.4	15.3	13.4
手稲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.1
厚別	-	-	-	31.8	22.8	20.6	18.8	21.3	13.3	14.4	11.3
北白石	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.2
駒岡	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.1	12.6
清田	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.1	13.2
北1条	-	23.3	25.8	34.6	23.0	21.0	21.1	26.5	17.3	19.8	16.8
月寒中央	28.0	25.0	27.8	35.7	25.3	24.5	21.9	28.2	17.5	19.5	15.1
南14条	30.6	23.6	25.0	34.7	23.5	25.1	21.5	27.5	18.4	19.0	16.4
北19条	-	23.8	27.1	32.7	25.6	23.5	21.2	26.2	18.2	19.8	17.1
東18丁目	-	-	27.6	31.3	23.8	22.8	20.5	23.1	15.9	15.1	13.1

図 1-2-14 微小粒子状物質 (PM2.5) 年平均値及び日平均値の98%値の経年変化 (1)

図 1-2-14 微小粒子状物質 (PM2.5) 年平均値及び日平均値の98%値の経年変化 (2)

表 1-2-39 微小粒子状物質 (PM2.5) 令和3年度 年間値

測定局	有効測定日数	年平均値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	日平均値の 年間98%値 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	日平均値が 35 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ を 超えた日数と その割合	
	日			目	%
篠路	355	6.3	14.1	0	0
発寒	355	5.6	13.4	0	0
手稲	355	5.6	13.1	0	0
厚別	355	4.7	11.3	0	0
北白石	355	5.9	14.2	0	0
駒岡	354	5	12.6	0	0
清田	355	5.9	13.2	0	0
北1条	354	8.1	16.8	0	0
月寒中央	354	7.3	15.1	0	0
南14条	354	7.6	16.4	0	0
北19条	355	8.2	17.1	0	0
東18丁目	355	6.5	13.1	0	0

表 1-2-40 微小粒子状物質 (PM2.5) 令和3年度 月間値 (1)

測定局	項目		令和3年									令和4年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
篠路	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	28	31	355
	月平均値	μg/m ³	6.8	6.1	7.5	6.6	6.4	4.8	5.0	4.8	5.4	6.7	7.6	8.0	6.3
	日平均値の最高値	μg/m ³	14.9	17.7	12.4	14	13.3	8.2	10.3	16.8	10.9	15.3	22.5	14.5	22.5
	日平均値が35μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
発寒	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	28	31	355
	月平均値	μg/m ³	6.0	5.5	6.5	6.5	6.2	4.3	4.3	4.6	4.5	5.5	7.1	6.7	5.6
	日平均値の最高値	μg/m ³	13.4	16.5	11.1	15.3	12.3	8.1	8.8	17.3	9.5	11.4	23.3	12.9	23.3
	日平均値が35μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手稲	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	28	31	355
	月平均値	μg/m ³	5.4	5.1	6.5	6.3	6.1	4.2	4.4	4.5	4.7	6.0	6.9	6.8	5.6
	日平均値の最高値	μg/m ³	12.8	16.0	10.8	14.5	12.3	6.9	9.0	18.7	11.2	12.7	23.3	14.1	23.3
	日平均値が35μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
厚別	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	28	31	355
	月平均値	μg/m ³	4.5	4.6	5.9	5.0	5.1	3.8	3.7	3.9	4.5	4.9	5.8	5.3	4.7
	日平均値の最高値	μg/m ³	11.6	15.2	9.8	11.2	11.7	6.7	7.8	15.8	10.4	8.8	17.3	11.3	17.3
	日平均値が35μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北白石	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	28	31	355
	月平均値	μg/m ³	5.9	5.7	6.5	6.1	6.3	4.6	4.7	4.7	5.2	6.7	7.8	7.3	5.9
	日平均値の最高値	μg/m ³	12.5	17.1	10.3	12.8	12.7	7.8	9.1	17.4	10.2	15.6	21.5	12.5	21.5
	日平均値が35μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
駒岡	有効測定日数	日	28	30	28	31	29	30	29	30	31	29	28	31	354
	月平均値	μg/m ³	5.5	4.9	6.4	5.8	6.3	4.5	3.7	4.4	3.7	3.5	5.6	5.6	5.0
	日平均値の最高値	μg/m ³	10.7	16.8	10.2	14.0	12.8	9.4	9.5	16.8	9.0	7.2	21.5	10.7	21.5
	日平均値が35μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
清田	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	28	31	355
	月平均値	μg/m ³	6.3	6.1	7.5	6.5	6.3	4.8	4.7	4.9	4.8	5.2	7.1	6.6	5.9
	日平均値の最高値	μg/m ³	13.2	17.6	11.6	13.8	13.3	9.3	10.0	15.3	10.9	10.9	21.1	12.0	21.1
	日平均値が35μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
北1条	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	29	31	29	28	31	354
	月平均値	μg/m ³	8.9	7.8	8.6	8.3	8.2	6.1	6.6	7.3	7.1	8.2	10.1	10.1	8.1
	日平均値の最高値	μg/m ³	18.0	23.1	13.1	17.3	15.3	10.8	11.0	23.2	14.8	14.8	28.9	16.8	28.9
	日平均値が35μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
月寒中央	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	27	31	354
	月平均値	μg/m ³	8.8	7.3	7.8	7.7	7.6	5.9	6.0	6.4	7.0	7.9	7.9	7.0	7.3
	日平均値の最高値	μg/m ³	15.1	20.1	12.3	16.2	14.9	11.1	11.7	20.7	13.7	13.6	21.5	12.2	21.5
	日平均値が35μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
南14条	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	28	30	31	29	28	31	354
	月平均値	μg/m ³	8.1	6.7	8.8	8.6	8.5	6.6	5.6	6.4	6.9	7.4	9.6	8.7	7.6
	日平均値の最高値	μg/m ³	14.6	19.5	13.0	16.5	15.3	11.6	11.6	20.9	14.7	14.7	29.8	18.5	29.8
	日平均値が35μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 1-2-40 微小粒子状物質 (PM2.5) 令和3年度 月間値 (2)

測定局	項目		令和3年									令和4年			年間値
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
北 19 条	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	28	31	355
	月平均値	μg/m ³	8.9	7.4	8.6	8.4	8.0	6.7	6.6	6.5	7.6	9.1	10.9	10.5	8.2
	日平均値の最高値	μg/m ³	15.4	21.2	12.8	17.1	15.1	10.9	13.0	19.3	13.7	15.6	27.9	17.7	27.9
	日平均値が 35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
東 18 丁 目	有効測定日数	日	28	31	28	31	29	30	29	30	31	29	28	31	355
	月平均値	μg/m ³	6.3	6.1	7.4	6.8	6.5	5.5	5.4	5.2	5.7	7.3	8.0	7.9	6.5
	日平均値の最高値	μg/m ³	12.6	16.6	11.7	13.5	13.1	9.0	9.4	16.2	10.7	14.0	20.2	12.8	20.2
	日平均値が 35 μg/m ³ を超えた日数	日	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

図 1-2-15 微小粒子状物質 (PM2.5) 令和3年度 月平均値及び日平均値の最大値の月間変化(1)

図 1-2-15 微小粒子状物質 (PM2.5) 令和3年度 月平均値及び日平均値の最大値の月間変化(2)

表 1-2-41 微小粒子状物質 (PM2.5) 成分分析結果 令和3年度春季 (1)

採取日		5/13	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	検出 下限値	定量 下限値	
質量濃度 (μg/m ³)		10.5	9.1	5.9	5.4	6.3	7.1	6.3	-	-	
イオン成分 (μg/m ³)	Cl ⁻ 塩化物イオン	0.0317	0.0521	0.0148	0.196	0.0054	0.0102	0.0036	0.0013	0.0044	
	NO ₃ ⁻ 硝酸イオン	1.29	0.185	0.345	0.172	0.276	0.168	0.184	0.0017	0.0056	
	SO ₄ ²⁻ 硫酸イオン	1.63	1.81	1.22	0.452	1.14	1.82	1.39	0.005	0.018	
	Na ⁺ ナトリウムイオン	0.14	0.121	0.0943	0.0676	0.0366	0.0369	0.0243	0.0018	0.0061	
	NH ₄ ⁺ アンモニウムイオン	0.848	0.664	0.569	0.175	0.479	0.704	0.574	0.007	0.023	
	K ⁺ カリウムイオン	0.0266	0.0176	0.0104	0.0081	0.0077	0.0063	0.0106	0.0009	0.0028	
	Mg ²⁺ マグネシウムイオン	0.0124	0.0108	0.0071	0.005	0.0034	0.0031	0.0027	0.0009	0.003	
	Ca ²⁺ カルシウムイオン	0.0263	0.0157	0.0138	0.0223	0.0115	0.0075	0.0109	0.0021	0.007	
無機元素成分 (ng/m ³)	Na ナトリウム	160	141	101	68	43	49	32	5	15	
	Al アルミニウム	36.9	28.8	10.5	15.5	12.9	10.5	11.7	2.7	9.1	
	K カリウム	42	32	30	9	9	10	28	4	12	
	Ca カルシウム	44	25	12	37	14	14	37	6	19	
	Sc スカンジウム	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	0.022	0.072	
	Ti チタン	4.4	2.8	1.1	1.7	1.5	1.2	1.4	0.3	1.1	
	Vバナジウム	0.497	0.941	0.614	0.405	0.699	0.28	0.989	0.013	0.044	
	Crクロム	0.27	<0.17	0.2	0.69	0.17	<0.17	0.28	0.17	0.56	
	Mnマンガン	2.21	1.02	0.58	1.13	1.29	0.79	1.63	0.07	0.24	
	Fe鉄	48	31	11	17	19	19	24	9	30	
	Coコバルト	0.0234	0.0213	0.0115	0.0105	0.0192	0.0097	0.0238	0.0025	0.0082	
	Niニッケル	0.39	0.59	0.33	0.4	0.43	0.19	0.65	0.13	0.43	
	Cu銅	1.78	0.78	0.53	1.05	0.75	0.88	1.03	0.28	0.94	
	Zn亜鉛	13.2	4.4	3.9	5.1	3	4.7	6.3	0.6	2.1	
	Asヒ素	0.295	0.306	0.18	0.095	0.097	0.127	0.232	0.026	0.085	
	Seセレン	0.37	0.28	0.17	0.13	0.16	0.15	0.15	0.09	0.28	
	Rbルビジウム	0.113	0.108	0.046	0.029	0.037	0.033	0.047	0.008	0.026	
	Moモリブデン	0.36	0.11	0.16	0.1	0.12	0.11	0.23	0.06	0.21	
	Sbアンチモン	0.54	0.187	0.146	0.175	0.232	0.177	0.238	0.022	0.073	
	Csセシウム	0.0089	0.013	0.005	0.032	0.0038	0.046	0.0059	0.0009	0.0029	
	Baバリウム	3.09	1.59	1.24	1.61	1.75	1.7	2.15	0.18	0.59	
	Laランタン	0.0268	0.022	0.0122	0.0114	0.0112	0.0079	0.0119	0.0029	0.0096	
	Ceセリウム	0.0549	0.0381	0.0208	0.0246	0.0191	0.0155	0.0193	0.0019	0.0064	
	Smサマリウム	0.004	0.004	0.0027	0.0027	0.0029	0.0027	0.0028	0.0021	0.007	
	Hfハフニウム	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	0.024	0.079	
	Wタンクステン	0.17	0.17	0.12	0.04	<0.04	<0.04	0.14	0.04	0.12	
	Taタンタル	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.016	
	Thトリウム	0.0074	0.0061	0.0028	0.004	0.0028	0.0025	0.0029	0.0017	0.0058	
	Pb鉛	1.25	1.09	0.737	0.509	0.382	0.561	0.938	0.014	0.048	
	Cdカドミウム	0.053	0.035	0.027	0.013	0.016	0.017	0.116	0.004	0.014	
	炭素成分 (μg/m ³)	OC	2.3	1.62	1.11	1.5	1.71	1.37	1.97	-	-
		OC1	0.267	0.097	<0.011	0.134	0.094	0.07	0.088	0.011	0.038
OC2		0.917	0.682	0.471	0.683	0.837	0.679	0.911	0.015	0.052	
OC3		0.361	0.206	0.188	0.331	0.234	0.136	0.29	0.028	0.092	
OC4		0.228	0.184	0.121	0.191	0.181	0.124	0.231	0.022	0.073	
OCpyro		0.53	0.45	0.33	0.16	0.36	0.36	0.45	0.03	0.12	
EC		0.804	0.238	0.328	0.436	0.337	0.279	0.397	-	-	
EC1		0.498	0.264	0.202	0.18	0.213	0.185	0.244	0.012	0.039	
EC2		0.703	0.346	0.357	0.282	0.342	0.314	0.446	0.019	0.062	
EC3		0.133	0.078	0.099	0.134	0.142	0.14	0.157	0.009	0.031	
特殊成分 (ng/m ³)	レボグルコサン	13.3	2.02	2.64	4.15	1.72	1.61	2.08	0.05	0.17	

※測定値は、当日10時から翌日10時までのもの(質量濃度も当日10時～翌日10時の平均値)を記載。

※測定結果の表記については、環境省への報告要領に基づき記載。詳細は以下のとおり。

- ・質量濃度は小数第1位まで記載。(小数第1位の値が「0」である場合、その「0」は記載しない。
(例：測定値「4.0」を「4.0」と表示せず、「4」と表示する。)
- ・質量濃度以外の項目は有効数字3桁で記載。
ただし、定量下限値の有効数字2桁目の位までの桁数とし、小数点以下の末尾の値が「0」である場合、末尾の「0」は記載しない。
(例：定量下限値「0.19」の場合、測定値が「0.0604」であっても「0.0604」と表記せず、「0.06」と表記する。)
- ・検出下限値未満の場合は、検出下限値に不等号("<")を付けて示す。
- ・欠測値がある場合には、「zzz」で示す。

表 1-2-41 微小粒子状物質 (PM2.5) 成分分析結果 令和3年度春季 (2)

採取日			5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	検出 下限値	定量 下限値	
質量濃度 (μg/m ³)			4.2	5.5	6.3	7.4	7.7	9.2	10.8	-	-	
イオン成分 (μg/m ³)	Cl ⁻	塩化物イオン	0.006	0.041	0.0499	0.0553	0.0561	0.0376	0.75	0.0013	0.0044	
	NO ₃ ⁻	硝酸イオン	0.184	0.715	0.607	0.842	0.26	0.334	1.83	0.0017	0.0056	
	SO ₄ ²⁻	硫酸イオン	0.603	0.574	1.33	2.28	0.849	1.41	0.0761	0.005	0.018	
	Na ⁺	ナトリウムイオン	0.0101	0.0439	0.0374	0.0777	0.0966	0.0837	0.865	0.0018	0.0061	
	NH ₄ ⁺	アンモニウムイオン	0.269	0.392	0.689	1.06	0.313	0.563	0.0215	0.007	0.023	
	K ⁺	カリウムイオン	0.0087	0.0063	0.0065	0.0122	0.02	0.022	0.0098	0.0009	0.0028	
	Mg ²⁺	マグネシウムイオン	0.002	0.0032	0.0018	0.0067	0.0092	0.0101	0.0338	0.0009	0.003	
	Ca ²⁺	カルシウムイオン	0.0415	0.0071	0.0051	0.0119	0.0388	0.0328	0.021	0.0021	0.007	
無機元素成分 (ng/m ³)	Na	ナトリウム	15	55	20	79	99	94	88	5	15	
	Al	アルミニウム	11.3	5.3	3.2	9.9	96.4	112	159	2.7	9.1	
	K	カリウム	11	5	7	27	45	60	70	4	12	
	Ca	カルシウム	13	15	9	19	45	57	60	6	19	
	Sc	スカンジウム	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	0.022	0.072
	Ti	チタン	1.4	1	0.6	1.4	6.9	8.3	9.9	0.3	1.1	
	V	バナジウム	0.174	0.339	0.661	0.279	0.245	0.369	0.771	0.013	0.044	
	Cr	クロム	<0.17	<0.17	<0.17	0.19	0.22	0.38	0.39	0.17	0.56	
	Mn	マンガン	0.87	0.54	0.37	1.94	3.44	2.77	3.55	0.07	0.24	
	Fe	鉄	16	10	<9	23	68	89	107	9	30	
	Co	コバルト	0.008	0.0079	0.0088	0.0107	0.027	0.0345	0.0437	0.0025	0.0082	
	Ni	ニッケル	<0.13	0.18	0.35	0.28	0.18	<0.45	0.43	0.13	0.43	
	Cu	銅	0.88	0.99	0.78	0.92	1.47	1.36	1.57	0.28	0.94	
	Zn	亜鉛	4.6	4.7	4.7	5.7	6	7.4	11.8	0.6	2.1	
	As	ヒ素	0.137	0.068	0.09	0.467	0.347	0.918	0.933	0.026	0.085	
	Se	セレン	<0.09	<0.09	0.13	0.24	0.29	0.14	0.16	0.09	0.28	
	Rb	ルビジウム	0.04	0.02	0.019	0.057	0.198	0.263	0.32	0.008	0.026	
	Mo	モリブデン	0.13	0.18	0.16	0.29	0.12	0.38	0.29	0.06	0.21	
	Sb	アンチモン	0.248	0.293	0.251	0.608	0.761	0.387	0.296	0.022	0.073	
	Cs	セシウム	0.003	0.0014	0.0011	0.0062	0.02	0.03	0.0419	0.0009	0.0029	
	Ba	バリウム	1.56	1.9	1.55	1.63	2.63	2.99	2.83	0.18	0.59	
	La	ランタン	0.0097	0.006	0.0054	0.009	0.051	0.0602	0.0799	0.0029	0.0096	
	Ce	セリウム	0.0197	0.0113	0.009	0.0167	0.105	0.125	0.168	0.0019	0.0064	
	Sm	サマリウム	0.0027	<0.0021	0.0022	0.0028	0.0084	0.0109	0.0136	0.0021	0.007	
	Hf	ハフニウム	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	<0.024	0.024	0.079	
	W	タンガステン	0.04	0.07	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.04	0.12	
	Ta	タンタル	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	0.016	
	Th	トリウム	0.003	<0.0017	<0.0017	0.0027	0.0172	0.0188	0.0265	0.0017	0.0058	
	Pb	鉛	0.891	0.399	0.351	0.709	1.28	2.41	2.46	0.014	0.048	
	Cd	カドミウム	0.017	0.016	0.019	1.76	0.511	0.062	0.057	0.004	0.014	
	炭素成分 (μg/m ³)	OC	有機炭素	1.23	1.19	1.27	1.21	1.34	1.79	1.21	-	-
		OC1		0.039	0.02	<0.011	<0.011	0.053	0.096	<0.011	0.011	0.038
OC2		0.621		0.583	0.628	0.582	0.665	0.852	0.571	0.015	0.052	
OC3		0.212		0.234	0.189	0.156	0.235	0.247	0.171	0.028	0.092	
OC4		0.128		0.118	0.133	0.119	0.136	0.183	0.125	0.022	0.073	
OCpyro		炭化補正值	0.23	0.23	0.32	0.35	0.25	0.41	0.34	0.03	0.12	
EC		元素状炭素	0.391	0.334	0.308	0.444	0.408	0.389	0.456	-	-	
EC1			0.158	0.178	0.181	0.248	0.193	0.275	0.246	0.012	0.039	
EC2			0.286	0.274	0.316	0.445	0.346	0.407	0.457	0.019	0.062	
EC3			0.177	0.112	0.131	0.101	0.119	0.117	0.093	0.009	0.031	
特殊成分 (ng/m ³)	レボグルコサン	6.95	7.03	6.13	4.93	5.78	5.06	6.05	0.05	0.17		

※測定値は、当日10時から翌日10時までのもの(質量濃度も当日10時~翌日10時の平均値)を記載。

※測定結果の表記については、環境省への報告要領に基づき記載。詳細は以下のとおり。

- ・質量濃度は小数第1位まで記載。(小数第1位の値が「0」である場合、その「0」は記載しない。
(例:測定値「4.0」を「4.0」と表示せず、「4」と表示する。)
- ・質量濃度以外の項目は有効数字3桁で記載。
ただし、定量下限値の有効数字2桁目の位までの桁数とし、小数点以下の末尾の値が「0」である場合、末尾の「0」は記載しない。
(例:定量下限値「0.19」の場合、測定値が「0.0604」であっても「0.0604」と表記せず、「0.06」と表記する。)
- ・検出下限値未満の場合は、検出下限値に不等号("<")を付けて示す。
- ・欠測値がある場合には、"zzz"で示す。

表 1-2-42 微小粒子状物質 (PM2.5) 成分分析結果 令和3年度夏季 (1)

採取日		7/23	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	検出 下限値	定量 下限値		
質量濃度 (μg/m ³)		10.2	13.1	12.8	17.7	10.3	7.9	5.5	-	-		
イオン成分 (μg/m ³)	Cl ⁻	塩化物イオン	<0.0018	0.0022	0.0034	0.0039	0.0152	0.0042	0.0035	0.0018	0.0059	
	NO ₃ ⁻	硝酸イオン	0.0109	0.0141	0.0153	0.0572	0.0546	0.0186	0.0147	0.0009	0.0031	
	SO ₄ ²⁻	硫酸イオン	3.08	4.07	3.27	3.56	2.39	1.72	1.41	0.0023	0.077	
	Na ⁺	ナトリウムイオン	0.0147	0.0249	0.00492	0.0422	0.169	0.199	0.07	0.0013	0.0043	
	NH ₄ ⁺	アンモニウムイオン	1.18	1.5	1.21	1.39	0.779	0.413	0.436	0.0017	0.0057	
	K ⁺	カリウムイオン	0.0303	0.0372	0.0282	0.0491	0.0294	0.0199	0.0106	0.00023	0.00078	
	Mg ²⁺	マグネシウムイオン	0.0017	0.0037	0.0045	0.0042	0.0146	0.0178	0.0051	0.0011	0.0035	
	Ca ²⁺	カルシウムイオン	<0.008	<0.008	<0.008	0.01	0.016	0.028	<0.008	0.008	0.025	
無機元素成分 (ng/m ³)	Na	ナトリウム	19	29	52	47	164	190	76	4	14	
	Al	アルミニウム	7.7	7.1	6.3	13.6	11.3	5.4	3.3	1.5	4.9	
	K	カリウム	24	32	26	64	44	33	10	5	18	
	Ca	カルシウム	15	15	10	13	24	17	13	6	18	
	Sc	スカンジウム	0.08	<0.04	0.06	0.16	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.12	
	Ti	チタン	0.81	0.9	0.71	1.23	1.32	0.77	0.58	0.23	0.76	
	V	バナジウム	0.368	0.36	0.423	0.344	0.268	0.215	0.389	0.005	0.018	
	Cr	クロム	<0.16	<0.16	<0.16	<0.16	0.21	<0.16	<0.16	0.16	0.52	
	Mn	マンガン	0.495	0.649	0.529	0.89	1.47	1.12	0.695	0.029	0.097	
	Fe	鉄	20	17	15	24	24	19	13	8	26	
	Co	コバルト	0.0081	0.0107	0.0826	0.0111	0.0103	0.0075	0.0088	0.0021	0.0071	
	Ni	ニッケル	0.23	0.22	0.27	0.21	0.21	0.14	0.25	0.04	0.13	
	Cu	銅	1	1.2	0.7	1.4	1.2	0.7	0.6	0.4	1.2	
	Zn	亜鉛	4.52	4.79	3.77	7.8	6.39	5.34	3.63	0.29	0.96	
	As	ヒ素	0.2	0.31	0.25	0.22	0.17	0.09	0.04	0.03	0.11	
	Se	セレン	<0.15	0.2	<0.15	0.26	<0.15	<0.15	<0.15	0.15	0.51	
	Rb	ルビジウム	0.0473	0.064	0.0518	0.0966	0.0577	0.0371	0.0242	0.0029	0.0095	
	Mo	モリブデン	0.11	0.12	0.08	0.08	0.11	0.07	0.1	0.07	0.23	
	Sb	アンチモン	0.186	0.201	0.159	0.321	0.252	0.134	0.1	0.019	0.063	
	Cs	セシウム	0.0055	0.0075	0.006	0.0072	0.0062	0.0058	0.0045	0.0016	0.0054	
	Ba	バリウム	2.81	3.85	1.87	3.1	2.22	1.41	1.32	0.08	0.26	
	La	ランタン	0.0055	0.0082	<0.0069	0.0079	0.0066	0.0068	0.0039	0.0011	0.0037	
	Ce	セリウム	0.0116	0.0143	0.0123	0.0168	0.0152	0.0098	0.0074	0.0014	0.046	
	Sm	サマリウム	<0.0022	<0.0022	<0.0022	<0.0022	<0.0022	<0.0022	<0.0022	0.0022	0.0072	
	Hf	ハフニウム	<0.03	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.11	
	W	タングステン	0.24	0.18	0.17	0.05	0.06	0.14	0.19	0.04	0.14	
	Ta	タンタル	0.0064	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.0027	<0.0025	0.0025	0.0084	
	Th	トリウム	0.0014	0.0013	0.0014	0.0014	0.0015	0.008	0.0008	0.0007	0.0025	
	Pb	鉛	0.541	0.765	0.531	0.557	0.425	0.535	0.256	0.011	0.038	
	Cd	カドミウム	0.025	0.045	0.045	0.039	0.022	0.021	0.015	0.004	0.012	
	炭素成分 (μg/m ³)	OC	有機炭素	2.55	2.9	2.48	4.95	2.26	1.42	1.07	-	-
		OC1		0.028	0.044	<0.022	0.089	0.066	<0.022	<0.022	0.022	0.075
OC2		1.32		1.43	0.993	2.2	0.859	0.726	0.61	0.026	0.085	
OC3		0.296		0.297	0.368	0.779	0.411	0.238	0.147	0.022	0.073	
OC4		0.228		0.237	0.237	0.413	0.253	0.189	0.118	0.023	0.077	
OCpyro		炭化補正值	0.675	0.896	0.886	1.47	0.674	0.263	0.199	0.014	0.046	
EC		元素状炭素	0.398	0.402	0.381	0.914	0.554	0.432	0.379	-	-	
EC1			0.367	0.466	0.54	1.47	0.578	0.237	0.163	0.007	0.024	
EC2			0.57	0.699	0.619	0.798	0.579	0.347	0.28	0.007	0.025	
EC3	0.136		0.133	0.108	0.116	0.071	0.111	0.135	0.003	0.01		
特殊成分 (ng/m ³)	レボグルコサン	2.78	3.44	2.32	6.95	3.78	0.93	0.85	0.06	0.19		

※測定値は、当日 10 時から翌日 10 時までのもの (質量濃度も当日 10 時～翌日 10 時の平均値) を記載。

※測定結果の表記については、環境省への報告要領に基づき記載。詳細は以下のとおり。

・質量濃度は小数第 1 位まで記載。(小数第 1 位の値が「0」である場合、その「0」は記載しない。)

(例：測定値「4.0」を「4.0」と表示せず、「4」と表示する。)

・質量濃度以外の項目は有効数字 3 桁で記載。

ただし、定量下限値の有効数字 2 桁目の位までの桁数とし、小数点以下の末尾の値が「0」である場合、末尾の「0」は記載しない。

(例：定量下限値「0.19」の場合、測定値が「0.0604」であっても「0.0604」と表記せず、「0.06」と表記する。)

・検出下限値未満の場合は、検出下限値に不等号("<")を付けて示す。

・欠測値がある場合には、「zzz」で示す。

表 1-2-42 微小粒子状物質 (PM2.5) 成分分析結果 令和3年度夏季 (2)

採取日		7/30	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	検出 下限値	定量 下限値
質量濃度 (μg/m ³)		5.1	8.1	4.7	6.7	10.4	9.9	13.8	-	-
イオン成分 (μg/m ³)	Cl ⁻ 塩化物イオン	0.0025	0.003	0.0021	0.0019	0.0031	0.0026	0.003	0.0018	0.0059
	NO ₃ ⁻ 硝酸イオン	0.0112	0.0463	0.0302	0.0223	0.0709	0.0513	0.0432	0.0009	0.0031
	SO ₄ ²⁻ 硫酸イオン	1.36	1.38	0.786	1.71	2.75	2.5	5.02	0.0023	0.0077
	Na ⁺ ナトリウムイオン	0.0533	0.0758	0.0161	0.0094	0.0575	0.0246	0.0755	0.0013	0.0043
	NH ₄ ⁺ アンモニウムイオン	0.422	0.432	0.267	0.637	1.04	0.942	1.81	0.0017	0.0057
	K ⁺ カリウムイオン	0.0125	0.0495	0.0207	0.0149	0.0285	0.0266	0.0333	0.00023	0.00078
	Mg ²⁺ マグネシウムイオン	0.0045	0.0091	0.002	0.0014	0.0053	0.0027	0.0075	0.0011	0.0035
	Ca ²⁺ カルシウムイオン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	0.012	0.01	0.013	0.008	0.025
無機元素成分 (ng/m ³)	Na ナトリウム	60	82	17	14	58	25	71	4	14
	Al アルミニウム	4	13	3.7	5	9.3	8.1	12.6	1.5	4.9
	K カリウム	19	50	12	13	23	29	35	5	18
	Ca カルシウム	10	20	7	12	19	11	19	6	18
	Sc スカンジウム	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.04	<0.04	<0.04	0.04	0.12
	Ti チタン	0.62	1.22	0.5	0.79	1.36	1.47	1.29	0.23	0.76
	Vバナジウム	0.167	0.205	0.225	0.384	0.738	0.379	0.637	0.005	0.018
	Crクロム	<0.16	0.17	<0.16	<0.16	0.3	0.29	0.34	0.16	0.52
	Mnマンガン	0.415	0.867	0.47	0.584	1.81	1.87	2.08	0.029	0.097
	Fe鉄	14	31	14	14	30	29	29	8	26
	Coコバルト	0.0054	0.0071	0.0046	0.0096	0.104	0.0138	0.0196	0.0021	0.0071
	Niニッケル	0.11	0.13	0.13	0.24	0.48	0.29	0.48	0.04	0.13
	Cu銅	1	1.8	0.7	1.3	1.5	1.5	1.3	0.4	1.2
	Zn亜鉛	2.77	4.86	1.4	3.2	8.6	6.36	7.79	0.29	0.96
	Asヒ素	0.12	0.1	0.04	0.21	0.31	0.37	0.56	0.03	0.11
	Seセレン	<0.15	<0.15	0.16	<0.15	0.31	0.28	0.58	0.15	0.51
	Rbルビジウム	0.0195	0.054	0.0217	0.0206	0.0613	0.0539	0.0853	0.0029	0.0095
	Moモリブデン	0.11	0.17	0.14	<0.07	0.21	0.18	0.21	0.07	0.23
	Sbアンチモン	0.142	0.412	0.125	0.223	0.37	0.33	0.313	0.019	0.063
	Csセシウム	0.0039	0.0061	0.0059	0.0047	0.0124	0.0095	0.014	0.0016	0.0054
	Baバリウム	1.94	6.07	1.9	2.47	2.94	3.03	2.48	0.08	0.26
	Laランタン	0.0027	0.0063	0.0017	0.0046	0.0156	0.0138	0.0189	0.0011	0.0037
	Ceセリウム	0.0077	0.0156	0.0059	0.0107	0.0194	0.0173	0.021	0.0014	0.0046
	Smサマリウム	<0.0022	<0.0022	<0.0022	<0.0022	<0.0022	<0.0022	<0.0022	0.0022	0.0072
	Hfハフニウム	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.11
	Wタンクステン	0.06	0.07	<0.04	0.36	0.43	0.35	0.4	0.04	0.14
	Taタンタル	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.0025	0.0084
	Thトリウム	<0.0007	0.0013	<0.0007	0.0008	0.0014	0.0012	0.0023	0.0007	0.0025
	Pb鉛	0.198	0.616	0.393	1.15	1.31	1.16	1.53	0.011	0.038
	Cdカドミウム	0.013	0.029	0.01	0.04	0.064	0.047	0.061	0.004	0.012
炭素成分 (μg/m ³)	OC	2.23	2.68	2.17	2.85	3.02	2.82	2.44	-	-
	OC1	<0.022	<0.022	<0.022	<0.022	0.036	0.029	0.043	0.022	0.075
	OC2	1.73	1.54	1.4	2.06	1.61	1.69	1.25	0.026	0.085
	OC3	0.188	0.434	0.321	0.249	0.393	0.342	0.236	0.022	0.073
	OC4	0.126	0.267	0.208	0.178	0.265	0.215	0.172	0.023	0.077
	OCpyro 炭化補正值	0.185	0.443	0.245	0.361	0.714	0.547	0.735	0.014	0.046
	EC	0.36	0.48	0.428	0.55	0.803	0.91	0.579	-	-
	EC1	0.152	0.336	0.199	0.216	0.505	0.411	0.471	0.007	0.024
	EC2	0.268	0.497	0.307	0.489	0.896	0.919	0.751	0.007	0.025
EC3	0.125	0.09	0.167	0.206	0.116	0.127	0.092	0.003	0.01	
特殊成分 (ng/m ³)	レボグルコサン	1.02	5.35	3.93	1.85	3.93	5.73	4.56	0.06	0.19

※測定値は、当日 10 時から翌日 10 時までのもの（質量濃度も当日 10 時～翌日 10 時の平均値）を記載。

※測定結果の表記については、環境省への報告要領に基づき記載。詳細は以下のとおり。

・質量濃度は小数第 1 位まで記載。（小数第 1 位の値が「0」である場合、その「0」は記載しない。）

（例：測定値「4.0」を「4.0」と表示せず、「4」と表示する。）

・質量濃度以外の項目は有効数字 3 桁で記載。

ただし、定量下限値の有効数字 2 桁目の位までの桁数とし、小数点以下の末尾の値が「0」である場合、末尾の「0」は記載しない。

（例：定量下限値「0.19」の場合、測定値が「0.0604」であっても「0.0604」と表記せず、「0.06」と表記する。）

・検出下限値未満の場合は、検出下限値に不等号（"<"）を付けて示す。

・欠測値がある場合には、「zzz」で示す。

表 1-2-43 微小粒子状物質 (PM2.5) 成分分析結果 令和3年度秋季 (1)

採取日			10/21	10/22	10/23	10/24	10/25	10/26	10/27	検出 下限値	定量 下限値
質量濃度 (μg/m ³)			3.2	4.5	7	12.1	11.5	11.9	9.1	-	-
イオン成分 (μg/m ³)	Cl ⁻	塩化物イオン	0.2	0.0867	0.0591	0.0854	0.107	0.149	0.0669	0.0013	0.0042
	NO ₃ ⁻	硝酸イオン	0.415	0.22	0.513	0.792	0.888	1.93	0.532	0.0024	0.0081
	SO ₄ ²⁻	硫酸イオン	0.258	0.522	0.93	1.3	1.65	1.9	1.92	0.0025	0.0083
	Na ⁺	ナトリウムイオン	0.0484	0.0237	0.0355	0.095	0.0929	0.0558	0.0576	0.0006	0.002
	NH ₄ ⁺	アンモニウムイオン	0.25	0.273	0.476	0.632	0.808	1.23	0.834	0.0011	0.0036
	K ⁺	カリウムイオン	0.0149	0.0213	0.0778	0.171	0.087	0.0438	0.0363	0.0004	0.0015
	Mg ²⁺	マグネシウムイオン	0.003	0.0017	0.0028	0.0077	0.0095	0.0055	0.0044	0.0003	0.0011
Ca ²⁺	カルシウムイオン	0.0064	0.0077	0.0117	0.0162	0.0203	0.195	0.0158	0.0016	0.0052	
無機元素成分 (ng/m ³)	Na	ナトリウム	80	16	52	115	122	72	76	7	23
	Al	アルミニウム	<5	<5	13	13	29	23	22	5	17
	K	カリウム	16	<6	79	165	101	44	40	6	20
	Ca	カルシウム	20	4	17	21	40	24	22	4	12
	Sc	スカンジウム	<0.013	0.016	<0.013	<0.013	<0.013	0.016	0.017	0.013	0.044
	Ti	チタン	1.82	0.84	2.5	3.22	3.55	3.3	2.45	0.27	0.92
	V	バナジウム	0.076	0.076	0.082	0.14	0.316	0.455	0.544	0.011	0.035
	Cr	クロム	0.26	0.16	0.17	0.27	0.55	0.39	0.45	0.06	0.2
	Mn	マンガン	0.88	0.61	0.74	1.12	2.34	2.43	2.28	0.04	0.13
	Fe	鉄	25.4	11.6	37.3	45.6	64.2	52.1	53.2	2.3	7.7
	Co	コバルト	0.005	<0.005	0.012	0.014	0.055	0.02	0.027	0.005	0.016
	Ni	ニッケル	<0.15	<0.15	<0.15	<0.15	0.39	0.38	0.44	0.15	0.51
	Cu	銅	1.55	0.67	2.56	3.16	3.08	3.13	1.96	0.18	0.6
	Zn	亜鉛	4.8	2.6	7.8	10.9	12	9.1	9.2	0.7	2.3
	As	ヒ素	0.029	0.053	0.173	0.297	2.32	0.347	0.549	0.007	0.022
	Se	セレン	<0.13	<0.13	<0.13	0.2	0.42	0.25	0.38	0.13	0.42
	Rb	ルビジウム	0.09	0.034	0.206	0.311	0.324	0.127	0.162	0.004	0.014
	Mo	モリブデン	0.39	0.09	0.14	0.36	0.46	0.34	0.39	0.05	0.17
	Sb	アンチモン	0.282	0.134	0.446	0.522	0.679	0.594	0.429	0.011	0.036
	Cs	セシウム	0.0066	0.0039	0.016	0.0166	0.0323	0.0108	0.0164	0.0026	0.0087
	Ba	バリウム	2.81	1.15	4.75	4.73	5.36	4.79	3.36	0.26	0.85
	La	ランタン	<0.007	<0.007	0.013	0.018	0.031	0.021	0.02	0.007	0.024
	Ce	セリウム	0.016	<0.015	0.035	0.043	0.05	0.04	0.038	0.0015	0.051
	Sm	サマリウム	<0.0019	<0.0019	0.0021	0.0025	0.0041	0.0023	0.0031	0.0019	0.0064
	Hf	ハフニウム	<0.03	0.049	<0.03	<0.03	<0.03	0.058	0.031	0.03	0.099
	W	タンクステン	<0.029	<0.029	<0.029	<0.029	0.038	0.097	0.095	0.029	0.097
	Ta	タンタル	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.032
	Th	トリウム	<0.0017	<0.0017	0.0023	0.0021	0.0049	0.0024	0.0032	0.0017	0.0058
Pb	鉛	0.208	0.287	0.966	1.44	5.06	1.69	2.24	0.028	0.095	
Cd	カドミウム	<0.018	<0.018	0.044	0.058	0.085	0.077	0.044	0.018	0.059	
炭素成分 (μg/m ³)	OC	有機炭素	0.783	1.01	2.06	3.03	2.74	2.62	1.68	-	-
	OC1		0.094	0.073	0.185	0.238	0.201	0.148	0.101	0.015	0.051
	OC2		0.225	0.355	0.632	0.932	0.97	0.9	0.595	0.014	0.048
	OC3		0.18	0.25	0.51	0.82	0.59	0.6	0.24	0.06	0.21
	OC4		0.124	0.138	0.27	0.406	0.304	0.253	0.172	0.015	0.05
	OCpyro	炭化補正值	0.16	0.19	0.46	0.63	0.67	0.72	0.57	0.04	0.14
	EC	元素状炭素	0.469	0.523	0.889	1.51	1.11	1.1	0.656	-	-
	EC1		0.15	0.209	0.617	1.33	0.949	0.772	0.418	0.017	0.057
	EC2		0.338	0.369	0.631	0.696	0.713	0.928	0.707	0.021	0.071
EC3	0.141		0.135	0.101	0.109	0.117	0.12	0.101	0.006	0.019	
特殊成分 (ng/m ³)	レボグルコサン	11.8	11.4	45.7	50	32.6	29.7	14.6	0.05	0.17	

※測定値は、当日 10 時から翌日 10 時までのもの（質量濃度も当日 10 時～翌日 10 時の平均値）を記載。

※測定結果の表記については、環境省への報告要領に基づき記載。詳細は以下のとおり。

・質量濃度は小数第 1 位まで記載。（小数第 1 位の値が「0」である場合、その「0」は記載しない。）

（例：測定値「4.0」を「4.0」と表示せず、「4」と表示する。）

・質量濃度以外の項目は有効数字 3 桁で記載。

ただし、定量下限値の有効数字 2 桁目の位までの桁数とし、小数点以下の末尾の値が「0」である場合、末尾の「0」は記載しない。

（例：定量下限値「0.19」の場合、測定値が「0.0604」であっても「0.0604」と表記せず、「0.06」と表記する。）

・検出下限値未満の場合は、検出下限値に不等号（"<"）を付けて示す。

・欠測値がある場合には、「zzz」で示す。

表 1-2-43 微小粒子状物質 (PM2.5) 成分分析結果 令和3年度秋季 (2)

採取日			10/28	10/29	10/30	10/31	11/1	11/2	11/3	検出 下限値	定量 下限値
質量濃度 (μg/m ³)			8.8	8.6	7.6	10.2	8.2	3.6	5.3	-	-
イオン成分 (μg/m ³)	Cl ⁻	塩化物イオン	0.344	0.321	0.0973	0.255	0.184	0.112	0.0605	0.0013	0.0042
	NO ₃ ⁻	硝酸イオン	0.347	0.351	0.541	0.819	0.444	0.282	0.459	0.0024	0.0081
	SO ₄ ²⁻	硫酸イオン	1.15	0.958	0.776	1.43	0.866	0.411	0.586	0.0025	0.0083
	Na ⁺	ナトリウムイオン	0.243	0.231	0.0646	0.106	0.112	0.0109	0.0084	0.0006	0.002
	NH ₄ ⁺	アンモニウムイオン	0.453	0.385	0.423	0.795	0.423	0.263	0.354	0.0011	0.0036
	K ⁺	カリウムイオン	0.0554	0.0368	0.0398	0.0624	0.0338	0.0083	0.0149	0.0004	0.0015
	Mg ²⁺	マグネシウムイオン	0.0224	0.021	0.0045	0.008	0.0088	0.0011	0.0008	0.0003	0.0011
Ca ²⁺	カルシウムイオン	0.0314	0.0162	0.0119	0.0196	0.012	0.0168	0.0094	0.0016	0.0052	
無機元素成分 (ng/m ³)	Na	ナトリウム	275	283	81	130	135	12	10	7	23
	Al	アルミニウム	14	19	20	17	9	<5	<5	5	17
	K	カリウム	59	49	52	71	38	<6	11	6	20
	Ca	カルシウム	21	27	16	23	31	13	9	4	12
	Sc	スカンジウム	<0.013	0.055	0.017	<0.013	0.029	<0.013	<0.013	0.013	0.044
	Ti	チタン	1.39	2.02	2.29	2.69	2	1	1.22	0.27	0.92
	V	バナジウム	0.063	0.089	0.133	0.31	0.208	0.041	0.096	0.011	0.035
	Cr	クロム	0.18	0.24	0.21	0.38	0.29	0.15	0.11	0.06	0.2
	Mn	マンガン	1.29	0.93	1.6	1.57	1.55	0.67	1.27	0.04	0.13
	Fe	鉄	27.2	31.8	41.7	56.6	30.1	14.4	26.9	2.3	7.7
	Co	コバルト	0.012	0.012	0.011	0.02	0.01	<0.005	<0.005	0.005	0.016
	Ni	ニッケル	<0.15	<0.15	<0.15	0.26	0.18	<0.15	<0.15	0.15	0.51
	Cu	銅	1.27	1.48	3.26	4.76	3.52	1.39	1.85	0.18	0.6
	Zn	亜鉛	6.9	3.7	9.5	12.1	7	3.9	6.9	0.7	2.3
	As	ヒ素	0.377	0.234	0.158	0.399	0.19	0.095	0.083	0.007	0.022
	Se	セレン	0.23	0.14	0.13	0.3	0.23	<0.13	<0.13	0.13	0.42
	Rb	ルビジウム	0.142	0.135	0.192	0.243	0.144	0.038	0.067	0.004	0.014
	Mo	モリブデン	0.06	0.09	0.19	0.57	0.12	<0.05	0.11	0.05	0.17
	Sb	アンチモン	0.233	0.358	0.507	0.615	0.377	0.201	0.63	0.011	0.036
	Cs	セシウム	0.0143	0.0132	0.0133	0.112	0.0128	0.0044	0.0067	0.0026	0.0087
	Ba	バリウム	1.84	2.83	4.01	5.06	2.85	1.83	2.85	0.26	0.85
	La	ランタン	0.015	0.016	0.012	0.02	0.01	<0.007	<0.007	0.007	0.024
	Ce	セリウム	0.027	0.032	0.029	0.048	0.02	<0.015	0.016	0.015	0.051
	Sm	サマリウム	0.002	0.0028	0.002	0.0027	0.0021	<0.0019	<0.0019	0.0019	0.0064
	Hf	ハフニウム	<0.03	<0.03	0.06	<0.03	0.105	<0.03	<0.03	0.03	0.099
	W	タンクステン	0.029	<0.029	<0.029	<0.029	<0.029	<0.029	<0.029	0.029	0.097
	Ta	タンタル	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.032
	Th	トリウム	0.0023	0.0029	0.002	0.0033	<0.0017	<0.0017	<0.017	0.0017	0.0058
Pb	鉛	1.36	0.917	0.981	2.96	0.872	0.671	0.778	0.028	0.095	
Cd	カドミウム	0.054	0.038	0.051	0.06	0.024	<0.018	0.029	0.018	0.059	
炭素成分 (μg/m ³)	OC	有機炭素	1.26	1.76	2.4	2.63	1.89	0.93	1.75	-	-
	OC1		0.028	0.163	0.23	0.209	0.129	0.044	0.153	0.015	0.051
	OC2		0.36	0.536	0.764	0.89	0.679	0.311	0.597	0.014	0.048
	OC3		0.37	0.49	0.64	0.59	0.47	0.24	0.4	0.06	0.21
	OC4		0.202	0.277	0.387	0.32	0.27	0.145	0.245	0.015	0.05
	OCpyro	炭化補正值	0.3	0.29	0.38	0.62	0.34	0.19	0.35	0.04	0.14
	EC	元素状炭素	0.62	0.659	0.739	0.971	0.732	0.492	0.663	-	-
	EC1		0.392	0.364	0.422	0.748	0.394	0.15	0.252	0.017	0.057
	EC2		0.446	0.478	0.577	0.727	0.57	0.318	0.545	0.021	0.071
EC3	0.082		0.107	0.12	0.116	0.108	0.214	0.216	0.006	0.019	
特殊成分 (ng/m ³)	レボグルコサン	25.5	14.5	30.1	35.2	19	8.67	21.3	0.05	0.17	

※測定値は、当日 10 時から翌日 10 時までのもの（質量濃度も当日 10 時～翌日 10 時の平均値）を記載。

※測定結果の表記については、環境省への報告要領に基づき記載。詳細は以下のとおり。

- ・質量濃度は小数第 1 位まで記載。（小数第 1 位の値が「0」である場合、その「0」は記載しない。）

（例：測定値「4.0」を「4.0」と表示せず、「4」と表示する。）

- ・質量濃度以外の項目は有効数字 3 桁で記載。

ただし、定量下限値の有効数字 2 桁目の位までの桁数とし、小数点以下の末尾の値が「0」である場合、末尾の「0」は記載しない。

（例：定量下限値「0.19」の場合、測定値が「0.0604」であっても「0.0604」と表記せず、「0.06」と表記する。）

- ・検出下限値未満の場合は、検出下限値に不等号（"<"）を付けて示す。

- ・欠測値がある場合には、「zzz」で示す。

表 1-2-44 微小粒子状物質 (PM2.5) 成分分析結果 令和3年度冬季 (1)

採取日			1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/26	1/27	検出 下限値	定量 下限値	
質量濃度 (μg/m ³)			8.4	5.7	7.1	13	8.3	7.9	11.4	-	-	
イオン成分 (μg/m ³)	Cl ⁻	塩化物イオン	0.41	0.437	0.335	0.3	0.642	0.349	0.46	0.004	0.012	
	NO ₃ ⁻	硝酸イオン	1.96	0.637	2.61	5.92	2.36	1.52	3.34	0.0014	0.0046	
	SO ₄ ²⁻	硫酸イオン	1.03	0.559	0.92	1.54	1.28	1.62	2.1	0.013	0.042	
	Na ⁺	ナトリウムイオン	0.101	0.177	0.133	0.059	0.055	0.06	0.07	0.004	0.013	
	NH ₄ ⁺	アンモニウムイオン	1.03	0.415	1.13	2.37	1.42	1.15	1.91	0.0004	0.0015	
	K ⁺	カリウムイオン	0.0361	0.0169	0.0213	0.0332	0.0204	0.0398	0.0381	0.0013	0.0044	
	Mg ²⁺	マグネシウムイオン	0.0078	0.0139	0.0077	0.003	0.0063	0.0032	0.0032	0.001	0.0034	
	Ca ²⁺	カルシウムイオン	0.026	0.017	0.015	0.014	0.015	0.016	0.016	0.013	0.045	
無機元素成分 (ng/m ³)	Na	ナトリウム	110	169	140	63	61	77	76	4	12	
	Al	アルミニウム	7	<1.4	5	4.9	6.3	13.7	12.3	1.4	4.7	
	K	カリウム	40.7	14.6	25.4	37.1	31.7	44	43.8	2.7	9.2	
	Ca	カルシウム	32	15	28	23	24	45	34	7	22	
	Sc	スカンジウム	<0.026	<0.026	<0.026	0.031	<0.026	<0.026	<0.026	0.026	0.086	
	Ti	チタン	1.5	<0.5	0.9	1.7	1	1.4	1.8	0.5	1.8	
	V	バナジウム	0.453	0.157	0.128	0.447	0.328	0.497	0.76	0.004	0.013	
	Cr	クロム	0.45	<0.13	0.2	0.16	0.29	0.31	0.61	0.13	0.42	
	Mn	マンガン	1.2	1.31	0.41	0.51	1.5	1.4	2.26	0.04	0.13	
	Fe	鉄	28.7	10	12.5	15.3	23.6	28.3	28.1	1	3.4	
	Co	コバルト	0.017	<0.005	0.01	0.007	0.009	0.019	0.015	0.005	0.015	
	Ni	ニッケル	0.27	<0.08	0.1	0.24	0.2	0.31	0.39	0.08	0.27	
	Cu	銅	1.67	0.51	0.93	1.4	0.91	1.34	1.38	0.15	0.5	
	Zn	亜鉛	18.3	8.8	9.6	9.2	9.3	16.2	14.3	0.5	1.7	
	As	ヒ素	0.064	0.035	0.125	0.158	0.118	0.238	0.247	0.02	0.068	
	Se	セレン	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.08	0.19	0.13	0.06	0.21	
	Rb	ルビジウム	0.185	0.0582	0.0789	0.132	0.0883	0.136	0.136	0.0025	0.0083	
	Mo	モリブデン	0.51	0.17	0.34	0.58	0.42	0.51	0.63	0.07	0.22	
	Sb	アンチモン	0.389	0.358	0.242	0.444	0.226	0.284	0.826	0.011	0.035	
	Cs	セシウム	0.0102	0.0042	0.007	0.0101	0.0082	0.0137	0.012	0.001	0.0032	
	Ba	バリウム	2.46	0.59	0.89	1.65	1.24	1.59	1.38	0.12	0.41	
	La	ランタン	0.0121	0.0026	0.0059	0.0091	0.0068	0.012	0.0128	0.0004	0.0015	
	Ce	セリウム	0.0266	0.0083	0.0191	0.0267	0.0182	0.0283	0.0245	0.0008	0.0027	
	Sm	サマリウム	0.0031	0.0028	0.0031	0.003	0.0031	0.0045	0.0036	0.0005	0.016	
	Hf	ハフニウム	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.16	
	W	タンクステン	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.1	
	Ta	タンタル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.017	<0.003	0.003	0.01	
	Th	トリウム	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.0019	<0.0008	0.0008	0.0025	
	Pb	鉛	1.27	0.384	0.496	0.717	0.94	2.71	1.51	0.025	0.085	
	Cd	カドミウム	0.019	<0.014	0.02	0.042	0.025	0.039	0.055	0.014	0.045	
	炭素成分 (μg/m ³)	OC	有機炭素	2.09	1	1.71	2.6	1.53	1.65	1.66	-	-
		OC1		0.427	0.217	0.406	0.585	0.317	0.26	0.298	0.01	0.032
		OC2		0.699	0.327	0.645	0.868	0.619	0.648	0.572	0.014	0.047
		OC3		0.41	0.19	0.28	0.39	0.17	0.23	0.21	0.03	0.11
OC4		0.264		0.15	0.176	0.25	0.143	0.16	0.159	0.025	0.085	
OCpyro		炭化補正值	0.29	0.12	0.2	0.51	0.28	0.35	0.42	0.12	0.39	
EC		元素状炭素	1.15	0.42	1.25	1.55	0.869	0.782	1.23	-	-	
EC1			0.51	0.18	0.44	0.92	0.33	0.44	0.71	0.07	0.23	
EC2			0.8	0.29	0.9	1.01	0.72	0.6	0.84	0.05	0.15	
EC3			0.126	0.07	0.111	0.13	0.099	0.092	0.101	0.009	0.028	
特殊成分 (ng/m ³)	レボグルコサン	35.8	8.72	33.9	56.1	18.1	19.7	34.9	0.07	0.24		

※測定値は、当日 10 時から翌日 10 時までのもの（質量濃度も当日 10 時～翌日 10 時の平均値）を記載。

※測定結果の表記については、環境省への報告要領に基づき記載。詳細は以下のとおり。

・質量濃度は小数第 1 位まで記載。（小数第 1 位の値が「0」である場合、その「0」は記載しない。）

（例：測定値「4.0」を「4.0」と表示せず、「4」と表示する。）

・質量濃度以外の項目は有効数字 3 桁で記載。

ただし、定量下限値の有効数字 2 桁目の位までの桁数とし、小数点以下の末尾の値が「0」である場合、末尾の「0」は記載しない。

（例：定量下限値「0.19」の場合、測定値が「0.0604」であっても「0.0604」と表記せず、「0.06」と表記する。）

・検出下限値未満の場合は、検出下限値に不等号（"<"）を付けて示す。

・欠測値がある場合には、「zzz」で示す。

表 1-2-44 微小粒子状物質 (PM2.5) 成分分析結果 令和3年度冬季 (2)

採取日		1/28	1/29	1/30	1/31	2/1	2/2	2/3	検出 下限値	定量 下限値
質量濃度 (μg/m ³)		13.4	8.7	3.4	7.4	8.3	7.5	10	-	-
イオン成分 (μg/m ³)	Cl ⁻ 塩化物イオン	0.237	0.129	0.091	0.173	0.315	0.205	0.192	0.004	0.012
	NO ₃ ⁻ 硝酸イオン	2.52	0.459	0.114	1.46	1.32	0.961	0.829	0.0014	0.046
	SO ₄ ²⁻ 硫酸イオン	2.19	1.9	0.814	1.35	1.32	1.67	2.09	0.013	0.042
	Na ⁺ ナトリウムイオン	0.084	0.074	0.067	0.086	0.126	0.091	0.083	0.004	0.013
	NH ₄ ⁺ アンモニウムイオン	1.57	0.866	0.324	0.929	0.91	0.852	0.976	0.0004	0.0015
	K ⁺ カリウムイオン	0.0681	0.0594	0.0075	0.0241	0.0326	0.132	0.179	0.0013	0.0044
	Mg ²⁺ マグネシウムイオン	0.0057	0.0048	0.0039	0.0033	0.0094	0.0165	0.0176	0.001	0.0034
Ca ²⁺ カルシウムイオン	0.044	<0.013	<0.013	0.016	0.014	0.015	<0.013	0.013	0.045	
無機元素成分 (ng/m ³)	Na ナトリウム	89	84	65	88	126	91	88	4	12
	Al アルミニウム	13.7	7.9	2.4	7.4	6.7	26.9	32.3	1.4	4.7
	K カリウム	75	74.7	3.1	26.6	34.7	129	193	2.7	9.2
	Ca カルシウム	60	20	8	38	21	41	36	7	22
	Sc スカンジウム	<0.026	<0.026	<0.026	<0.026	<0.026	<0.026	<0.026	0.026	0.086
	Ti チタン	1.5	0.9	<0.5	1.1	1	1.1	1.2	0.5	1.8
	Vバナジウム	0.163	0.087	0.041	0.088	0.102	0.101	0.116	0.004	0.013
	Crクロム	1.05	0.16	<0.13	0.31	0.19	0.42	0.32	0.13	0.42
	Mnマンガン	1.75	1.03	0.16	1.55	2.32	1.55	1.71	0.04	0.13
	Fe鉄	30.3	15.3	5.4	21.6	25.3	22.6	20.9	1	3.4
	Coコバルト	0.019	0.013	<0.005	0.012	0.009	0.023	0.028	0.005	0.015
	Niニッケル	0.22	0.08	<0.08	0.1	0.08	0.11	0.11	0.08	0.27
	Cu銅	1.42	0.64	0.36	1.18	1.27	2.42	2.58	0.15	0.5
	Zn亜鉛	13.9	5.8	1.6	18.3	12.1	10.3	10.6	0.5	1.7
	Asヒ素	0.478	0.396	0.049	0.102	0.156	0.262	0.406	0.02	0.068
	Seセレン	0.08	<0.06	<0.06	0.09	0.11	<0.06	0.11	0.06	0.21
	Rbルビジウム	0.184	0.144	0.0302	0.0957	0.0996	0.129	0.185	0.0025	0.0083
	Moモリブデン	0.47	0.19	0.1	0.38	0.23	0.15	0.2	0.07	0.22
	Sbアンチモン	0.538	0.164	0.064	0.2	0.478	0.441	0.187	0.011	0.035
	Csセシウム	0.0166	0.0126	0.0035	0.009	0.0112	0.0144	0.0185	0.001	0.0032
	Baバリウム	1.76	1.27	0.68	1.56	1.74	10.2	12.3	0.12	0.41
	Laランタン	0.0167	0.0101	0.003	0.0086	0.0062	0.0084	0.0105	0.0004	0.0015
	Ceセリウム	0.0296	0.0174	0.0076	0.0234	0.0172	0.0341	0.0301	0.0008	0.0027
	Smサマリウム	0.004	0.0034	0.003	0.0033	0.0033	0.0034	0.0034	0.0005	0.0016
	Hfハフニウム	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	0.16
	Wタンクステン	<0.03	0.04	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	0.03	0.1
	Taタンタル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.01
	Thトリウム	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	0.0008	0.0025
Pb鉛	3.87	1.28	0.286	0.802	1.18	1.33	1.56	0.025	0.085	
Cdカドミウム	0.053	0.051	<0.014	0.025	0.023	0.025	0.041	0.014	0.045	
炭素成分 (μg/m ³)	OC	2.04	1.38	0.618	1.65	1.49	1.67	1.72	-	-
	OC1	0.412	0.265	0.191	0.389	0.255	0.294	0.364	0.01	0.032
	OC2	0.493	0.236	0.111	0.622	0.523	0.654	0.431	0.014	0.047
	OC3	0.29	0.19	0.11	0.23	0.26	0.24	0.24	0.03	0.11
	OC4	0.246	0.173	0.066	0.145	0.139	0.134	0.167	0.025	0.085
	OCpyro 炭化補正值	0.6	0.52	0.14	0.26	0.31	0.35	0.52	0.12	0.39
	EC	1.19	0.484	0.249	1.27	0.801	0.778	0.746	-	-
	EC1	1.03	0.62	0.12	0.42	0.39	0.46	0.69	0.07	0.23
	EC2	0.66	0.33	0.19	0.97	0.63	0.57	0.49	0.05	0.15
EC3	0.098	0.054	0.079	0.135	0.091	0.098	0.086	0.009	0.028	
特殊成分 (ng/m ³)	レボグルコサン	32.1	21.1	5.39	36.2	17.3	17.2	22.6	0.07	0.24

※測定値は、当日 10 時から翌日 10 時までのもの (質量濃度も当日 10 時~翌日 10 時の平均値) を記載。

※測定結果の表記については、環境省への報告要領に基づき記載。詳細は以下のとおり。

- ・質量濃度は小数第 1 位まで記載。(小数第 1 位の値が「0」である場合、その「0」は記載しない。)
(例：測定値「4.0」を「4.0」と表示せず、「4」と表示する。)

- ・質量濃度以外の項目は有効数字 3 桁で記載。

ただし、定量下限値の有効数字 2 桁目の位までの桁数とし、小数点以下の末尾の値が「0」である場合、末尾の「0」は記載しない。

(例：定量下限値「0.19」の場合、測定値が「0.0604」であっても「0.0604」と表記せず、「0.06」と表記する。)

- ・検出下限値未満の場合は、検出下限値に不等号("<")を付けて示す。
- ・欠測値がある場合には、「zzz」で示す。

ク 有害大気汚染物質

表 1-2-45 有害大気汚染物質 測定結果 令和3年度 (1)

ベンゼン (基準値 3)	一般環境		沿道		トリクロロ エチレン (基準値 130)	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健 センター	東 18 丁 目局	北 1 条 自排局		篠路局	南保健 センター	東 18 丁目局	北 1 条 自排局
4月	0.63	0.51	0.67	0.85	(0.007)	(0.005)	0.015	(0.009)	
5月	0.30	0.30	0.46	0.65	0.012	(0.0047)	(0.0081)	(0.0076)	
6月	0.54	0.41	3.4	1.4	(0.008)	(0.007)	0.035	(0.011)	
7月	0.31	0.19	0.45	0.51	ND	ND	ND	(0.011)	
8月	0.23	0.24	0.33	0.42	ND	ND	ND	ND	
9月	0.28	0.31	0.32	0.54	ND	ND	0.086	ND	
10月	0.41	0.31	0.66	0.60	ND	ND	ND	ND	
11月	0.91	0.80	0.81	1.0	ND	ND	ND	ND	
12月	1.3	0.93	1.2	1.2	(0.010)	(0.009)	0.018	(0.010)	
1月	2.0	1.7	2.6	1.8	(0.014)	ND	0.031	(0.019)	
2月	0.58	0.64	0.76	1.5	ND	ND	ND	0.025	
3月	1.0	0.89	1.5	1.3	ND	ND	ND	(0.011)	
最大	2	1.7	3.4	1.8	0.014	<0.011	0.086	0.025	
最小	0.23	0.19	0.32	0.42	<0.0022	<0.0022	<0.0022	<0.0022	
平均	0.71	0.6	1.1	0.98	0.0059	0.0041	0.018	0.0094	
環境基準	適合	適合	適合	適合	環境基準	適合	適合	適合	

表 1-2-45 有害大気汚染物質 測定結果 令和3年度 (2)

テトラクロロ エチレン (基準値 200)	一般環境		沿道		ジクロロ メタン (基準値 150)	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健 センター	東 18 丁 目局	北 1 条 自排局		篠路局	南保健 センター	東 18 丁目局	北 1 条 自排局
4月	0.026	0.025	0.031	0.066	0.54	0.50	0.53	0.68	
5月	0.029	0.052	0.027	0.038	0.70	0.93	1.1	0.78	
6月	0.046	0.057	0.12	0.092	0.90	1.4	4.7	2.7	
7月	0.016	0.020	0.018	0.030	0.81	0.53	0.61	0.72	
8月	(0.007)	(0.005)	(0.007)	(0.005)	0.46	0.31	0.31	0.31	
9月	0.11	0.096	0.095	0.10	0.57	0.43	0.55	0.46	
10月	0.037	0.035	0.035	0.059	0.46	0.38	0.52	0.47	
11月	0.049	0.052	0.059	0.067	0.56	0.41	0.49	0.49	
12月	0.031	0.028	0.034	0.049	1.1	0.47	0.80	0.52	
1月	0.034	0.037	0.053	0.092	1.0	1.0	0.90	1.0	
2月	(0.018)	(0.019)	(0.019)	0.075	0.58	1.7	0.50	8.4	
3月	ND	0.039	0.026	0.038	0.44	0.40	0.56	0.57	
最大	0.11	0.096	0.12	0.1	1.1	1.7	4.7	8.4	
最小	<0.004	0.005	0.007	0.005	0.44	0.31	0.31	0.31	
平均	0.034	0.039	0.044	0.059	0.68	0.71	0.96	1.4	
環境基準	適合	適合	適合	適合	環境基準	適合	適合	適合	

表 1-2-45 有害大気汚染物質 測定結果 令和3年度 (3)

アクリロ ニトリル (指針値 2)	一般環境		沿道		アセト アルデヒド (指針値 120)	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健 センター	東 18 丁 目局	北 1 条 自排局		篠路局	南保健 センター	東 18 丁目局	北 1 条 自排局
4月	(0.053)	ND	ND	ND	4月	1.0	1.1	1.4	1.7
5月	ND	ND	ND	ND	5月	0.9	1.4	0.9	3.4
6月	(0.06)	(0.05)	0.21	(0.11)	6月	2.0	2.2	2.6	3.2
7月	ND	ND	(0.12)	ND	7月	1.2	1.2	1.3	2.2
8月	ND	ND	ND	ND	8月	0.75	0.56	0.72	1.1
9月	ND	ND	0.08	(0.06)	9月	0.91	0.85	0.95	4.4
10月	ND	(0.09)	(0.06)	(0.04)	10月	0.80	0.74	1.4	2.2
11月	(0.07)	ND	(0.05)	(0.06)	11月	0.64	0.68	0.86	0.85
12月	(0.05)	(0.04)	(0.04)	(0.03)	12月	0.98	0.66	1.5	1.3
1月	ND	ND	(0.12)	ND	1月	1.9	1.3	2.7	1.8
2月	ND	ND	ND	ND	2月	0.61	0.65	1.5	1.1
3月	ND	(0.027)	(0.055)	(0.028)	3月	1.1	1.0	2.1	1.5
最大	<0.11	<0.11	0.21	0.11	最大	2	2.2	2.7	4.4
最小	<0.026	0.027	<0.028	<0.028	最小	0.61	0.56	0.72	0.85
平均	0.038	0.036	0.072	0.043	平均	1.1	1	1.5	2.1
指 針	適合	適合	適合	適合	指 針	適合	適合	適合	適合

表 1-2-45 有害大気汚染物質 測定結果 令和3年度 (4)

塩化ビニル モノマー (指針値 10)	一般環境		沿道		塩化メチル (指針値 94)	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健 センター	東 18 丁 目局	北 1 条 自排局		篠路局	南保健 センター	東 18 丁目局	北 1 条 自排局
4月	ND	ND	ND	ND	4月	2.4	2.1	2.3	1.9
5月	ND	ND	ND	ND	5月	2.1	2.1	1.7	2.0
6月	ND	ND	ND	ND	6月	2.7	1.7	12	3.7
7月	ND	ND	ND	ND	7月	1.7	1.5	1.4	1.5
8月	ND	ND	ND	ND	8月	1.4	1.5	1.3	1.3
9月	ND	ND	ND	ND	9月	1.5	1.6	1.5	1.5
10月	ND	ND	ND	ND	10月	2.8	1.4	7.8	1.4
11月	ND	ND	ND	ND	11月	1.6	1.6	1.5	1.6
12月	(0.014)	(0.008)	(0.012)	(0.008)	12月	1.6	1.2	1.3	1.5
1月	(0.024)	0.030	0.029	(0.017)	1月	1.7	1.8	1.8	1.6
2月	ND	ND	ND	ND	2月	2.5	1.5	2.1	2.0
3月	ND	ND	ND	ND	3月	1.4	1.5	1.9	1.2
最大	0.024	0.03	0.029	0.017	最大	2.8	2.1	12	3.7
最小	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	最小	1.4	1.2	1.3	1.2
平均	0.0057	0.0057	0.006	0.0046	平均	2	1.6	3.1	1.8
指 針	適合	適合	適合	適合	指 針	適合	適合	適合	適合

表 1-2-45 有害大気汚染物質 測定結果 令和3年度 (5)

単位：μg/m³

クロロホルム (指針値 18)	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健 センター	東 18 丁 目局	北 1 条 自排局
4月	0.15	0.13	0.14	0.15
5月	0.15	0.15	0.16	0.26
6月	0.17	0.18	0.61	0.45
7月	0.11	0.098	0.094	0.19
8月	0.071	0.072	(0.066)	(0.067)
9月	0.12	0.12	0.11	0.12
10月	(0.12)	ND	(0.08)	(0.12)
11月	0.14	0.12	0.13	0.15
12月	0.34	0.14	0.13	0.15
1月	0.17	0.16	0.17	0.23
2月	0.12	0.46	0.11	3.3
3月	0.12	0.11	0.13	0.19
最大	0.34	0.46	0.61	3.3
最小	0.071	0.072	0.066	0.067
平均	0.15	0.15	0.16	0.45
指 針	適合	適合	適合	適合

単位：μg/m³

1,2-ジクロロ エタン (指針値 1.6)	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健 センター	東 18 丁 目局	北 1 条 自排局
4月	0.17	0.16	0.16	0.15
5月	0.13	0.12	0.12	0.12
6月	0.19	0.16	0.76	0.34
7月	0.035	0.066	0.063	0.057
8月	0.027	0.024	0.023	0.025
9月	0.087	0.089	0.086	0.087
10月	0.084	0.083	0.086	0.091
11月	0.079	0.065	0.064	0.067
12月	0.12	0.076	0.13	0.097
1月	0.15	0.18	0.15	0.15
2月	0.075	0.080	0.070	0.15
3月	0.091	0.082	0.082	0.085
最大	0.19	0.18	0.76	0.34
最小	0.027	0.024	0.023	0.025
平均	0.1	0.099	0.15	0.12
指 針	適合	適合	適合	適合

表 1-2-45 有害大気汚染物質 測定結果 令和3年度 (6)

単位：ngHg/m³

水銀及び その化合物 (指針値 40)	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健 センター	東 18 丁 目局	北 1 条 自排局
4月	2.7	1.7	3.2	2.5
5月	1.8	1.5	1.7	2.0
6月	2.1	1.4	1.3	1.8
7月	1.8	1.4	1.6	1.7
8月	1.6	1.3	1.4	1.4
9月	1.4	1.2	1.3	1.6
10月	1.1	1.0	1.3	1.2
11月	1.4	1.4	1.4	1.4
12月	2.0	1.7	2.0	1.9
1月	1.8	1.7	1.8	1.7
2月	1.8	1.7	1.7	1.7
3月	1.9	1.7	1.8	1.8
最大	2.7	1.7	3.2	2.5
最小	1.1	1	1.3	1.2
平均	1.8	1.5	1.7	1.7
指 針	適合	適合	適合	適合

単位：ngNi/m³

ニッケル 化合物 (指針値 25)	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健 センター	東 18 丁 目局	北 1 条 自排局
4月	2.0	1.4	3.5	3.8
5月	2.6	(1.3)	4.3	2.0
6月	2.9	(1.3)	3.0	5.4
7月	(1.3)	(0.9)	(1.6)	(1.5)
8月	0.96	(0.46)	1.7	1.2
9月	3.8	(1.4)	2.4	2.4
10月	1.5	(0.44)	1.6	1.3
11月	(0.8)	(1.0)	1.5	1.6
12月	3.5	(1.3)	2.9	2.4
1月	(1.2)	(0.9)	(1.2)	(1.9)
2月	(1.0)	ND	2.0	1.9
3月	(0.7)	(1.2)	4.1	(1.0)
最大	3.8	1.4	4.3	5.4
最小	0.7	0.44	1.2	1
平均	1.9	0.99	2.5	2.2
指 針	適合	適合	適合	適合

表 1-2-45 有害大気汚染物質 測定結果 令和3年度 (7)

単位：ng As/m³

ヒ素及び その化合物 (指針値 6)	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健 センター	東 18 丁 目局	北 1 条 自排局
4 月	4.2	4.0	4.0	3.6
5 月	0.68	0.41	0.57	0.53
6 月	2.5	2.1	2.6	2.7
7 月	0.23	0.11	0.24	0.23
8 月	0.31	0.23	0.19	0.29
9 月	1.4	0.33	0.57	0.73
10 月	0.25	0.13	0.36	0.26
11 月	0.34	0.36	0.42	0.42
12 月	1.7	0.70	2.0	1.4
1 月	1.3	1.2	1.3	1.1
2 月	0.29	0.21	0.31	0.34
3 月	0.53	0.75	0.59	0.83
最大	4.2	4	4	3.6
最小	0.23	0.11	0.19	0.23
平均	1.1	0.88	1.1	1
指 針	適 合	適 合	適 合	適 合

単位：μg/m³

1,3-ブチレンジン (指針値 2.5)	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健 センター	東 18 丁 目局	北 1 条 自排局
4 月	0.021	0.0069	0.036	0.045
5 月	ND	ND	(0.03)	(0.03)
6 月	0.041	0.027	0.44	0.12
7 月	ND	0.026	0.052	0.060
8 月	ND	ND	(0.021)	0.030
9 月	(0.029)	(0.018)	(0.025)	(0.032)
10 月	0.048	0.055	0.076	0.098
11 月	0.044	0.043	0.041	0.061
12 月	0.12	0.085	0.10	0.088
1 月	0.25	0.10	0.47	0.15
2 月	0.042	0.095	0.098	0.25
3 月	0.084	0.079	0.21	0.12
最大	0.25	0.1	0.47	0.25
最小	<0.007	0.0069	0.021	0.03
平均	0.058	0.046	0.13	0.09
指 針	適 合	適 合	適 合	適 合

表 1-2-45 有害大気汚染物質 測定結果 令和3年度 (8)

単位：ng Mn/m³

マンガン及び その化合物 (指針値 140)	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健 センター	東 18 丁 目局	北 1 条 自排局
4 月	28	19	48	48
5 月	16	13	17	19
6 月	25	21	34	33
7 月	11	1.6	10	11
8 月	9.8	3.1	6.1	7.7
9 月	100	14	25	16
10 月	12	4.8	17	13
11 月	6.4	7.8	13	16
12 月	27	5.0	17	19
1 月	6.8	3.7	12	6.8
2 月	6.2	2.1	7.5	11
3 月	5.3	4.2	7.7	8.2
最大	100	21	48	48
最小	5.3	1.6	6.1	6.8
平均	21	8.3	18	17
指 針	適 合	適 合	適 合	適 合

単位：ng Cr/m³

クロム及び その化合物	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健 センター	東 18 丁 目局	北 1 条 自排局
4 月	3.2	2.4	7.6	7.8
5 月	(1.8)	(2.1)	8.8	(4.5)
6 月	4.0	3.3	5.6	6.4
7 月	(1.8)	(1.3)	(2.5)	(2.8)
8 月	2.0	(0.9)	(1.5)	(1.6)
9 月	7.7	(2.1)	3.7	4.9
10 月	2.2	1.4	3.2	2.9
11 月	(1.4)	2.1	3.3	4.3
12 月	(13)	(1.6)	(3.2)	(4.8)
1 月	(2.0)	(1.4)	(1.8)	(2.3)
2 月	(3.5)	ND	ND	(4.6)
3 月	(0.9)	(1.4)	(1.8)	(2.3)
最大	13	3.3	8.8	7.8
最小	0.9	0.9	1.5	1.6
平均	3.6	1.7	3.7	4.1

表 1-2-45 有害大気汚染物質 測定結果 令和3年度 (9)

単位：μg/m³

酸化エチレン	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健センター	東18丁目局	北1条自排局
4月	0.078	0.060	0.11	0.12
5月	0.072	0.072	0.070	0.084
6月	0.12	0.086	0.11	0.11
7月	0.057	0.048	0.052	0.086
8月	0.079	0.038	0.058	0.054
9月	0.087	0.064	0.073	0.10
10月	0.087	0.092	0.089	0.096
11月	0.086	0.051	0.042	0.066
12月	0.038	0.036	0.040	0.061
1月	0.090	0.044	0.071	0.053
2月	0.048	0.030	0.035	0.041
3月	0.072	0.052	0.087	0.044
最大	0.12	0.092	0.11	0.12
最小	0.038	0.03	0.035	0.041
平均	0.076	0.056	0.07	0.076

単位：μg/m³

トルエン	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健センター	東18丁目局	北1条自排局
4月	1.5	0.31	2.5	2.8
5月	0.97	1.6	2.1	2.1
6月	1.9	2.7	17	8.2
7月	1.5	0.55	2.2	7.1
8月	0.92	0.30	1.1	0.96
9月	0.98	0.43	1.2	1.5
10月	2.0	0.88	3.5	2.4
11月	1.4	1.3	2.1	2.6
12月	3.2	1.8	2.9	2.8
1月	4.9	2.1	6.4	3.2
2月	1.2	1.4	1.9	4.4
3月	2.9	1.2	4.8	2.7
最大	4.9	2.7	17	8.2
最小	0.92	0.3	1.1	0.96
平均	1.9	1.2	4	3.4

表 1-2-45 有害大気汚染物質 測定結果 令和3年度 (10)

単位：ngBe/m³

ベリリウム及びその化合物	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健センター	東18丁目局	北1条自排局
4月	0.036	0.034	0.056	0.048
5月	(0.015)	(0.010)	(0.015)	(0.016)
6月	0.025	0.019	0.032	0.029
7月	(0.008)	(0.006)	(0.009)	0.015
8月	0.017	(0.005)	(0.005)	(0.009)
9月	0.18	(0.006)	0.033	0.020
10月	0.011	(0.009)	0.017	0.013
11月	(0.012)	(0.015)	(0.019)	0.022
12月	0.020	(0.011)	0.022	0.028
1月	0.011	0.013	0.013	0.012
2月	ND	ND	ND	(0.009)
3月	(0.012)	0.019	0.016	0.027
最大	0.18	0.034	0.056	0.048
最小	<0.005	<0.005	<0.005	0.009
平均	0.029	0.012	0.02	0.021

単位：ng/m³

ベンゾ[a]ピレン	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健センター	東18丁目局	北1条自排局
4月	0.078	0.042	0.067	0.066
5月	0.022	0.052	0.020	0.028
6月	0.026	0.020	0.039	0.037
7月	0.0099	0.0095	0.019	0.014
8月	0.013	0.0045	0.011	0.0070
9月	0.020	0.0059	0.0072	0.012
10月	0.045	0.014	0.068	0.030
11月	0.27	0.062	0.074	0.069
12月	0.44	0.11	0.19	0.16
1月	0.33	0.13	0.56	0.18
2月	0.091	0.021	0.057	0.070
3月	0.075	0.065	0.12	0.084
最大	0.44	0.13	0.56	0.18
最小	0.0099	0.0045	0.0072	0.007
平均	0.12	0.045	0.1	0.063

表 1-2-45 有害大気汚染物質 測定結果 令和3年度 (11)

単位： $\mu\text{g}/\text{m}^3$

ホルムアルデヒド	一般環境		沿道	
	篠路局	南保健センター	東18丁目局	北1条自排局
4月	1.9	1.9	2.1	2.5
5月	2.0	2.7	2.0	3.7
6月	3.3	3.2	3.0	4.1
7月	2.3	2.3	2.3	2.9
8月	1.8	1.7	1.7	1.8
9月	2.2	2.0	2.1	4.0
10月	1.2	1.2	1.6	2.2
11月	0.97	1.1	1.2	1.7
12月	1.4	1.2	1.8	2.0
1月	2.7	1.5	3.2	3.2
2月	1.1	1.1	1.7	1.8
3月	1.7	1.6	2.5	2.5
最大	3.3	3.2	3.2	4.1
最小	0.97	1.1	1.2	1.7
平均	1.9	1.8	2.1	2.7

データの取扱について

- (注1) 平均値算出時の数値の丸めは JIS Z 8401 に基づいた方法とした。ただし、検出下限値未満のデータが存在する場合には、原則として、当該検出下限値に 1/2 を乗じて得られた値を用いて平均値を算出した。なお、検出下限値は、月によって異なる場合がある。
- (注2) 測定値が検出下限値未満の場合は、「ND」を記入した。
- (注3) 測定値が検出下限値以上、定量下限値未満の場合は、その値を測定値の欄に記入し、数値を () 書きした。
- (注4) 最小値又は最大値の値が、検出下限値未満であった場合は、「(<該当月の検出下限値)」として表示した。
- (注5) 最小値又は最大値の値が、検出下限値以上定量下限値未満であった場合は、「(測定値)」として表示した。

3 アスベスト・酸性雨

(1) アスベスト

表 1-3-1 一般環境中のアスベスト濃度 経年変化 (単位：本/L)

測定地点	平成									令和		
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
北1条 (中央区)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.4	0.4	0.1	ND	0.33
山鼻 (中央区)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	0.6	ND	ND	—
篠路 (北区)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.2	0.3	ND	0.1	0.27
東月寒 (豊平区)	—	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.2	0.5	ND	0.1	0.12
発寒 (西区)	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	0.4	0.5	0.1	ND	0.26
厚別町山本 (厚別区)	ND	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
手稲山口 (手稲区)	ND	ND	ND	ND	ND	0.1	ND	0.4	0.4	0.1	0.1	0.33
厚別 (厚別区)	—	—	—	—	—	—	ND	0.1	0.5	0.1	ND	0.12
東18丁目 (東区)	—	—	—	—	—	—	0.1	0.1	0.3	ND	ND	0.14
北白石 (白石区)	—	—	—	—	—	—	0.1	0.2	0.8	0.1	ND	0.26
南※ (南区)	—	—	—	—	—	—	ND	0.5	0.4	—	—	—
駒岡 (南区)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	ND	0.1	0.12
評価方法	①									②		

評価方法 ①：石綿繊維数濃度（石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法（告示法））

②：総繊維数濃度（アスベストモニタリングマニュアル（第4.1版））

（注1） NDとは定量下限値（0.1本/L）未満を表す。「—」は測定をしていないことを表す。

（注2） 全国における一般大気環境中のアスベスト濃度はおおむね1.0本/L以下である。

※平成31年3月12日まで測定。なお、当該測定局については駒岡に移設し、令和元年度から測定

図 1-3-1 札幌市市有施設アスベスト登録台帳件数（吹付け石綿等—令和3年度末時点）

表 1-3-2 露出している建材の劣化状態及びそれに対する措置について（吹付け石綿等）

劣化状態	措 置
状態Ⅰ (著しい損傷、劣化)	早急に除去等の改修を行う。 (吹付け石綿等の全面にわたって表面が荒れ、剥離している。)
状態Ⅱ (部分的な損傷、劣化)	補修を行い、維持管理を行う。また、優先的に除去等の改修を行う。 (吹付け石綿等の表面が部分的に荒れ、一部剥離している。)
状態Ⅲ (通常)	維持管理を行う。 (吹付け石綿等の表面が安定しており、劣化も進んでいない。)

図 1-3-2 札幌市市有施設アスベスト登録台帳件数（保温材等—令和3年度末時点）

表 1-3-3 露出している建材の劣化状態及びそれに対する措置について（保温材等）

劣化状態	措置
状態Ⅰ (著しい損傷、劣化)	早急に除去等の改修を行う。 (石綿含有保温材の保護材が剥離し、露出した石綿含有保温材の繊維のくずれ等が見られる。)
状態Ⅱ (部分的な損傷、劣化)	補修を行い、維持管理を行う。また、計画的な除去等の改修を行う。 (石綿含有保温材の保護材が部分的に剥離しているが石綿含有保温材は露出していない。)
状態Ⅲ (通常)	維持管理を行う。 (石綿含有保温材及び石綿含有耐火被覆材が安定しており、劣化も進んでいない。)

図 1-3-3 札幌市市有施設アスベスト登録台帳件数（煙突用石綿断熱材等一令和3年度末時点）

表 1-3-4 露出している建材の劣化状態及びそれに対する措置について（煙突用石綿断熱材等）

劣化状態	措置
状態Ⅰ (著しい損傷)	直ちにボイラーを停止し、囲い込みを行った上で、早急に除去を行うよう検討する。 (断熱材やライナー材が著しく損傷しており、ボイラーの稼働に支障をきたしている。)
状態Ⅱ (著しい劣化)	大気濃度測定を行い、測定結果等の状況に応じて、早急な除去又は優先的な除去等の改修を行う。 (断熱材やライナー材の剥落が一部認められ、劣化が著しい。)
状態Ⅲ (劣化)	大気濃度測定を行い、測定結果等の状況に応じて、早急な除去、優先的な除去等又は計画的な除去等の改修を行う。 (断熱材やライナー材の剥落が一部認められ、多少劣化している。又は、剥落をはっきりとは確認できないものの、全体的に劣化している。)
状態Ⅳ (一部劣化)	維持管理を行う。また、計画的な除去等の改修を検討する。 (断熱材やライナー材の剥落が認められないものの、一部劣化している。)
状態Ⅴ (通常)	維持管理を行う。 (断熱材やライナー材の剥落がなく、劣化が認められない。)

(2) 酸性雨

酸性雨とは、一般的に pH が 5.6 以下の雨をいう。環境省が平成 25 年度から平成 29 年度に実施した酸性雨長期モニタリング結果では、5 年間の全国地点別平均値は pH4.58～pH5.16 の範囲（全平均値は pH4.77）にある。

表 1-3-5 酸性雨 測定地点

地点名	所在地	用途地域	設置場所	設置年度	廃止年度
中央	中央区北 1 条西 2 丁目	商業	北海道経済センタービル	昭和 62 年度	平成 16 年度
芸術の森	南区芸術の森	調整区域	芸術の森	平成元年度	平成 21 年度
市衛研	白石区菊水 9 条 1 丁目	一住	札幌市衛生研究所	平成 4 年度	

表 1-3-6 酸性雨 pH の経年変化

地点名	昭和		平成														
	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
中央	5.8	5.5	5.5	5.2	5.5	4.9	5.0	5.0	5.1	5.1	5.2	5.2	4.9	4.8	5.0	4.9	5.0
芸術の森	—	—	4.8	4.6	4.5	4.5	4.6	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.7	4.5	4.7	4.6	4.7
市衛研	—	—	—	—	—	4.8	4.8	5.0	4.9	4.9	5.0	4.9	4.8	4.7	4.9	4.8	4.8

(注) 平成 11 年度よりサンプリング方法をろ過式から Wet-only 式に変更

地点名	平成															令和		
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
中央	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
芸術の森	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
市衛研	4.8	4.9	4.7	4.7	4.7	5.0	5.1	4.9	4.8	5.0	4.9	5.2	4.9	4.9	5.1	4.9	5.2	5.1

図 1-3-4 酸性雨 経年変化

表 1-3-7 酸性雨 市衛研 令和3年度 月間値

	採水量 ml	降水量 Mm	pH
梅雨期 (6月)	778	22.0	5.22
秋 期 (10月)	479	23.0	5.08
降 雪 (1月)	435	22.0	5.07
年度平均	564	22.3	5.12

表 1-3-8 市衛研 陽イオンの経年変化 (単位: mg/l)

年度	平成															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Na ⁺	1.88	2.65	2.30	3.18	2.43	1.66	1.84	1.46	1.46	1.41	1.64	1.56	2.46	1.50	1.71	0.88
K ⁺	0.18	0.20	0.19	0.18	0.22	0.13	0.12	0.09	0.08	0.09	0.09	0.11	0.15	0.11	0.12	0.08
Ca ²⁺	0.94	1.22	1.02	0.80	1.14	0.92	0.74	0.30	0.28	0.37	0.36	0.42	0.39	0.32	0.43	0.27
Mg ²⁺	0.28	0.37	0.35	0.43	0.35	0.26	0.27	0.21	0.20	0.20	0.24	0.23	0.34	0.23	0.25	0.14
NH ₄ ⁺	0.64	0.69	0.58	0.86	1.00	0.81	0.73	0.51	0.56	0.45	0.51	0.52	0.55	0.39	0.52	0.42

年度	平成											令和		
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
Na ⁺	2.47	1.35	1.20	1.03	1.60	1.00	3.02	2.19	1.00	2.47	1.23	2.18	4.20	1.64
K ⁺	0.17	0.11	0.08	0.08	0.10	0.06	0.13	0.10	0.07	0.12	0.08	0.11	0.18	0.07
Ca ²⁺	0.40	0.37	0.27	0.22	0.24	0.18	0.25	0.20	0.15	0.25	0.27	0.22	0.34	0.19
Mg ²⁺	0.32	0.21	0.18	0.15	0.24	0.12	0.38	0.27	0.13	0.29	0.16	0.26	0.51	0.20
NH ₄ ⁺	0.48	0.33	0.31	0.35	0.32	0.27	0.26	0.24	0.25	0.32	0.32	0.39	0.29	0.21

図 1-3-5 市衛研 陽イオンの経年変化

表 1-3-9 市衛研 陰イオンの経年変化 (単位 : mg/l)

年度	平成															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SO ₄ ²⁻	3.60	3.86	3.54	3.79	4.40	3.17	3.03	1.98	2.30	1.88	2.23	2.26	2.52	2.04	2.93	1.99
NO ₃ ⁻	0.95	1.00	1.11	1.01	1.37	1.18	0.99	0.70	0.77	0.66	0.89	0.88	0.92	0.89	1.32	1.14
Cl ⁻	4.27	5.53	4.97	6.65	5.13	3.74	4.14	3.01	2.97	2.87	3.23	3.03	4.86	2.98	3.34	1.91

年度	平成											令和		
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	元	2	3
SO ₄ ²⁻	2.62	1.85	1.55	1.57	1.75	1.12	1.75	1.24	1.12	1.64	1.20	1.74	1.90	0.94
NO ₃ ⁻	1.30	0.95	0.80	0.94	0.97	0.77	0.77	0.66	0.78	0.82	0.85	0.98	0.84	0.60
Cl ⁻	4.56	2.93	2.60	2.14	3.35	1.73	5.69	3.80	1.84	4.41	2.22	4.06	7.70	3.01

図 1-3-6 市衛研 陰イオンの経年変化

表 1-3-10 酸性雨 市衛研 令和3年度 陽イオン測定値 (単位: mg/l)

	Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	NH ₄ ⁺
6月	0.05	0.02	0.12	0.02	0.16
10月	0.81	0.04	0.23	0.11	0.25
1月	4.06	0.14	0.22	0.47	0.22
年平均	1.64	0.07	0.19	0.20	0.21

図 1-3-7 酸性雨 市衛研 令和3年度 陽イオン測定値

表 1-3-11 酸性雨 市衛研 令和3年度 陰イオン測定値 (単位: mg/l)

	SO ₄ ²⁻	NO ₃ ⁻	Cl ⁻
6月	0.31	0.44	0.16
10月	0.93	0.87	1.47
1月	1.57	0.48	7.41
年平均	0.94	0.60	3.01

図 1-3-8 酸性雨 市衛研 令和3年度 陰イオン測定値