


わたしの ワクチン副反応




札幌市のワクチン接種率は1回目が74.1%、2回目が65.8%(10/27現在)
まだ接種していない方は、接種後の副反応も気になるのではないのでしょうか？
実際にワクチン接種を2回終えた方に、どんな副反応がみられたのか聞いてみました。

20代女性
ファイザー社

微熱


頭痛



接種の次の日、37.3°Cほどの微熱と頭痛がありましたが、いずれも市販の頭痛薬を飲むとおさまりました。
また、腕が押すと痛みました。

30代男性
ファイザー社

腕の痛み



腕が少々痛む程度で、熱などは出ませんでした。

同僚の30代男性も同じくファイザー社製のワクチンを接種していましたが、腕の痛みだけが合ったそうです。

40代女性
モデルナ社

微熱

腕の腫れ




接種から24時間程度たった後37°C台の微熱と倦怠感がありました。

2回目接種時にはありませんでしたが、1回目接種の1週間ほどあと、腕のかゆみ、腫れといった症状がありました。

40代男性
モデルナ社

発熱

腕の腫れ




接種から18時間程度たった後熱っぽさを感じ市販の解熱剤を服用しましたが37.9°Cほどの発熱がありました。その後も腕のたるさ、接種部位の周りが赤くなる、脇下が腫れるなどの症状がありました。

50代男性
モデルナ社

発熱

食欲不振




接種から18時間程度たった後38.3°Cほどの発熱があり、食欲もありませんでした。

更にその翌日も症状は続きましたが、2日後の朝、なにもなかったかのように平熱に戻っていました。

50代男性
ファイザー社

微熱



接種した次の日は微熱があり、仕事にも関わらずもうろうとしました。なにか、自分の体でないような感覚がありました。

その翌日症状は全ておさまっていました。

副反応の程度に個人差はあれど、いずれも症状は2~3日でおさまるよう。
ワクチンには新型コロナウイルス感染症の発症や重症化を予防する効果があります。
まだ接種していない方は、接種についてご検討ください。

