

接種後の注意事項

令和5年12月

●接種後、数日以内に現れる可能性のある症状について

出典：添付文書（ダイチロナ筋注（XBB.1.5））

発現割合	症状
50%以上	疼痛（※1）、倦怠感
1～50%	熱感、腫脹（※2）、紅斑、そう痒感、硬結、頭痛、筋肉痛、発熱、遅発性反応（※3）、リンパ節症（※4）、発疹、腋窩痛

（※1）疼痛：注射部位の痛み（※2）腫脹：注射部位の腫れ

（※3）遅発性反応：接種後7日目以降に現れる紅斑、腫脹、そう痒感、熱感、硬結、疼痛

（※4）リンパ節症：注射部位と同じ側の脇の腫れや痛み

- ・これらの症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。
- ・上記以外に、稀に起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。

●下記の場合は、速やかに接種を受けた医療機関やかかりつけ医などの身近な医療機関の診察を受けてください。

- ・強い痛み、腫れ、高熱などの症状がある場合
- ・ごくまれに心筋炎、心膜炎が報告されているため、接種後数日以内に胸の痛みや動悸、息切れ、むくみ等の症状があらわれた場合
- ・mRNAワクチン接種後、ごくまれにギラン・バレー症候群が報告されているため、接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れた場合

●ワクチン接種後の相談先

- ・接種を受けた医療機関、かかりつけ医などの身近な医療機関や下記にご相談ください。

相談内容	相談先	電話番号
ワクチンの副反応等に関する事 副反応発生時の受診に関する事	北海道新型コロナウイルス ワクチン接種相談センター (9:00～17:30)	0120-306-154
休日、夜間などに、緊急で受診の 相談をしたい場合	救急安心センターさっぽろ (24時間対応)	#7119 または 011-272-7119
その他ワクチン接種に関する事	札幌市新型コロナウイルス ワクチン接種お問い合わせ センター (9:00～18:00)	011-351-8646

- ※ 札幌市ホームページ（さっぽろ新型コロナウイルス・ワクチンNAVI）
にも、副反応発生時に受診可能な医療機関のリストを掲載しています。

新型コロナウイルス
の副反応について



● ワクチンを接種してからの過ごし方

- ・注射した部分は清潔に保つようして下さい。
- ・接種当日の入浴は問題ありませんが、注射した部分はこすらないようにして下さい。また、接種後に体調が悪い時は無理をせず、入浴は控える等、様子を見るようにして下さい。
- ・当日の激しい運動や過度の飲酒等は控えて下さい。

● 予防接種健康被害救済制度について

- ・予防接種では健康被害（病気になったり障害が残ったりすること）が起こることがあります。極めてまれであるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
- ・制度の概要については札幌市ホームページ（さっぽろ新型コロナウイルス・ワクチンNAVI）または札幌市新型コロナウイルスワクチン接種お問い合わせセンター（011-351-8646）にお問い合わせください。




健康被害救済制度
について

● ワクチンを受けた後も、感染予防対策の継続をお願いします。

- ・新型コロナウイルスワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する効果が確認されていますが、その効果は100%ではありません。また、ウイルスの変異による影響もあります。
- ・ワクチンを受けた後も感染予防対策を継続していただくようお願いします。
具体的には、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールによる消毒、こまめな換気などをお願いします。

感染予防対策を
継続していただ
くようお願ひし
ます。




マスクの
着用(※)



石けんによる
手洗い



手指消毒用アルコール
による消毒



こまめな換気

(※) 令和5年3月13日以降、マ
スクの着用は個人の主体的
な選択を尊重し、個人の判断
に委ねることになりました。

マスクの着用が効果的な
場面はこちら→



厚生労働省HP