

札幌市における麻しん患者の報告状況

1 2009年以降の麻しん患者報告状況


年	診断週	患者情報			診断※	備考
		性別	年齢区分	ワクチン接種歴		
2026	11	女性	50歳代	なし	検査診断	海外渡航歴あり
2026	5	男性	10歳代	あり	検査診断	
2025	23	女性	20歳代	あり	検査診断	
2023	27	男性	20歳代	不明	検査診断	
2022	39	男性	60歳代	不明	修飾麻しん	
2019	4	男性	40歳代	不明	修飾麻しん	
2019	4	女性	1歳	なし	検査診断	
2018	30	女性	20歳代	不明	検査診断	
2016	29	女性	30歳代	なし	検査診断	
2015	40	女性	30歳代	なし	検査診断	
2014	13	男性	10歳代	なし	検査診断	
2014	14	女性	10歳代	不明	検査診断	

2014	14	男性	30歳代	不明	検査診断	
2014	16	男性	20歳代	不明	検査診断	
2014	26	女性	0歳	なし	検査診断	
2013	3	女性	20歳代	不明	修飾麻しん	
2011	2	女性	30歳代	あり	臨床診断	
2010	3	女性	40歳代	なし	検査診断	
2010	14	男性	1～4歳	なし	臨床診断	
2010	19	女性	20歳代	不明	検査診断	
2010	48	女性	30歳代	なし	検査診断	
2009	10	男性	50歳代	なし	検査診断	
2009	16	男性	10歳代	あり	検査診断	
2009	20	男性	20歳代	あり	臨床診断	
2009	28	男性	20歳代	不明	臨床診断	
2009	42	男性	10歳代	不明	臨床診断	

2 2008年の麻しん患者報告状況

(1) 患者報告数(人)

2008年麻しん患者報告数（週別）



麻しん	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週
全国	88	156	247	270	530	465	568	477	529	499	540	442	462	317	398	416	543	444	430	381
北海道	8	15	12	19	75	53	59	33	35	32	39	32	57	45	57	103	125	102	94	115
札幌市	7	9	9	15	63	41	41	19	17	12	18	14	15	15	18	28	30	35	52	40


21週	22週	23週	24週	25週	26週	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週
320	362	341	261	256	201	170	177	130	74	70	42	45	36	26	34	21	16	18	15
68	70	46	39	36	19	11	20	18	4	3	2	1	2	1	1	0	0	0	0
23	18	18	12	11	8	3	11	7	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週	累計
20	18	12	19	13	19	14	12	14	20	17	17	11012
2	0	1	1	0	2	1	0	1	1	0	2	1462
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	615

(2) 年齢群別患者報告数(人)・割合

年齢 (歳)	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60歳 以上	計
報告 数	43	46	77	100	151	82	52	33	20	6	2	2	1	0	615
割合	7.0%	7.5%	12.5%	16.3%	24.6%	13.3%	8.5%	5.4%	3.3%	1.0%	0.3%	0.3%	0.2%	0.0%	


2008年麻しん・年齢群別患者報告数（割合）



(3) 区別患者報告数(人)・割合

区	中央	北	東	白石	厚別	豊平	清田	南	西	手稲	計
報告数	81	241	75	50	20	43	29	30	14	32	615
報告割合	13.2%	39.2%	12.2%	8.1%	3.3%	7.0%	4.7%	4.9%	2.3%	5.2%	100%

2008年麻しん・区別患者報告数（割合）




(4) ワクチン接種歴別患者報告数(人)・割合

接種歴	計(人)	割合
なし	270	43.9%
あり	167	27.2%
不明	178	28.9%
計	615	100%

2008年麻しん・ワクチン接種歴（割合）N=615

「あり」：1回目又は2回目のいずれかでワクチン接種を受けた場合、「なし」：一度もワクチン接種を受けたことがない場合



(5) 診断方法別患者報告数(人)

	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	9週	10週	11週	12週	13週	14週	15週	16週	17週	18週	19週	20週
臨床診断	7	6	5	10	53	26	29	15	14	5	9	13	6	8	14	23	16	24	37	28
検査診断	0	3	4	5	10	11	11	2	2	6	6	1	8	6	3	4	12	8	12	11
修飾麻しん	0	0	0	0	0	4	1	2	1	1	3	0	1	1	1	1	2	3	3	1
計	7	9	9	15	63	41	41	19	17	12	18	14	15	15	18	28	30	35	52	40

21週	22週	23週	24週	25週	26週	27週	28週	29週	30週	31週	32週	33週	34週	35週	36週	37週	38週	39週	40週
16	12	11	7	8	4	2	10	3	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5	4	5	3	3	4	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	18	18	12	11	8	3	11	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41週	42週	43週	44週	45週	46週	47週	48週	49週	50週	51週	52週	累計
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	425
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	155
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	615

2008年麻しん・診断方法別報告数（割合） N=615

