

チャタテムシ

室内・食品の虫

どんな家にも普通に見られる虫で、よくダニと間違われますが、人を刺したり、咬んだりすることはありません。



ヒラタチャタテ



唐揚げ粉に発生

室内のカビや
食品に発生

■ どんな虫？

- ・カビが発生している家具・押入れ・台所などや、そばから枕、めん類、かつお節、穀粉類などに発生します。
- ・直射日光を嫌い、薄暗く、温湿度の高い所を好み、夏～初秋にかけて大発生することがあります。

■ 対策は…

家の中のいたるところにいる虫なので、完全に駆除することは困難です。

家具や押入れ、畳に発生した時は

- ・定期的に掃除をしましょう。
- ・風通しや日当りをよくしましょう。
- ・カビを除去しましょう。

食品に発生した時は

- ・発生した食品といっしょに処分しましょう。
- ・食品は密閉容器に保管しましょう。

豆知識～翅のあるチャタテムシ

室内で見られるチャタテムシの多くは翅が退化していますが、屋外にいる種類と同じように、翅のあるものも見られます。




クリイロチャタテ

チャバネゴキブリ

室内・食品の虫

体表や腸内に細菌をつけて、食器や食品の上を歩くので感染症を媒介するおそれがあり、また、強い不快感を与えます。



卵鞘を付けたメス



粘着シートに捕まった
幼虫と成虫

**不快感
病原体の媒介**

■ どんな虫？

- ・ガス台の下、台所や冷蔵庫、食器棚の裏、引き出しの中など、温度が高く、暗くて、狭いすき間に群れを作って生息します。
- ・雑食性で人の食べ物や調理くずなどを食べます。
- ・夜間に活動し、特有な悪臭を発します。
- ・暖かいところを求めて、家電製品やOA機器などに侵入して、漏電や故障の原因になることがあります。
- ・メスは卵鞘(卵の入った袋)を持ち歩き、ふ化する頃に、生育に適した場所に産み落とすので駆除が難しくなります。

■ 対策は…

- ・エサになる残飯などを片づけましょう。
- ・台所周辺はいつも清潔にしましょう。

発生した時は

- ・ガス台の下や冷蔵庫の裏など、すき間の清掃をしっかりと行いましょう。
- ・台所などの水滴は飲み水となります。水滴をふき取りましょう。
- ・発生状況に合わせて、粘着シート、毒エサ、エアゾール剤、くん煙剤などを使用するとよいでしょう。

カツオブシムシ類

衣類・食品の虫

知らない間に毛織物の服に穴が開いていたことはありませんか？カツオブシムシの幼虫は、衣類の害虫として有名です。

衣類や乾燥食品などを食害



幼虫

成虫

ヒメカツオブシムシ



幼虫

成虫

ヒメマルカツオブシムシ

■ どんな虫？

- ・ 幼虫は毛織物、毛皮、生糸やかつお節などの乾燥食品を食害します。
- ・ 幼虫は食品の包装に穴を開けて入り込むことがあります。
- ・ 幼虫の期間は約300日間と長く、幼虫は4～5月頃に成虫となります。
- ・ 成虫は窓際などの明るいところで発見されることが多いです。
- ・ 成虫は野外に出て花粉や花の蜜を食べます。

■ 対策は…


衣類に発生した時は

- ・ 毛織物製品などは、クリーニングしてから密閉できるケースに防虫剤や脱酸素剤を入れておくとういでしょう。
- ・ 虫干しには、幼虫や成虫を追い出す効果があります。

食品に発生した時は

- ・ 乾燥食品などは密閉容器に入れて保管しましょう。
- ・ 食害された食品は処分しましょう。

褐色で扁平な吸血性の昆虫です。ヒトノミは見られなくなりましたが、最近ではネコノミ、ネズミノミ、スズメトリノミの被害にあうことがあります。



ネコノミ



スズメトリノミ

吸血
発赤
かゆみ

■ どんな虫？

- ・本来は猫やネズミ、野鳥などの体に寄生していますが、寄生先の動物（宿主）が死んだり巣から離れたりとすると、宿主から離れたノミが人から吸血するようになります。
- ・人の皮膚につくのは血を吸う時だけで、それ以外は部屋のすみや畳の下、床下などに潜んでいます。
- ・オス・メスとも吸血し、メスは畳などに卵を産み、幼虫はごみの中で成長します。

■ 対策は…

- ・発生源となる野良猫、ネズミ、野鳥などの巣を取り除き、十分清掃をしましょう。
- ・巣を取り除く時は、ノミに刺されないよう長袖の服や手袋を着用するなど、服装を整えてから行いましょう。

発生した時は

- ・じゅうたんや畳の下、床下などを清掃しましょう。
- ・薬剤を使う場合は有機リン系殺虫剤などがよいでしょう。
- ・ノミはペットにもつくことがあります。必要に応じてペットのノミの駆除も行いましょう。