

レジメン一覧

2022/5/31 時点

診療科	レジメン名	コメント	投与 日数	休業 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
共通	キイトルーダ(MSI-High/200mg 3週間隔)	がん化学療法後に増悪した進行・再発の (MSI-High) を有する固形癌	1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1
呼吸器内科	CBDCA+PTX		1	20	デキサート注射液 3.3mg/1mL:5A Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1 パクリタキセル注:200mg g /m Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg g /A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
呼吸器内科	CBDCA+S-1	CBDCA : day 1 AUC=5, S-1 : day 1-14	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg g /A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
呼吸器内科	CDDP+DTX+Radi		36	6	生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day8 Day29 Day36 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 Day8 Day29 Day36 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 Day8 Day29 Day36 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day8 Day29 Day36 ドセタキセル点滴静注用:40mg g /m Day1 Day8 Day29 Day36 生食注 (大塚) 500mL:300m L Day1 Day8 Day29 Day36 シスプラチン注「マルコ」:40mg g /m Day1 Day8 Day29 Day36
呼吸器内科	CDDP (シヨト) +VNR		8	13	生食注 (大塚) 500mL:250m L Day1 シスプラチン注「マルコ」:80mg g /m Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 ロゼウス静注液:25mg g /m Day1 Day8 ソルデム3 A 200mL:1本 Day1 Day8 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 生食注 (大塚) 500mL:2本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day8 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day8
呼吸器内科	CDDP (シヨト) +VP16		3	18	生食注 (大塚) 500mL:2本 Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 イトボンド点滴静注液 100mg/5mL 「サンド」:100mg g /m Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 500mL:250m L Day1 シスプラチン注「マルコ」:80mg g /m Day1 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day2 Day3 生理食塩液 P 50mL:1本 Day2 Day3
呼吸器内科	CBDCA+VP16		3	18	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day2 Day3 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg g /A Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 イトボンド点滴静注液 100mg/5mL 「サンド」:80mg g /m Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day2 Day3 ヴィーンD輸液 500mL:1袋 Day2 Day3
呼吸器内科	AMR div		3	18	生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 Day2 Day3 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day2 Day3 ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg/2mL:1A Day1 Day2 Day3 カルセド注射用 50mg:40mg g /m Day1 Day2 Day3
呼吸器内科	ハイカムチン		5	16	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注射用 1.1mg:1mg g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
呼吸器内科	CDDP (シヨト) +PEM		1	20	生食注 (大塚) 500mL:250m L Day1 シスプラチン注「マルコ」:80mg g /m Day1 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 生食注 (大塚) 500mL:2本 Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ペメトレキセド点滴静注液:500mg g /m Day1 ソルデム3 A 200mL:1本 Day1

呼吸器内科	DOC (呼吸器内科)	DOCは60mg/m ²	1	20	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注用:60mg/g/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
呼吸器内科	PEM		1	20	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペムトレキセド点滴静注液:500mg/g/m ² Day1 ソルデム3 A 200mL:1本 Day1
呼吸器内科	プレオ		1	0	リドカイン塩酸塩注射液1% 100mg/10mL:2A Day1 プレオ注射用 15mg:1mg/kg Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 生食注 20mL「CMX」:20mL Day1
呼吸器内科	ピシバニール		1	0	リドカイン塩酸塩注射液1% 100mg/10mL:2A Day1 ピシバニール注射用:0.2KE Day1 生食注 20mL「CMX」:1A Day1
呼吸器内科	ユニタルク		1	0	リドカイン塩酸塩注射液1% 100mg/10mL:2A Day1 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g:4g Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1
呼吸器内科	CBDCA+PEM		1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ペムトレキセド点滴静注液:500mg/g/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
呼吸器内科	ゾメタ (骨病変)	(注意) 外来化学療法センター用	1	20	生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL:4mg Day1
呼吸器内科	nab-PAC+CBDCA		15	6	デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 Day8 Day15 アプタキサン点滴静注用 100mg:100mg/g/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
呼吸器内科	臨床試験 : PEM+Bev (TORG1323)		1	19	生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペムトレキセド点滴静注液:500mg/g/m ² Day1 ペバシズマブ B S 点滴静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1
呼吸器内科	オブジーボ (NSCLC)		1	13	オブジーボ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
呼吸器内科	サイラムザ+DTX		1	20	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg/2mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 サイラムザ点滴静注液:10mg/kg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 ドセタキセル点滴静注用:60mg/g/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
呼吸器内科	キイトルーダ(NSCLC/200mg 3週間隔)	キイトルーダ400mg 6週間隔と変更可能	1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1
呼吸器内科	キイトルーダ (NSCLC/400mg 6週間隔)	キイトルーダ200mg 3週間隔と変更可能	1	41	キイトルーダ点滴静注:400mg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
呼吸器内科	テセントリク(NSCLC)	初回60分、忍容性良好2回目以降30分短縮可	1	20	テセントリク点滴静注 1200mg/20mL (冷):1200mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
呼吸器内科	イミフィンジ(DRVmab)	【治療期間 : 1年間】 化学放射線療法後の病勢制御できた局所進行非小細胞肺がんの地固め療法	1	13	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 イミフィンジ点滴静注:10mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
呼吸器内科	CBDCA+nab-PTX+Pembro (1~4コース目)	day1~day3は、イメンド併用を推奨 ★ 5コース目以降は、「キイトルーダ (NSCLC) 」のレジメンを使用★	15	6	生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 Day8 Day15 アプタキサン点滴静注用 100mg:100mg/g/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day8 Day15

呼吸器内科	CBDCA+PEM+Pembro (1~4コース目)	イメンド併用を推奨	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ペムトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg/g Day1
呼吸器内科	PEM+Pembro (5コース目以降)		1	20	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペムトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg/g Day1
呼吸器内科	CBDCA+PTX+BEV+ATZ (1~4コース目)	イメンド併用を推奨	1	20	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 パクリタキセル注:200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ペバシズマブ B S 点滴静注:15mg/kg Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL (冷):1200mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:5A Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1
呼吸器内科	BEV+ATZ (5コース目以降/NSCLC)		1	20	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ペバシズマブ B S 点滴静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL (冷):1200mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
呼吸器内科	weekly CBDCA+PTX+rad治療法	胸部放射線60Gy/30fr平日 本治療でPR、SDの症例は、1年間のイミフィンジ投与による地固め療法を考慮	36	6	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 パクリタキセル注:40mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
呼吸器内科	C A P	胸腺腫瘍 リンパ球比率の高い胸腺腫の場合はステロイドを適宜内服・点滴併用 DXRの総投与量が500mg/m ² を超えない	1	20	生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 ドキシソリン塩酸塩注射液:50mg/m ² Day1 シスプラチン注:50mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:250mL Day1 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 ピカーボン注 500mL:2袋 Day1 マンニトール S 注射液 300mL:200mL Day1 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):500mg/m ² Day1
呼吸器内科	CBDCA+nab-PTX+Atez (1~4コース目)	day1~day3は、イメンド併用を推奨 ★維持療法は、「テセントリク (NSCLC)」のレジメンを使用★	15	6	生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 Day8 Day15 アプタキサン点滴静注用 100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL (冷):1200mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day8 Day15
呼吸器内科	CDDP+VP16+durvalmab (導入療法)	アトレチン併用、VP16:80-100mg/m ² で調整可 4サイクル以後は維持療法に移行	3	18	イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL [サンド]:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 500mL:250mL Day1 シスプラチン注「マルコ」:80mg/m ² Day1 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 生食注 (大塚) 500mL:2本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day2 Day3
呼吸器内科	CBDCA+VP16+durvalmab (導入療法)	VP16:80-100mg/m ² で調整可 4サイクル以後は維持療法に移行	3	18	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day2 Day3

呼吸器内科	durvalmab (小細胞癌 維持療法)	CBDCA/CDDP+VP16+durvalmab導入療法4サイクル後、SD以上で本維持療法に移行	1	27	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
呼吸器内科	CBDCA+PTX+Pembro (1~4コース目)	※初回はPTXアナフィラキシー厳重注意。AE高度の場合は早めに維持治療移行も検討可	1	20	デキサート注射液 3.3mg/1mL:5A Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 レスタミンコウ錠 10mg 5錠:1包 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 パクリタキセル注:200mg /m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg /A Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1
呼吸器内科	Ipi+Nivo併用 9LA(CBDCA+PTX)	CBDCA+PTX 2サイクルのみ化学療法併用(非腺癌)。以後はIpi+Nivo維持療法へ移行する。	22	20	ヤーボイ点滴静注液:1mg /kg Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day22 レスタミンコウ錠 10mg 5錠:1包 Day1 Day22 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 Day22 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day22 パクリタキセル注:200mg /m ² Day1 Day22 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day22 カルボプラチン点滴静注液:0mg /A Day1 Day22 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day22 オブジーボ点滴静注:360mg Day1 Day22 生食注 (大塚) 100mL:1瓶 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:5A Day1 Day22 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 Day22
呼吸器内科	Ipi+Nivo併用 9LA (CBDCA+PEM)	CBDCA+PEM 2サイクルのみ併用(非扁平上皮癌)。以後はIpi+Nivo維持療法へ移行。	22	20	カルボプラチン点滴静注液:0mg /A Day1 Day22 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 Day22 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 Day22 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day22 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day22 ヤーボイ点滴静注液:1mg /kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day22 オブジーボ点滴静注:360mg Day1 Day22 ペムトレキセド点滴静注液:500mg /m ² Day1 Day22
呼吸器内科	Ipi+Nivo併用 checkmate227 (9LA 維持療法)	Ipi+Nivo併用 9LAケモ 2サイクル後の維持療法。PDまで	22	20	オブジーボ点滴静注:360mg Day1 Day22 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day22 生食注 (大塚) 100mL:1瓶 Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg /kg Day1
消化器内科	(術後補助) S-1+DOC	2-7J-λDOC併用,S-1/1-7J-λ2投1休/8J-λ以降4投2休 (手術1年後まで)	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注用:40mg /m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1
消化器内科	biweekly PTX		15	13	デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day15 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 Day15 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day15 パクリタキセル注:80mg /m ² Day1 Day15 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day15
消化器内科	triweekly DOC (胃癌)	胃癌レジメン (DOCは60mg/m ²)	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドセタキセル点滴静注用:60mg /m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	Gem (肺癌)		15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg /m ² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15
消化器内科	Gem (肺癌・隔週)		15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day15 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg /m ² Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day15
消化器内科	Gem (胆道癌)		15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg /m ² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15
消化器内科	Gem (胆道癌・隔週)		15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day15 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg /m ² Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day15
消化器内科	mFOLFOX6		1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 レボリナート点滴静注用:200mg /m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg /m ² Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg /m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg /m ² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1

消化器内科	sLV5FU2		1	13	<p>グラニセトロン点滴静注^{ハ^ツク^ク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
消化器内科	mFOLFOX6/Bev		1	13	<p>グラニセトロン点滴静注^{ハ^ツク^ク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペバシズマブ B S 点滴静注:5mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/g/m² Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
消化器内科	sLV5FU2/Bev		1	13	<p>グラニセトロン点滴静注^{ハ^ツク^ク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペバシズマブ B S 点滴静注:5mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
消化器内科	FOLFIRI		1	13	<p>グラニセトロン点滴静注^{ハ^ツク^ク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 イリリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m² Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
消化器内科	FOLFIRI/Bev		1	13	<p>グラニセトロン点滴静注^{ハ^ツク^ク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペバシズマブ B S 点滴静注:5mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 イリリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m² Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
消化器内科	IRIS (大腸癌)	TS-1 14日間内服 (day1~14)	15	13	<p>グラニセトロン点滴静注^{ハ^ツク^ク} 1mg/50mL:1本 Day1 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day15 イリリテカン塩酸塩点滴静注液:100mg/g/m² Day1 Day15 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day15</p>
消化器内科	IRIS/Bev	TS-1 14日間内服 (day1~14) 臨床試験	15	13	<p>グラニセトロン点滴静注^{ハ^ツク^ク} 1mg/50mL:1本 Day1 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day15 ペバシズマブ B S 点滴静注:5mg/kg Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day15 イリリテカン塩酸塩点滴静注液:100mg/g/m² Day1 Day15 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day15</p>
消化器内科	SOX (大腸癌)	TS-1 14日間内服 (day1夕~15朝)	1	20	<p>グラニセトロン点滴静注^{ハ^ツク^ク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>
消化器内科	末梢SOX (大腸癌)	TS-1 14日間内服 (day1夕~15朝)	1	20	<p>グラニセトロン点滴静注^{ハ^ツク^ク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1</p>
消化器内科	SOX/Bev (大腸癌)	TS-1 14日間内服 (day1夕~15朝)	1	20	<p>グラニセトロン点滴静注^{ハ^ツク^ク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペバシズマブ B S 点滴静注:7.5mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>
消化器内科	CPT-11/Cetuximab (隔週・初回)		43	6	<p>グラニセトロン点滴静注^{ハ^ツク^ク} 1mg/50mL:1本 Day1 Day15 Day29 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 ポラミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 アービタックス注射液 100mg/20mL:400mg/g/m² Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 イリリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/g/m² Day1 Day15 Day29 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day15 Day29 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day8 Day22 Day36 Day43 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/g/m² Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43</p>

消化器内科	triweekly DOC (食道癌)	食道癌レジメン (DOCは70mg/m ²)	1	20	グラニセトロン点滴静注パ ^{ツク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドセタキセル点滴静注用:70mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	CDDP+GEM		8	13	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70キ]:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 Day8 ソルデム1輸液 500mL:1本 Day1 Day8 シスプラチン注「マルコ」:25mg/m ² Day1 Day8 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 ソルデム3A 500mL:1本 Day1 Day8
消化器内科	XELOX (大腸癌)	ゼローダ 14日間内服 (day1夕~15朝)	1	20	グラニセトロン点滴静注パ ^{ツク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 オキサリプラチン点滴静注用:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	末梢XELOX (大腸癌)	ゼローダ 14日間内服 (day1夕~15朝)	1	20	グラニセトロン点滴静注パ ^{ツク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 オキサリプラチン点滴静注用:130mg/m ² Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1
消化器内科	XELOX/Bev (大腸癌)	ゼローダ 14日間内服 (day1夕~15朝)	1	20	グラニセトロン点滴静注パ ^{ツク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペバシズマブ B S点滴静注:7.5mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 オキサリプラチン点滴静注用:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	末梢XELOX/Bev (大腸癌)	ゼローダ 14日間内服 (day1夕~15朝)	1	20	グラニセトロン点滴静注パ ^{ツク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペバシズマブ B S点滴静注:7.5mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 オキサリプラチン点滴静注用:130mg/m ² Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1
消化器内科	ゼローダ/Bev (大腸癌)	ゼローダ 14日間内服 (day1夕~15朝)	1	20	ペバシズマブ B S点滴静注:7.5mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1
消化器内科	FOLFIRI/Pani		1	13	グラニセトロン点滴静注パ ^{ツク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL:6mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 イリリテカン塩酸塩点滴静注用:150mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/m ² Day1
消化器内科	FOLFOX/Pani		1	13	グラニセトロン点滴静注パ ^{ツク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL:6mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注用:85mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/m ² Day1
消化器内科	sLV5FU2/Pani		1	13	グラニセトロン点滴静注パ ^{ツク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL:6mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/m ² Day1
消化器内科	Pani単独		1	13	ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL:6mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
消化器内科	レミケード		1	0	ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 レミケード点滴静注用 100mg:300mg Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1
消化器内科	ゾメタ (骨病変)	(注意) 外来化学療法センター用	1	20	生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL:4mg Day1
消化器内科	ランマーク	(注意) 外来化学療法センター用	1	27	ランマーク皮下注 120mg:120mg Day1

消化器内科	modified FOLFIRINOX		1	13	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m ² Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
消化器内科	G-SOX (胃癌)	TS-1 14日間内服 (day1夕~15朝) ★イメ ンド処方してください	1	20	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	末梢G-SOX (胃癌)	TS-1 14日間内服 (day1夕~15朝) ★イメ ンド処方してください	1	20	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1
消化器内科	G-SOX+HER (2回目以降; 胃癌)	S-1 14日間内服 (day1夕~15朝) ★イメ ンド処方してください	1	20	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 トラスツマ [®] BS点滴静注用 150mg (冷) [ルセ7°#]:6mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	末梢G-SOX+HER(初回; 胃癌)	S-1 14日間内服 (day1夕~15朝) ★イメ ンド処方してください	1	20	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:500m L Day1 トラスツマ [®] BS点滴静注用 150mg (冷) [ルセ7°#]:8mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1
消化器内科	末梢G-SOX+HER(2回目以降; 胃癌)	S-1 14日間内服 (day1夕~15朝) ★イメ ンド処方してください	1	20	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:500m L Day1 トラスツマ [®] BS点滴静注用 150mg (冷) [ルセ7°#]:6mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1
消化器内科	末梢XELOX(胃癌)	ゼローダ 14日間内服 (day1夕~15朝) ★ イメンド処方してください	1	20	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1
消化器内科	GEM+アブラキサン		15	13	デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1本 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:125mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15
消化器内科	RAM/weeklyPTX		15	13	ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 グラセトロン点滴静注用 [®] ヲカ [®] 1mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 バクタクセル注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day8
消化器内科	ヤーポイ		1	20	ヤーポイ点滴静注液:3mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:90m L Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1
消化器内科	アブラキサン (3週毎)		1	20	デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 グラセトロン点滴静注用 [®] ヲカ [®] 1mg/50mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 アブラキサン点滴静注用 100mg:260mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
消化器内科	RAM+FOLFIRI		1	13	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1

消化器内科	GEM+アブラキサン (隔週)		15	13	デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day15 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:125m g/m ² Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day15 ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day15
消化器内科	TAS102/Bev	TAS102 (ロサフ) の内服と併用 TAS102は35mg/m ² /回 5日内服2日休薬を2回繰り返しその後14日間休薬	15	13	ペバシズマブ B S点滴静注:5m g/kg Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day15
消化器内科	FOLFOXIRI		1	13	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 イリリテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m ² Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85m g/m ² Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400m g/m ² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1
消化器内科	ザノサー (weekly)		1	6	生食注 1000mL:1000m L Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9m g Day1 ザノサー点滴静注用 1g (冷):1000m g/m ² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1
消化器内科	オブジーボ (胃がん/240mg2週間隔)		1	13	オブジーボ点滴静注:240m g Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
消化器内科	オブジーボ (胃がん/480mg4週間隔)		1	27	オブジーボ点滴静注:480m g Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
消化器内科	ADM (悪性軟部肉腫)	ADM総投与量500mg/m ² を超えると心毒性リスク増大に留意	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドキシソリン塩酸塩注射液:75m g/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1
消化器内科	Avelumab(メルケル細胞癌)	抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤は別途処方が必要。	1	13	バベンチオ点滴静注 200mg/10mL (冷):10m g/kg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1
消化器内科	(FOLFOX等併用限定)(胃癌)(初回)HER	FOLFOX等との併用に限り「併用可」にて適応とする/初回8mg/kg	1	20	トラスツマ [®] BS点滴静注用 150mg (冷) [ルセ7°粒]:8m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1
消化器内科	(FOLFOX等併用限定)(胃癌)(2回目以降)HER	FOLFOX等との併用に限り「併用可」にて適応とする/2回目以降6mg/kg	1	20	トラスツマ [®] BS点滴静注用 150mg (冷) [ルセ7°粒]:6m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1
消化器内科	RAM/nab-PTX		15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day15 サイラムザ点滴静注液:8m g/kg Day1 Day15 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:100m g/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15
消化器内科	(臨床試験)CPT-11/RAM HGCSG1603		1	13	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 サイラムザ点滴静注液:8m g/kg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 イリリテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1
消化器内科	キイトルーダ(悪性黒色腫/Adj/200mg3週間隔)	悪性黒色腫・術後補助療法★投与期間は12ヶ月間まで	1	20	キイトルーダ点滴静注:200m g Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1
消化器内科	AFL/FOLFIRI		1	13	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 ザルトラップ点滴静注:4m g/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 イリリテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m ² Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):400m g/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400m g/m ² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
消化器内科	mFOLFOX6 (食道がん)	※シスプラチン不耐の緩和的治療もしくは再発例に限る	1	13	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85m g/m ² Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):400m g/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400m g/m ² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1

消化器内科	オブジーボ（食道がん/240mg2週間隔）		1	13	オブジーボ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1
消化器内科	オブジーボ（食道がん/480mg4週間隔）		1	27	オブジーボ点滴静注:480mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1
消化器内科	nal-IRI+5-FU/LV		1	13	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 オニバイド点滴静注 43mg/10mL (冷):70mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液（大塚） 500mL:1本 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/m ² Day1 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
消化器内科	BEV+ATZ（肝細胞がん）	Child-Pugh分類A、全身化学療法歴なしの肝細胞がんを対象	1	20	生食注（大塚） 100mL:1本 Day1 アバスタン点滴静注用:15mg/kg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL (冷):1200mg Day1 生食注（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	エンハーツ（胃がん）		1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1 エンハーツ点滴静注用 100mg (冷):6.4mg/kg Day1 注射用水（大塚） 100mL:1本 Day1
消化器内科	キイトルーダ(悪性黒色腫/200mg3週間隔)		1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 生食注（大塚） 100mL:100mL Day1
消化器内科	キイトルーダ(悪性黒色腫/400mg6週間隔)		1	41	キイトルーダ点滴静注:400mg Day1 生食注（大塚） 100mL:100mL Day1
消化器内科	オブジーボ（悪性黒色腫/240mg2週間隔）		1	13	オブジーボ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1
消化器内科	オブジーボ（悪性黒色腫/480mg4週間隔）		1	27	オブジーボ点滴静注:480mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1
消化器内科	(初回；3剤併用)Binimetinib+Encorafenib+Cetuximab	Binimetinib(1回45mg1日2回) Encorafenib(1回300mg1日1回)；既治療 BRAF変異mCRC	1	6	生食注（大塚） 100mL:1本 Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:400mg/m ² Day1 生食注（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	(2コ〜；3剤併用)Binimetinib+Encorafenib+Cetuximab	Binimetinib(1回45mg1日2回) Encorafenib(1回300mg1日1回)；既治療 BRAF変異mCRC	1	6	生食注（大塚） 100mL:1本 Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m ² Day1 生食注（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	Cet（500mg/m ² biweekly）+CPT-11		1	13	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:500mg/m ² Day1 生食注（大塚） 500mL:1袋 Day1 イリリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液（大塚） 500mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
消化器内科	(臨床試験)DOC/RAM HGCSG1903	RAM,DOC (Lv0 8mg/kg,60mg/m ² Lv-1 6mg/kg,50mg/m ² Lv-2 5mg/kg,40mg/m ²)	15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 生食注（大塚） バッグ 250mL:1本 Day1 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day15 ドセタキセル点滴静注用:60mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
消化器内科	Nivo+SOX（胃癌）	TS-1 14日間内服（day1夕-15朝）★イイト [®] 処方してください ※HER2陰性 確認必要	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1 オブジーボ点滴静注:360mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
消化器内科	末梢Nivo+SOX（胃癌）	TS-1 14日間内服（day1夕〜15朝）★イイト [®] 処方してください ※HER2陰性 確認必要	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液（大塚） 500mL:1本 Day1 オブジーボ点滴静注:360mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1

消化器内科	FOLFOXIRI+Pani		1	13	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 ペクテビックス点滴静注 100mg/5mL (冷):6m g/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85m g/m Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400m g/m Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1
消化器内科	(臨床試験)AFL/FOLFIRI HGCSG1801		1	13	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 ザルトラップ点滴静注:4m g/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:180m g/m Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):400m g/m Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400m g/m Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
消化器内科	(3剤)Cet(500mg/m2隔週)+Binimetinib+Encorafenib	Binimetinib(1回45mg1日2回) Encorafenib(1回300mg1日1回) ; 既治療 BRAF変異mCRC	1	13	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:500m g/m Day1 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1
消化器内科	Pembro+FP (食道癌)	※6サイクルまで。7サイクル目以降は Pembro+5FU (食道癌維持療法) へ。アプレ ヒタント処方必要。	5	16	アクチット輸液 500mL:2本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 アクチット輸液 500mL:1本 Day1 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 ブドウ糖液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9m g Day1 シスプラチン注:80m g/m Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):800m g/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL (冷):200m g Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day2 Day3 Day4 グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day5
腎臓内科	Rituximab (難治性初発)		22	6	リツキサン点滴静注:375m g/m Day1 Day8 Day15 Day22 生食注:337.5m L/m Day1 Day8 Day15 Day22
腎臓内科	Rituximab (10倍希釈) (BS)		1	0	リツキシマブBS点滴静注:375m g/m Day1 生食注:337.5m L/m Day1
腎臓内科	IVCY (腎内)		1	0	グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):750m g/m Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 ソルデム 3 A 500mL:2本 Day1 フロセミド注 20mg/2mL [ラックス] :1A Day1
糖尿病内分泌内科	CVD (悪性褐色細胞腫)	イメンドカプセル、デカドロン8mg(p.o.) Day3,4 の処方をしてください	2	19	グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day2 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9m g Day1 Day2 ダカルバジン注用 100mg (冷):600m g/m Day1 Day2 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 注射用エンドキサン 500mg (冷):750m g/m Day1 オンゴピン注射用 1mg (冷):1.4m g/m Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2
血液内科	HD-LPAM+PBSCT		2	2	生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day2 ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg/2mL:1A Day1 Day2 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [フルラ] :1A Day1 Day2 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 Day2 アルケラン静注用 50mg:100m g Day1 Day2 アルケラン静注用 50mg:100m g/m Day1 Day2
血液内科	ABVD		15	13	ビカーボン注 500mL:500m L Day1 Day15 ドキシリビシン塩酸塩注射液:25m g/m Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day15 プレオ注射用 15mg:10m g/m Day1 Day15 エグザール注射用 10mg:6m g/m Day1 Day15 ダカルバジン注用 100mg:375m g/m Day1 Day15 グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day15
血液内科	Rituximab (初回投与)	リツキサン投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬の 前投薬を行うこと	1	0	リツキシマブBS点滴静注:375m g/m Day1 生食注:337.5m L/m Day1
血液内科	Rituximab (2回目以降)	リツキサン投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬の 前投薬を行うこと	1	0	リツキシマブBS点滴静注:375m g/m Day1 生食注:337.5m L/m Day1
血液内科	Rituximab (ITP専用 先発品)	週1回 4回投与 (10倍希釈)	1	6	リツキサン点滴静注:375m g/m Day1 生食注:337.5m L/m Day1
血液内科	IT-Triple		1	0	メソトレキセート注射液:15m g Day1 水溶性プレドニン 20mg:20m g Day1 キロサイド注:40m g Day1 生食注 20mL「CMX」:3m L Day1

血液内科	CHOP		5	9	<p>フロセミド注 20mg/2mL:20m g Day1 グラセトロン点滴静注[®] ヲガ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 ドキソルビシン塩酸塩注射液:50m g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンコピン注射用 1mg:1.4m g/m² Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):750m g/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 水溶性プレドニン 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ビカーボン注 500mL:500m L Day1</p>
血液内科	THP-COP		5	9	<p>フロセミド注 20mg/2mL:20m g Day1 グラセトロン点滴静注[®] ヲガ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 注射用テラルピシン:50m g/m² Day1 5%ブドウ糖液 100mL:100m L Day1 オンコピン注射用 1mg:1.4m g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):750m g/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 水溶性プレドニン 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ビカーボン注 500mL:500m L Day1</p>
血液内科	hyper-CVAD		14	0	<p>ウロミテキサン注 100mg/1mL:600m g/m² Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 Day2 Day3 注射用エンドキサン 500mg (冷):300m g/m² Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/1mL:33m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day11 Day12 Day13 Day14 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day11 Day12 Day13 Day14 グラセトロン点滴静注[®] ヲガ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day11 オンコピン注射用 1mg:2m g Day4 Day11 ドキソルビシン塩酸塩注射液:50m g/m² Day4 生理食塩液 P 50mL:48m L Day4</p>
血液内科	DHAP		4	17	<p>生食注 1000mL:1000m L Day1 Day2 マンニトールS注射液 300mL:300m L Day1 Day2 ビカーボン注 500mL:2000m L Day1 Day2 Day3 Day4 グラセトロン点滴静注[®] ヲガ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液 3.3mg/1mL:33m g Day1 Day2 Day3 Day4 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [テラ[®]ラ[®]]:1A Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン注「マルコ」:100m g/m² Day1 マンニトールS注射液 300mL:600m L Day1 シタラピン点滴静注液 1g/50mL:2000m g/m² Day2 Day3 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:500m L Day2 Day3</p>
血液内科	MCVC		9	0	<p>グラセトロン点滴静注[®] ヲガ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [テラ[®]ラ[®]]:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 ビカーボン注 500mL:2000m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 注射用サイメリン 50mg:200m g/m² Day1 Day6 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day9 カルボプラチン点滴静注液:300m g/m² Day2 Day3 Day4 Day5 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:500m L Day3 Day4 Day5 エトポシド点滴静注液 100mg/5mL 「サンド」:500m g/m² Day3 Day4 Day5 ビカーボン注 500mL:2500m L Day6 ソル・メドロール 125mg:125m g Day6 Day7 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day6 Day7 Day9 注射用エンドキサン 500mg (冷):50m g/kg Day6 Day7 生食注 1000mL:1000m L Day6 Day7 ウロミテキサン注 100mg/1mL:20m g/kg Day6 Day7 生理食塩液 P 50mL:50m L Day6 Day7 フロセミド注 20mg/2mL:20m g Day6 Day7 Day9 ビカーボン注 500mL:500m L Day6 Day7 ビカーボン注 500mL:3000m L Day7 ヒト[®]ロル[®]ナ[®]コ[®]ル[®]酸[®]エ[®]ル[®]Na[®]注射用 100mg [リ[®]コ[®]テ[®]]:300m g Day9</p>
血液内科	CHOP (VDS使用)		5	9	<p>フロセミド注 20mg/2mL:20m g Day1 グラセトロン点滴静注[®] ヲガ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 ドキソルビシン塩酸塩注射液:50m g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用フィルデシン:2m g/m² Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):750m g/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 水溶性プレドニン 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ビカーボン注 500mL:500m L Day1</p>
血液内科	THP-COP (VDS使用)		5	9	<p>フロセミド注 20mg/2mL:20m g Day1 グラセトロン点滴静注[®] ヲガ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 注射用テラルピシン:50m g/m² Day1 5%ブドウ糖液 100mL:100m L Day1 注射用フィルデシン:2m g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):750m g/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 水溶性プレドニン 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ビカーボン注 500mL:500m L Day1</p>
血液内科	ヘルケイド (皮下注)		11	10	<p>生食注 20mL 「CMX」:1.2m L Day1 Day4 Day8 Day11 ヘルケイド注射用 3mg:1.3m g/m² Day1 Day4 Day8 Day11</p>

血液内科	CAG療法		15	0	<p>生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg/2mL:1 A Day1 Day2 Day3 Day4 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [ｱﾙﾊﾞﾀﾝ] :1 A Day1 Day2 Day3 Day4 アクラシン注射用 20mg:14m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 ノイトロジン注 100μg:100μ g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 キロサイド注:10m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15</p>
血液内科	JALSGAML201 寛解導入（A）		7	0	<p>生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg/2mL:1 A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [ｱﾙﾊﾞﾀﾝ] :1 A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 イダマイシン注 5mg:12m g /m Day1 Day2 Day3 注射用水（大塚） 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 生食注（大塚） 500mL:500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 キロサイド注:100m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p>
血液内科	JALSGAML201 寛解導入（B）		7	0	<p>生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg/2mL:1 A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [ｱﾙﾊﾞﾀﾝ] :1 A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 ダウマイシン静注用 20mg:50m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注（大塚） 500mL:500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 キロサイド注:100m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p>
血液内科	JALSGAML201 地固めD群 I		5	0	<p>生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg/2mL:1 A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [ｱﾙﾊﾞﾀﾝ] :1 A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ノバントロン注 20mg/10mL:7m g /m Day1 Day2 Day3 生食注（大塚） 500mL:500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注:200m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
血液内科	JALSGAML201 地固めD群 II		5	0	<p>生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg/2mL:1 A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [ｱﾙﾊﾞﾀﾝ] :1 A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ダウマイシン静注用 20mg:50m g /m Day1 Day2 Day3 生食注（大塚） 500mL:500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注:200m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
血液内科	VAD		20	8	<p>グラセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [ｱﾙﾊﾞﾀﾝ] :1 A Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液 3.3mg/1mL:33m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day9 Day10 Day11 Day12 Day17 Day18 Day19 Day20 生理食塩液 P 50mL:48m L Day1 Day2 Day3 Day4 ドキシリピン塩酸塩注射液:9m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 オンコピン注射用 1mg:0.4m g Day1 Day2 Day3 Day4 生食注（大塚） 100mL:100m L Day9 Day10 Day11 Day12 Day17 Day18 Day19 Day20</p>
血液内科	MTX大量療法	（注意）2-4日目MTX濃度測定。MTX0.1μMで0回終了	5	9	<p>メイロン84(8.4%) 250mL:250m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注（大塚） 500mL:2000m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メソトレキセート注射液:4000m g /m Day2 生食注（大塚） 500mL:500m L Day2 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [ｱﾙﾊﾞﾀﾝ] :1 A Day2 グラセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg/50mL:1本 Day2 ロイコボリン注 3mg/1mL:24m g Day3 Day4 Day5</p>
血液内科	CHASE		3	18	<p>グラセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/1mL:33m g Day1 Day2 Day3 注射用エンドキサン 500mg (冷):1200m g /m Day1 生食注（大塚） 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 フロセミド注 20mg/2mL:1 A Day1 Day2 Day3 イトボンド点滴静注液 100mg/5mL [サンド]:100m g /m Day1 Day2 Day3 ピカーボン注 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 シタラピン点滴静注液 1g/50mL:2000m g /m Day2 Day3</p>
血液内科	EPOCH		5	16	<p>塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [ｱﾙﾊﾞﾀﾝ] :1 A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イトボンド点滴静注液 100mg/5mL [サンド]:50m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 生食注（大塚） 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンコピン注射用 1mg:0.4m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 ドキシリピン塩酸塩注射液:10m g /m Day1 Day2 Day3 Day4 生食注（大塚） 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液 500mL:2本 Day1 Day2 Day3 Day4 水溶性ブレドニン 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 500mL:3本 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):750m g /m Day5</p>

血液内科	L-asparaginase-based salvage regimen		7	14	グラネセトロン点滴静注ハッガ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [70キ]:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 オンコピン注射用 1mg:1.4m g/m ² Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1 ロイナゼ注用 5000単位:6000国単/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 5%ブドウ糖液(大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	ベンダムスチン		2	19	グラネセトロン点滴静注ハッガ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL (冷):120m g/m ² Day1 Day2 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day2
血液内科	大量MTX/araC (PCNSL)		6	15	メイロン84(8.4%) 250mL:500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラネセトロン点滴静注ハッガ 1mg/50mL:1本 Day2 Day3 Day4 メソトレキセート注射液:500m g/m ² Day2 生食注(大塚) 100mL:1本 Day2 メソトレキセート注射液:3000m g/m ² Day2 生食注(大塚) 500mL:500m L Day2 Day3 Day4 ソル・メドロール 125mg:125m g Day3 Day4 生食注(大塚) 100mL:100m L Day3 Day4 ロイコボリン注 3mg/1mL:15m g Day3 Day4 Day5 Day6 シタラピン点滴静注液 1g/50mL:2000m g/m ² Day3 Day4
血液内科	アザシチジン(皮下)		7	21	ビダーザ注射用 100mg:75m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 注射用水(大塚) 20mL:20m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	アザシチジン(点滴)		7	21	ビダーザ注射用 100mg:75m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 注射用水(大塚) 20mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	VP-16+CY+TBI		4	3	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70キ]:1本 Day1 Day4 イトボシ点滴静注液 100mg/5mL 「サンド」:15m g/kg Day1 Day2 生食注 1000mL:1000m L Day1 Day2 生食注(大塚) 100mL:100m L Day3 Day4 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day3 Day4 生理食塩液 P 50mL:50m L Day3 Day4 ウロメキシカン注 100mg/1mL:24m g/kg Day3 Day4 生食注(大塚) 500mL:500m L Day3 Day4 注射用エンドキシカン 500mg (冷):60m g/kg Day3 Day4
血液内科	ボテリジオ		50	6	ボテリジオ点滴静注 20mg/5mL:1m g/kg Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 生食注(大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50
血液内科	ソメタ(骨病変)	(注意) 外来化学療法センター用	1	20	生食注(大塚) 100mL:100m L Day1 ソレドロン酸点滴静注 4mg/5mL:4m g Day1
血液内科	ランマーク	注意 外来化学療法センター用	1	27	ランマーク皮下注 120mg:120m g Day1
血液内科	ATO		5	2	トリセメックス注 10mg/10mL:0.15m g/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 5%ブドウ糖液(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
血液内科	GDP (GEM+CDDP+Dexa)		8	13	生食注(大塚) 500mL:1本 Day1 マンニトールS注射液 300mL:1袋 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70キ]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:10A Day1 Day2 Day3 Day4 生食注(大塚) 500mL:3本 Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m ² Day1 Day8 生食注(大塚) 500mL:500m L Day1 シスプラチン注「マルコ」:75m g/m ² Day1 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 Day2 Day3 ヴィーンD輸液 500mL:1袋 Day2 Day3 ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg/2mL:1A Day8 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day8 生食注(大塚) バッグ 250mL:1本 Day8
血液内科	Intravitreal MTX (片眼)		1	0	注射用メソトレキセート 5mg:0.5m g Day1 注射用水(大塚) 20mL:1A Day1
血液内科	JALSG ALL202-O (維持療法)		1	0	グラネセトロン点滴静注ハッガ 1mg/50mL:1本 Day1 オンコピン注射用 1mg:1.3m g/m ² Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1
血液内科	プレントキシマブ ヘドチン		1	20	アドセトリス点滴静注用 50mg:1.8m g/kg Day1 注射用水(大塚) 20mL:2A Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1

血液内科	VTD-PACE (1サイクル目)	day4-7 剤 200mg/body 内服	11	17	<p>ベルケイド注射用 3mg:1mg/ml Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL「CMX」:1.2mL Day1 Day4 Day8 Day11 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1本 Day4 デキサート注射液 3.3mg/1mL:10A Day4 Day5 Day6 Day7 シスプラチン注「マルコ」:10mg/ml Day4 Day5 Day6 Day7 注射用エンドキサン 500mg (冷):400mg/ml Day4 Day5 Day6 Day7 イトボンド点滴静注液 100mg/5mL「サンド」:40mg/ml Day4 Day5 Day6 Day7 生食注 1000mL:1000mL Day4 Day5 Day6 Day7 ドキソルピジン塩酸塩注射液:10mg/ml Day4 Day5 Day6 Day7 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day4 Day5 Day6 Day7 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day5 Day6 Day7</p>
血液内科	VTD-PACE (2サイクル目)	Day1-4 剤 200mg/body 内服	11	17	<p>ベルケイド注射用 3mg:1mg/ml Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL「CMX」:1.2mL Day1 Day4 Day8 Day11 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:10A Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン注「マルコ」:10mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4 注射用エンドキサン 500mg (冷):400mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4 イトボンド点滴静注液 100mg/5mL「サンド」:40mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 1000mL:1000mL Day1 Day2 Day3 Day4 ドキソルピジン塩酸塩注射液:10mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day2 Day3 Day4</p>
血液内科	CEOP	ラステットカプセル 100mg/ml 経口day2、3	5	16	<p>フロセミド注 20mg/2mL:20mg Day1 グラニセトロン点滴静注「ツカ」 1mg/50mL:1本 Day1 イトボンド点滴静注液 100mg/5mL:50mg/ml Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:250mL Day1 オンコピン注射用 1mg:1.4mg/ml Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):750mg/ml Day1 生食注 (大塚) 500mL:500mL Day1 水溶性プレドニン 20mg:0.001mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ピカーボン注 500mL:500mL Day1</p>
血液内科	MPV	塩酸プロカルバジン100mg/ml経口 (2~8日目)	6	8	<p>メイロン84(8.4%) 250mL:500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注「ツカ」 1mg/50mL:1本 Day2 メソトレキセート注射液:500mg/ml Day2 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day2 メソトレキセート注射液:3000mg/ml Day2 生食注 (大塚) 500mL:500mL Day2 オンコピン注射用 1mg (冷):1.4mg/ml Day2 ロイコリン注 3mg/1mL:15mg Day3 Day4 Day5 Day6</p>
血液内科	エロツズマブ (E-Ld C1-2) 【体重50kg~90kg】	レブラミド25mg/1x 内服 day1~21	22	6	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 Day8 Day15 Day22 エムプリシティ点滴静注用 300mg (冷):10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 (大塚) バッグ 250mL:250mL Day1 Day8 Day15 Day22 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22</p>
血液内科	エロツズマブ (E-Ld C3以降) 【体重50kg未満】	レブラミド25mg/1x 内服 day1~21	15	13	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 Day15 エムプリシティ点滴静注用 300mg (冷):10mg/kg Day1 Day15 生食注 (大塚) バッグ 250mL:150mL Day1 Day15 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day15</p>
血液内科	エロツズマブ (E-Ld C3以降) 【体重50kg~90kg】	レブラミド25mg/1x 内服 day1~21	15	13	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 Day15 エムプリシティ点滴静注用 300mg (冷):10mg/kg Day1 Day15 生食注 (大塚) バッグ 250mL:250mL Day1 Day15 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day15</p>
血液内科	CHOEP		5	16	<p>水溶性プレドニン 20mg:0.001mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注「ツカ」 1mg/50mL:1袋 Day1 Day2 Day3 イトボンド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/ml Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 500mL:500mL Day1 Day2 Day3 ドキソルピジン塩酸塩注射液:50mg/ml Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):750mg/ml Day1 フロセミド注 20mg/2mL:20mg Day1 ピカーボン注 500mL:500mL Day1 オンコピン注射用 1mg (冷):1.4mg/ml Day1</p>
血液内科	ICE	IFM投与後、充分量の補液について検討願います	3	18	<p>グラニセトロン点滴静注「ツカ」 1mg/50mL:1袋 Day1 イトボンド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/ml Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 500mL:500mL Day1 Day2 Day3 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day2 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day2 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day2 ウロミテキサン注 100mg/1mL:1000mg/ml Day2 生食注 (大塚) バッグ 250mL:250mL Day2 注射用イホマイド 1g:5g/ml Day2 ウロミテキサン注 100mg/1mL:2000mg/ml Day2 Day3</p>

血液内科	MEAM		6	0	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 Day4 注射用サイメリン 50mg (冷):300mg g/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:200mg g/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注:200mg g/m ² Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day6 アルケラン静注用 50mg:100mg g Day6 アルケラン静注用 50mg:140mg g/m ² Day6
血液内科	(点滴DARA)DLd (3~6サイクル目)	Rev Day1~21/Dex(4)5T/1xDay1,2,15,16/前投0キリ° 071°・キリ°各1T	15	13	ダラザレックス点滴静注:16mg g/kg Day1 Day15 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 Day15
血液内科	(点滴DARA)DLd (7サイクル目以降)	Rev Day1~21/Dex(4)5T/1xDay1,2/前投0キリ° 071°・キリ°各1T	1	27	ダラザレックス点滴静注:16mg g/kg Day1 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1
血液内科	(点滴DARA)DBd (9サイクル目以降)	前投薬0キリ° 071°・キリ°各1T	1	27	ダラザレックス点滴静注:16mg g/kg Day1 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1
血液内科	ベルケイド (s.c, 週1回)	併用のDexalは別途入力。	22	13	生食注 20mL「CMX」:1.2m L Day1 Day8 Day15 Day22 ベルケイド注射用 3mg:1.3m g/m ² Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	VRD (s.c, 週2回)	Rev day1-14, Bor day1, 4, 8, 11。	11	10	生食注 20mL「CMX」:1.2m L Day1 Day4 Day8 Day11 ベルケイド注射用 3mg:1.3m g/m ² Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	KRd (13サイクル以降)	リ°ラト° 25mg/日day1~21内服 ; デ°カト° 40mg/日1, 8, 15, 22内服 ; デ°カト° 4mgday2, 16内服	16	12	カイプロリス点滴静注用:27mg g/m ² Day1 Day2 Day15 Day16 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day15 Day16 5%ブドウ糖液 100mL:50m L Day1 Day2 Day15 Day16
血液内科	プリナツモマブ (1サイクル目) 【体重45kg以上】		28	14	ビーリンサイト点滴静注用 35μg (冷):9μ g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生理食塩液 P 50mL:12m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 注射用水 (大塚) 20mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 輸液安定化液 (ビーリンサイト) :5.5m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 デキサート注射液 3.3mg/1mL:5A Day1 Day8 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 ビーリンサイト点滴静注用 35μg (冷):28μ g Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28
血液内科	プリナツモマブ (2~5サイクル目) 【体重45kg以上】		28	14	デキサート注射液 3.3mg/1mL:5A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ビーリンサイト点滴静注用 35μg (冷):28μ g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生理食塩液 P 50mL:12m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 注射用水 (大塚) 20mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 輸液安定化液 (ビーリンサイト) :5.5m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28
血液内科	オビヌツマブ (ガザイバ)	★導入療法:1サイクル目 (day1,8,15) 、2サイ クル目以降(day1)、★維持療法:単独投与1回 /2ヶ月、最長2年	1	6	ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL (冷):1000mg g Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:210m L Day1
血液内科	ベスボンサ (1サイクル目)	Day1, 8, 15 : カロナール(300) 2錠、メキタジ ン(3) 1錠を前投与	15	6	ヒト°ロルリ°コリ酸エステルNa注射用 100mg [リ°コ°テ]:1V Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ベスボンサ点滴静注用 1mg (冷):0.8m g/m ² Day1 注射用水 (大塚) 20mL:1A Day1 Day8 Day15 ベスボンサ点滴静注用 1mg (冷):0.5m g/m ² Day8 Day15
血液内科	ベスボンサ (寛解2~6サイクル目)	Day1, 8, 15 : カロナール(300) 2錠、メキタジ ン(3) 1錠を前投与	15	13	ヒト°ロルリ°コリ酸エステルNa注射用 100mg [リ°コ°テ]:1V Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ベスボンサ点滴静注用 1mg (冷):0.5m g/m ² Day1 Day8 Day15 注射用水 (大塚) 20mL:1A Day1 Day8 Day15
血液内科	ロミデプシン		15	13	イストグックス点滴静注用 10mg:14m g/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day8 Day15 グラセトロン点滴静注用°キ° 1mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15

血液内科	エロツズマブ (E-Pd C1-2) 【体重50kg未満】	ボマリドミド 4mg/1× 内服 day1~21	22	6	デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day8 Day15 Day22 エムプリシテ点滴静注用 300mg (冷):10m g/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 (大塚) バッグ 250mL:150m L Day1 Day8 Day15 Day22 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	エロツズマブ (E-Pd C3以降) 【体重50kg未満】	ボマリドミド 4mg/1× 内服 day1~21	1	27	デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 エムプリシテ点滴静注用 300mg (冷):20m g/kg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:150m L Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1
血液内科	エロツズマブ (E-Pd C1-2) 【体重50kg~90kg】	ボマリドミド 4mg/1× 内服 day1~21	22	6	デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day8 Day15 Day22 エムプリシテ点滴静注用 300mg (冷):10m g/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	エロツズマブ (E-Pd C3以降) 【体重50kg~90kg】	ボマリドミド 4mg/1× 内服 day1~21	1	27	デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 エムプリシテ点滴静注用 300mg (冷):20m g/kg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1
血液内科	(点滴DARA)DMPB (2-9サイクル目)	アルケラDay1-4/PSL Day2-4/Dex(4)5T/1xDay1,22/前投薬ロシニドニル各1T	29	13	生食注 20mL:1.2m L Day1 Day8 Day22 Day29 ヘルケイト注射液 3mg:1.3m g/m ² Day1 Day8 Day22 Day29 ダラザレックス点滴静注:16m g/kg Day1 Day22 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 Day22
血液内科	A+CHP	※最大8サイクルまで	5	16	アドセトリス点滴静注用 50mg (冷):1.8m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 20mL:2A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 グラニセトロン点滴静注用「ツカ」 1mg/50mL:1本 Day1 ドキシソリン塩酸塩注射液:50m g/m ² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):750m g/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 フロセミド注 20mg/2mL:20m g Day1 ピカーボン注 500mL:500m L Day1 水溶性ブレドニン 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
血液内科	Kd (週1回 1サイクル目)	デカト [®] 40mg/日day1,8,15,22内服	15	13	カイプロリス点滴静注用:20m g/m ² Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 100mL:50m L Day1 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用:70m g/m ² Day8 Day15
血液内科	Kd (週1回 2サイクル目以降)	デカト [®] 40mg/日day1,8,15,22内服	15	13	カイプロリス点滴静注用:70m g/m ² Day1 Day8 Day15 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 100mL:50m L Day1 Day8 Day15
血液内科	ALL/MRD2019 寛解導入療法(16才以上35才以下)	PSL60mg/m ² (MAX100mg) day1-21	22	6	パロメセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70mg]:1袋 Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):1000m g/m ² Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 タウノマイシン静注用 20mg:50m g/m ² Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 オンコピン注射液 1mg:1.3m g/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 ロイナゼ注用 5000単位:6000国単/m ² Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 グラニセトロン点滴静注用「ツカ」 1mg/50mL:1本 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20
血液内科	ALL/MRD2019 地固め療法 (C-1) (16才以上35才以下)	day1 MTX15mg/DEX3.3mg IT	18	0	オンコピン注射液 1mg (冷):1.3m g/m ² Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day15 メソトレキセート注射液:2700m g/m ² Day1 Day15 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day15 メソトレキセート注射液:300m g/m ² Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注用「ツカ」 1mg/50mL:1袋 Day1 Day2 Day15 Day16 メイロン84(8.4%) 250mL:500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day15 Day16 Day17 Day18 ヒト [®] ロシニドニル [®] ナトリウム注射液 100mg [100mg]:1V Day2 Day16 生理食塩液 P 50mL:1本 Day2 Day16 ロイナゼ注用 5000単位 (冷):10000国単/m ² Day2 Day16 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day2 Day16 ロイコリン注 3mg/1mL:15m g/m ² Day3 Day4 Day17 Day18
血液内科	IsaPd (1サイクル目)	POM day1-21/Dex day1,8,15,22/前投薬 NSAIDs,H1,H2ブロッカー	22	6	サークサ点滴静注:10m g/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	IsaPd (2サイクル目以降)	POM day1-21/Dex day1,8,15,22/前投薬 NSAIDs,H1,H2ブロッカー	15	13	サークサ点滴静注:10m g/kg Day1 Day15 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day15
血液内科	ALL/MRD2019維持療法(M-1)(16才以上35才以下)	6-MP50mg/m ² /day 1×vds / MTX20mg/m ² /week 1×vds / PSL60mg/m ² day1-5 Max100mg	1	27	グラニセトロン点滴静注用「ツカ」 1mg/50mL:1本 Day1 オンコピン注射液 1mg:1.3m g/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 水溶性ブレドニン 20mg:60m g/m ² Day1 ロイナゼ注用 5000単位 (冷):10000国単/m ² Day1 ヒト [®] ロシニドニル [®] ナトリウム注射液 100mg [100mg]:50m g Day1 ロカイン注1% 20mg/2mL:0.3m L Day1 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1

血液内科	(点滴DARA)DKd (3-6サイクル目)	DEX20mg d1,2,8,9,15,16/DEX40mg d22/前投NSAID,抗ヒス	16	12	カイトロリス点滴静注用:56mg g/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖液 100mL:50m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラザレックス点滴静注:16mg g/kg Day1 Day15 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 Day15	
血液内科	LEED			4	0	注射用インドキサン:60mg g/kg Day1 Day2 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 ウロミデキサン注 100mg/1mL:24mg g/kg Day1 Day2 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 Day2 生食注 1000mL:1000m L Day1 Day2 Day3 イトボンド点滴静注液 100mg/5mL:500mg g/m ² Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注用「ツカ」 1mg/50mL:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサートン注射用 3.3mg/1mL:33mg g Day1 Day2 Day3 Day4 パロノセトロン点滴静注用バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day4 アルケラン静注用 50mg:130mg g/m ² Day4 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day4
血液内科	DLd (1~2サイクル目)	LEN Day1~21/Dex Day1,(2),8,(9),15,(16),22,(23)/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex/初回のみLT拮抗	22	6	6	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	DLd (3~6サイクル目)	LEN Day1~21/Dex Day1,(2),8,(9),15,(16),22,(23)/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	15	13	13	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day15
血液内科	DLd (7サイクル目以降)	LEN Day1~21/Dex Day1,(2),8,(9),15,(16),22,(23)/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	1	27	27	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1
血液内科	DBd (1~3サイクル目)	Dex day1,2,4,5,8,9,11,12/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex/初回のみLT拮抗	15	6	6	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day8 Day15 生食注 20mL:1.2m L Day1 Day4 Day8 Day11 ベルケイト注射用 3mg:1.3mg g/m ² Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	DBd (4~8サイクル目)	Dex day1,2,4,5,8,9,11,12/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	11	10	10	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 生食注 20mL:1.2m L Day1 Day4 Day8 Day11 ベルケイト注射用 3mg:1.3mg g/m ² Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	DBd (9サイクル目以降)	前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	1	20	20	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1
血液内科	DKd (1サイクル目)	Dex day1,2,8,9,15,16,22/前投薬NSAID・抗ヒス・Dex/初回のみLT拮抗	22	6	6	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day8 Day15 Day22 カイトロリス点滴静注用:20mg g/m ² Day1 Day2 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖液 100mL:50m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイトロリス点滴静注用:56mg g/m ² Day8 Day9 Day15 Day16
血液内科	DKd (2サイクル目)	Dex day1,2,8,9,15,16,22/前投薬NSAID・抗ヒス・Dex	22	6	6	カイトロリス点滴静注用:56mg g/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖液 100mL:50m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	DKd (3-6サイクル目)	Dex day1,2,8,9,15,16,22/前投薬NSAID・抗ヒス・Dex	16	12	12	カイトロリス点滴静注用:56mg g/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖液 100mL:50m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day15
血液内科	DKd (7サイクル目以降)	Dex day1,2,8,9,15,16,22/前投薬NSAID・抗ヒス・Dex	16	12	12	カイトロリス点滴静注用:56mg g/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖液 100mL:50m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1
血液内科	DMPB (1サイクル目)	アルカラン9mg/m ² day1-4/PSL60mg/m ² day2-4/Dex day1,8,15,22,29,36/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex/初回のみLT拮抗	36	6	6	生食注 20mL:1.2m L Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 ベルケイト注射用 3mg:1.3mg g/m ² Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36
血液内科	DMPB (2~9サイクル目)	アルカラン9mg/m ² day1-4/PSL60mg/m ² day2-4/Dex day1,22/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	29	13	13	生食注 20mL:1.2m L Day1 Day8 Day22 Day29 ベルケイト注射用 3mg:1.3mg g/m ² Day1 Day8 Day22 Day29 ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day22
血液内科	DMPB (10サイクル目以降)	Dex day1/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	1	27	27	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1
血液内科	DA-EPOCH (1ハル1)			5	16	塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [メトクロ]:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注用「ツカ」 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イトボンド点滴静注液 100mg/5mL 「サンド」:50mg g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンコピン注射用 1mg:0.4mg g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ドキソビリン塩酸塩注射液:10mg g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液 500mL:2本 Day1 Day2 Day3 Day4 水溶性ブレドニン 20mg:0.001mg g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 500mL:3本 Day5 注射用インドキサン 500mg (冷):750mg g/m ² Day5

血液内科	DA-EPOCH (Ⅱ°Ⅱ2)		5	16	<p>塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [Ⅱ°Ⅱ2] :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注Ⅱ°Ⅱ2 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトボシド点滴静注液 100mg/5mL [Ⅱ°Ⅱ2]:60m g/Ⅱ Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンコピン注射用 1mg:0.4m g/Ⅱ Day1 Day2 Day3 Day4 ドキソリビシン塩酸塩注射液:12m g/Ⅱ Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液 500mL:2本 Day1 Day2 Day3 Day4 水溶性プレドニン 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):900m g/Ⅱ Day5 ソルデム1輸液 500mL:3本 Day5</p>
血液内科	DA-EPOCH (Ⅱ°Ⅱ3)		5	16	<p>塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [Ⅱ°Ⅱ3] :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注Ⅱ°Ⅱ3 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトボシド点滴静注液 100mg/5mL [Ⅱ°Ⅱ3]:72m g/Ⅱ Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンコピン注射用 1mg:0.4m g/Ⅱ Day1 Day2 Day3 Day4 ドキソリビシン塩酸塩注射液:14m g/Ⅱ Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液 500mL:2本 Day1 Day2 Day3 Day4 水溶性プレドニン 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):1080m g/Ⅱ Day5 ソルデム1輸液 500mL:3本 Day5</p>
血液内科	DA-EPOCH (Ⅱ°Ⅱ4)		5	16	<p>塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [Ⅱ°Ⅱ4] :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注Ⅱ°Ⅱ4 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトボシド点滴静注液 100mg/5mL [Ⅱ°Ⅱ4]:86m g/Ⅱ Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンコピン注射用 1mg:0.4m g/Ⅱ Day1 Day2 Day3 Day4 ドキソリビシン塩酸塩注射液:17m g/Ⅱ Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液 500mL:2本 Day1 Day2 Day3 Day4 水溶性プレドニン 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):1290m g/Ⅱ Day5 ソルデム1輸液 500mL:3本 Day5</p>
血液内科	プリナツモマブ (1サイクル目) 【体重45kg未満】		28	14	<p>ビーリンサイト点滴静注用 35μg (冷):5μ g/Ⅱ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生理食塩液 P 50mL:12m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 注射用水 (大塚) 20mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 輸液安定化液 (ビーリンサイト) :5.5m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 デキサート注射液 3.3mg/1mL:5A Day1 Day8 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 ビーリンサイト点滴静注用 35μg (冷):15μ g/Ⅱ Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28</p>
血液内科	プリナツモマブ (2~5サイクル目) 【体重45kg未満】		28	14	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:5A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ビーリンサイト点滴静注用 35μg (冷):15μ g/Ⅱ Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 生理食塩液 P 50mL:12m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 注射用水 (大塚) 20mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28 輸液安定化液 (ビーリンサイト) :5.5m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 Day23 Day24 Day25 Day26 Day27 Day28</p>

血液内科	Pola+BR 1コース目	リツキシマブ、ボライビー投与30分～1時間前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬を投与	3	18	リツキシマブBS点滴静注:375mg/m ² Day1 生食注:337.5m L/m ² Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9mg Day2 Day3 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day2 Day3 ボライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day2 注射用水(大塚) 20mL:1A Day2 生食注(大塚) 100mL:1瓶 Day2 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70μg]:1袋 Day2 トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL (冷):90mg/m ² Day2 Day3 生理食塩液 P 50mL:1本 Day2 Day3
血液内科	Pola+BR 2コース目以降	リツキシマブ投与30分～1時間前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬を投与	2	19	リツキシマブBS点滴静注:375mg/m ² Day1 生食注:337.5m L/m ² Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9mg Day1 Day2 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day2 ボライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day1 注射用水(大塚) 20mL:1A Day1 生食注(大塚) 100mL:1瓶 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70μg]:1袋 Day1 トリアキシン点滴静注液 100mg/4mL (冷):90mg/m ² Day1 Day2 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2
血液内科	DCyBorD (1～2サイクル目)	Dex20mg day1,2,8,9,15,16,22,23/CPA内服 300mg/m ² day1,8,15,22 前投薬 NSAIDs・抗ヒ・Dex/初回のみLT拮抗	22	6	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 20mL:1.2m L Day1 Day8 Day15 Day22 ペルケイド注射用 3mg:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	DCyBorD (3～6サイクル目)	Dex20mg day1,2,15,16/Dex40mg day8,22/CPA内服300mg/m ² day1,8,15,22 前投薬 NSAID・抗ヒ・Dex	22	6	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day15 生食注 20mL:1.2m L Day1 Day8 Day15 Day22 ペルケイド注射用 3mg:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	DCyBorD (7サイクル目以降)	前投薬 NSAID・抗ヒ・Dex	1	27	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1
血液内科	short-MTX (15-10-10)		6	0	メソトレキセート注射液:15mg/m ² Day1 生食注 20mL「C M X」:2A Day1 Day3 Day6 メソトレキセート注射液:10mg/m ² Day3 Day6
血液内科	VEN/LDAC	ベネクレクタ 連日内服	10	18	キロサイド注:20mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10
血液内科	Isa+d (1サイクル目)	Dex day1,8,15,22/前投薬 NSAIDs,H1,H2 受容体拮抗薬	22	6	サークルサ点静注:20mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	Isa単独 (2サイクル目以降)	前投薬 NSAIDs,H1,H2受容体拮抗薬	15	13	ソル・メドロール 125mg:1V Day1 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day15 サークルサ点静注:20mg/kg Day1 Day15 生食注(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day15
血液内科	IsaKd (1サイクル目)	Dex day1,2,8,9,15,16,22,23/前投薬 NSAIDs,H1,H2ブロッカー	22	6	サークルサ点静注:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 カイトロリス点滴静注用:20mg/m ² Day1 Day2 注射用水(大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖液 100mL:50m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイトロリス点滴静注用:56mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16
血液内科	IsaKd (2サイクル目以降)	Dex day1,2,8,9,15,16,22,23/前投薬 NSAIDs,H1,H2ブロッカー	16	12	カイトロリス点滴静注用:56mg/m ² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水(大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖液 100mL:50m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 サークルサ点静注:10mg/kg Day1 Day15 生食注(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day15
外科・乳腺外科	3週毎ドセタキセル		1	20	グラニセトロン点滴静注「ツク」 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドセタキセル点滴静注用:75mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
外科・乳腺外科	Weeklyパクリタキセル		1	6	レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 グラニセトロン点滴静注「ツク」 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 パクリタキセル注:80mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1
外科・乳腺外科	3週毎トラスツマブ (2回目以降)		1	20	トラスツマブBS点滴静注用 150mg (冷) [ルセフチン]:6mg/kg Day1 注射用水(大塚) 100mL:1本 Day1 生食注(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1
外科・乳腺外科	3週毎トラスツマブ (初回)		1	20	トラスツマブBS点滴静注用 150mg (冷) [ルセフチン]:8mg/kg Day1 注射用水(大塚) 100mL:1本 Day1 生食注(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1

外科・乳腺外科	HER+PTX (初回)		1	6	<p>レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 トラスズマブ[®]BS点滴静注用 150mg (冷) [ルセブ[®]チ] :4mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:20m g Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 グラニセトロン点滴静注[®]ツカ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 パクリタキセル注:80m g /m³ Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>
外科・乳腺外科	HER+PTX (2回目以降)		1	6	<p>レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 トラスズマブ[®]BS点滴静注用 150mg (冷) [ルセブ[®]チ] :2m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:20m g Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 グラニセトロン点滴静注[®]ツカ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 パクリタキセル注:80m g /m³ Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>
外科・乳腺外科	VNR (乳腺外科)		8	13	<p>生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 Day8 ロゼウス静注液:25m g /m³ Day1 Day8</p>
外科・乳腺外科	GEM単剤 (乳癌)		8	13	<p>生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注[®]ツカ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1250m g /m³ Day1 Day8 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8</p>
外科・乳腺外科	ハラヴェン		8	13	<p>生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 ハラヴェン静注 1mg/2ml:1.4m g /m³ Day1 Day8 生理食塩液 P 50mL:25m L Day1 Day8</p>
外科・乳腺外科	3週毎Her+DTX (初回)		2	19	<p>トラスズマブ[®]BS点滴静注用 150mg (冷) [ルセブ[®]チ] :8m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注[®]ツカ[®] 1mg/50mL:1本 Day2 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day2 ドセタキセル点滴静注用:75m g /m³ Day2 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day2</p>
外科・乳腺外科	3週毎Her+DTX (2回目以降)		1	20	<p>トラスズマブ[®]BS点滴静注用 150mg (冷) [ルセブ[®]チ] :6m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 グラニセトロン点滴静注[®]ツカ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドセタキセル点滴静注用:75m g /m³ Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>
外科・乳腺外科	フェソロデックス4週目以降		1	27	フェソロデックス筋注 250mg/5mL:500m g Day1
外科・乳腺外科	ランマーク	(注意) 外来化学療法センター用	1	27	ランマーク皮下注 120mg:120m g Day1
外科・乳腺外科	リュープリンSR 11.25	(注意) 外来化学療法センター用	1	83	リュープリン S R注射用キット 11.25mg:11.25m g Day1
外科・乳腺外科	HER+Pertuzumab+DOC (初回)		2	20	<p>パージェタ点滴静注 420mg/14mL:840m g Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 トラスズマブ[®]BS点滴静注用 150mg (冷) [ルセブ[®]チ] :8m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 グラニセトロン点滴静注[®]ツカ[®] 1mg/50mL:1本 Day2 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day2 ドセタキセル点滴静注用:75m g /m³ Day2 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day2</p>
外科・乳腺外科	HER+Pertuzumab+DOC (2回目以降)		1	20	<p>パージェタ点滴静注 420mg/14mL:420m g Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 トラスズマブ[®]BS点滴静注用 150mg (冷) [ルセブ[®]チ] :6m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 グラニセトロン点滴静注[®]ツカ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 ドセタキセル点滴静注用:75m g /m³ Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>
外科・乳腺外科	HER+Pertuzumab (初回)		1	20	<p>パージェタ点滴静注 420mg/14mL:840m g Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 トラスズマブ[®]BS点滴静注用 150mg (冷) [ルセブ[®]チ] :8m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
外科・乳腺外科	HER+Pertuzumab (2回目以降)		1	20	<p>パージェタ点滴静注 420mg/14mL:420m g Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 トラスズマブ[®]BS点滴静注用 150mg (冷) [ルセブ[®]チ] :6m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
外科・乳腺外科	T-DM1		1	20	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:3.3m g Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 カドサイラ点滴静注用 100mg:3.6m g /kg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>

外科・乳腺外科	TC (乳腺 DOC+CPA)		1	20	<p>グラニセトロン点滴静注^{ハ^ツク} 1mg/50mL:1m g Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 ドセタキセル点滴静注用:75m g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):600m g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1</p>
外科・乳腺外科	AC		1	20	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg/2mL:1A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1瓶 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射液:60m g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):600m g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1</p>
外科・乳腺外科	Dose Dense AC		1	13	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg/2mL:1A Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射液:60m g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):600m g/m² Day1</p>
外科・乳腺外科	Dose Dense PTX		1	13	<p>レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 グラニセトロン点滴静注^{ハ^ツク} 1mg/50mL:1袋 Day1 バクリタキセル注:175m g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:500m L Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:16.5m g Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1</p>
外科・乳腺外科	エンハーツ (乳がん)		1	20	<p>グラニセトロン点滴静注^{ハ^ツク} 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1 エンハーツ点滴静注用 100mg (冷):5.4m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
外科・乳腺外科	Atezolizumab+nab-PTX (乳がん)		15	13	<p>テセントリク点滴静注 840mg/14mL (冷):840m g Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 アブリキサ点点滴静注用 100mg:100m g/m² Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注^{ハ^ツク} 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15</p>
産婦人科	TCweekly(PTX+CBDCA) (両側分割腹膜癌)		15	6	<p>パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70^分]:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注:78m g/m² Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:0m g/A Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15</p>
産婦人科	TC conventional(PTX+CBDCA) (腹膜癌)		1	20	<p>レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70^分]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 バクリタキセル注:175m g/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0m g/A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1</p>
産婦人科	DC (DOC+CBDCA) (腹膜癌)		1	20	<p>パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70^分]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 ドセタキセル点滴静注用:60m g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0m g/A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1</p>
産婦人科	DC(DOC+CBDCA) (子宮体癌)		1	20	<p>パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70^分]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドセタキセル点滴静注用:60m g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0m g/A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1</p>
産婦人科	TC conventiona(PTX+CBDCA) (子宮体癌)		1	20	<p>レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70^分]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 バクリタキセル注:175m g/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0m g/A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1</p>

産婦人科	AP		2	19	生食注 1000mL:1000m L Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射液:60mg/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:0.75mg Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9mg Day1 シスプラチン注「マルコ」:50mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 ピカーボン注 500mL:500m L Day2 アクチット輸液 500mL:500m L Day2
産婦人科	CPT-P		15	13	ピカーボン注 500mL:1本 Day1 Day2 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:60mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day8 Day15 シスプラチン注「マルコ」:60mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:300m L Day1 アクチット輸液 500mL:1本 Day1 グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg/50mL:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day8 Day15
産婦人科	DC(DOC+CBDCA) (卵巣癌)	DTXは75mg/m ² に変更されています (2017.7-)	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドセタキセル点滴静注用:75mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1
産婦人科	GEM (再発卵巣癌) (3投1休)		15	13	グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15
産婦人科	TC-ip(PTX+CBDCA)		3	18	カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3.3mg Day1 生食注 20mL「CMX」:1A Day1 Day2 Day3 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1本 Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 バクリタキセル注:175mg/m ² Day1 ソルデム3A 500mL:1本 Day1 ピカーボン注 500mL:1本 Day1 Day2 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day2 Day3
産婦人科	CPT-11A (3投1休 ; A法)		15	13	イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15
産婦人科	TC conventional(PTX+CBDCA)		1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 バクリタキセル注:175mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1
産婦人科	TC weekly(PTX+CBDCA) (両側分割卵巣癌)		15	6	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注:78mg/m ² Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
産婦人科	PLD (投与量90mg未満)	PLDの総投与量が500mg/m ² を超えないように 注意	1	27	デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 ドキシル注 20mg/10mL:40mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
産婦人科	dd-TC(PTX+CBDCA)		15	6	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg/50mL:1本 Day8 Day15
産婦人科	PLD+CBDCA	PLDの総投与量が500mg/m ² を超えないように 注意	1	27	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドキシル注 20mg/10mL:30mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1

産婦人科	no g itecan		5	16	デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注 [®] ヲカ [®] 1mg/50mL:1本 Day1 ハイカムチン注射用 1.1mg:1.25m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
産婦人科	MTX単回		1	6	メソトレキセート注射液:50m g /m ² Day1 注射用水 (大塚) 20mL:1A Day1
産婦人科	TC+BEV(PTX+CBDCA+BEV)		1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70 ⁺]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 バクシキセル注:175m g /m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0m g /A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 アバスタチン点滴静注用:15m g /kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
産婦人科	BEV		1	20	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 アバスタチン点滴静注用:15m g /kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
産婦人科	PLD+BEV (投与量90mg未満)	PLDの総投与量が500mg/m ² を超えないように注意	15	13	デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day15 ドキシル注 20mg/10mL:40m g /m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 アバスタチン点滴静注用:10m g /kg Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day15
産婦人科	NGT+BEV(tri)		5	16	グラニセトロン点滴静注 [®] ヲカ [®] 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注射用 1.1mg:1.25m g /m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アバスタチン点滴静注用:15m g /kg Day1
産婦人科	DC-BEV(DOC+CBDCA+BEV)		1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70 ⁺]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドセタキセル点滴静注用:75m g /m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0m g /A Day1 アバスタチン点滴静注用:15m g /kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
産婦人科	GEM+BEV		15	13	グラニセトロン点滴静注 [®] ヲカ [®] 1mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注用:1000m g /m ² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アバスタチン点滴静注用:15m g /kg Day1
産婦人科	GC-BEV		8	13	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70 ⁺]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1000m g /m ² Day1 Day8 生食注 (大塚) 100mL:1瓶 Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液:0m g /A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 アバスタチン点滴静注用:15m g /kg Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day8 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 Day8
産婦人科	DOC (卵巣癌)		1	20	デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 ドセタキセル点滴静注用:75m g /m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
産婦人科	PLD+CBDCA+BEV	PLDの総投与量が500mg/m ² を超えないように注意	1	27	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70 ⁺]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドキシル注 20mg/10mL:30m g /m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0m g /A Day1 アバスタチン点滴静注用:15m g /kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
形成外科	DTIC		5	0	5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注 [®] ヲカ [®] 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ダカルバジン注用 100mg:200m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
形成外科	プレオマイシン		1	0	プレオ注射用 15mg:30m g Day1 生食注 20mL 「C M X」:5m L Day1
形成外科	ペブレオ		1	0	ペブレオ注射用 10mg:10m g Day1 生食注 20mL 「C M X」:1A Day1

皮膚科	乾癬レミケド(4回目以降)		1	0	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 レミケド点滴静注用 100mg:5m g/kg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
皮膚科	乾癬インフリキシマブBS (4回目以降)		1	0	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 インフリキシマブBS点滴静注用 100mg:5m g/kg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
泌尿器科	EP		9	12	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 ソルデム3 A 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 マンニトールS注射液 300mL:100m L Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 イトボンド点滴静注液 100mg/5mL 「サンド」:100m g/mi Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg/2mL:1A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 シスプラチン注「マルコ」:20m g/mi Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生食注 (大塚) 500mL:300m L Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9m g Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生食注 20mL 「CMX」:17m L Day2 Day3 Day4 Day5 Day6
泌尿器科	high-doseCE (CBDCA+VP16)	最大投与回数2回、イメド処方必要、Day6 PBSCT (症例限定)	5	16	ソルデム3 A 500mL:1000m L Day1 Day2 Day3 ヴィーンD輸液 500mL:500m L Day1 Day2 Day3 イトボンド点滴静注液 100mg/5mL:750m g/mi Day1 Day2 Day3 生食注 1000mL:1000m L Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注液:700m g/mi Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 パノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9m g Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム3 A 500mL:500m L Day4 Day5 フィジオ140輸液500mL:1000m L Day4 Day5
泌尿器科	(尿路上皮癌) TIN		7	21	ウロミデキサン注 100mg/1mL:300m g/mi Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 20mL 「CMX」:1A Day1 Day2 Day3 Day4 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 注射用イホマイド 1g:1.5g/mi Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 アクブラ静注用:70m g/mi Day1 バクリタキセル注:175m g/mi Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:16.5m g Day1 パノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1袋 Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 ソルデム3 A 500mL:1本 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
泌尿器科	(尿路上皮癌 ; マテナス) TIN		7	21	ウロミデキサン注 100mg/1mL:300m g/mi Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 20mL 「CMX」:1A Day1 Day2 Day3 Day4 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 注射用イホマイド 1g:1.5g/mi Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 アクブラ静注用:70m g/mi Day1 バクリタキセル注:175m g/mi Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:16.5m g Day1 パノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1袋 Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 ソルデム3 A 500mL:1本 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
泌尿器科	GC(3week)	3週1コースのレジメンです、イメド処方必要	8	13	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/mi Day1 Day8 ヴィーンD輸液 500mL:1000m L Day1 フィジオ140輸液500mL:500m L Day1 Day2 Day3 Day4 ヴィーンD輸液 500mL:500m L Day2 Day3 シスプラチン注「マルコ」:70m g/mi Day2 生食注 (大塚) 500mL:200m L Day2 フィジオ140輸液500mL:1袋 Day2 フロセド注 20mg/2mL:10m g Day2 パノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70#]:1袋 Day2 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9m g Day2 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day2
泌尿器科	Doc		1	20	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 グラニセトロン点滴静注用「ツガ」 1mg/50mL:1本 Day1 ドセタキセル点滴静注用:70m g/mi Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1

泌尿器科	GC (シスプラチン分割投与)		16	12	ソルデム3 A 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day9 Day16 ブイーンF輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day9 Day16 マンニトールS注射液 300mL:100m L Day2 Day3 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m ² Day2 Day9 Day16 生食注(大塚) 100mL:1本 Day2 Day9 Day16 ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg/2mL:1A Day2 Day3 シスプラチン注「マルコ」:35mg/m ² Day2 Day3 生食注(大塚) 500mL:200m L Day2 Day3 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day2 Day3 生食注 20mL「CMX」:1A Day2 Day3
泌尿器科	ランマーク	(注意) 外来化学療法センター用	1	27	ランマーク皮下注 120mg:120mg Day1
泌尿器科	ゾラデックスLA 10.8mg	(注意) 外来化学療法センター用	1	83	ゾラデックスLA 10.8mgデボ:10.8mg Day1
泌尿器科	リュープリンSR 11.25	(注意) 外来化学療法センター用	1	83	リュープリンSR注射用キット 11.25mg:11.25mg Day1
泌尿器科	GCb(3week) (GEM+CBDCA)		8	13	生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 Day8 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70μg]:0.75mg Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3.3mg Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m ² Day1 Day8 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 生食注(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day8
泌尿器科	CAZ (カバジタキセル)		1	20	デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 ボラミン注 5mg/1mL:5mg Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1 ジエブタナ点滴静注 60mg/1.5mL:25mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1
泌尿器科	リュープリンPRO注射用キット22.5mg		1	167	リュープリンPRO注射用キット 22.5mg:22.5mg Day1
泌尿器科	オブジーボ (RCC/240mg2週間隔)		1	13	オブジーボ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1
泌尿器科	オブジーボ (RCC/480mg 4週間隔)		1	27	オブジーボ点滴静注:480mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1
泌尿器科	キイトルーダ(尿路上皮がん/200mg 3週間隔)	キイトルーダ400mg 6週間隔に変更可能	1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1
泌尿器科	キイトルーダ(尿路上皮がん/400mg 6週間隔)	キイトルーダ200mg 3週間隔に変更可能	1	41	キイトルーダ点滴静注:400mg Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1
泌尿器科	Eribulin (悪性軟部腫瘍)		8	13	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 ハラヴェン静注 1mg/2mL:1.4mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液 P 50mL:25m L Day1 Day8
泌尿器科	ワジーボ/ヤーボイ(RCC)【2剤併用4回まで】	ワジーボとヤーボイを3週間隔で4回点滴静注、その後ワジーボ単独療法へ	1	20	オブジーボ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1
泌尿器科	CBDCA + VP16(内服)	エトポシド内服75mg/body 1日目~10日目	1	27	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70μg]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3.3mg Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 5%ブドウ糖液(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
泌尿器科	ゴナックス (2回目以降) 【12週間隔】		1	83	ゴナックス皮下注用 240mg:480mg Day1
泌尿器科	ドキシルピシン単回静注	最大投与回数:1回	1	0	ドキシルピシン塩酸塩注射液:40mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
泌尿器科	ドキシルピシン維持静注	週に1回、計8回	1	6	ドキシルピシン塩酸塩注射液:40mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
泌尿器科	ハムアリスマブ (キイトルーダ 200mg3週) + アキチニブ (インライタ)	※インライタ (1日2回毎日服用) と併用	1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1
泌尿器科	ハムアリスマブ (キイトルーダ 400mg6週) + アキチニブ (インライタ)	※インライタ (1日2回毎日服用) と併用	1	41	キイトルーダ点滴静注:400mg Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1
泌尿器科	アベルマブ (ハムアリスマブ) + アキチニブ(インライタ)	※インライタ (1日2回毎日服用) と併用。抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤は別途処方が必要。	1	13	パベンチオ点滴静注 200mg/10mL (冷):10mg/kg Day1 生食注(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1

泌尿器科	TIP		4	17	マンニトールS注射液 300mL:100m L Day1 Day2 Day3 ウロミデキサン注 100mg/1mL:200mg g/m Day1 Day2 Day3 生食注(大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 Day2 Day3 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 ブドウ糖輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 注射用イボマイド 1g:1.2g/m Day1 Day2 Day3 ウロミデキサン注 100mg/1mL:400mg g/m Day1 Day2 Day3 シスプラチン注:25mg g/m Day1 Day2 Day3 生食注(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 パクリタキセル注:175mg g/m Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:16.5mg g Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 ソルデム3A 500mL:1本 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9mg g Day2 Day3
泌尿器科	アベルマブ(尿路上皮癌)	抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤は別途処方が必要。	1	13	バベンチオ点滴静注 200mg/10mL (冷):10mg g/kg Day1 生食注(大塚) バッグ 250mL:1本 Day1
泌尿器科	カキマキス+カキマキス (RCC/240mg2週間隔)	カキマキス 1日1回40mg 空腹時経口投与	1	13	オブジーボ点滴静注:240mg g Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1
泌尿器科	エンホルツマブ ヘドチン(尿路上皮癌)		15	13	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg g Day1 Day8 Day15 パドセブ点滴静注用 30mg (冷):1.25mg g/kg Day1 Day8 Day15 注射用水(大塚) 20mL:20m L Day1 Day8 Day15
泌尿器科	5-FU+CDDP	アプレビタント処方必要。	4	17	ブドウ糖輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 ブドウ糖輸液 500mL:1袋 Day1 フィジオ140輸液500mL:1袋 Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):800mg g/m Day1 Day2 Day3 Day4 生食注(大塚) 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン注:75mg g/m Day1 フロセמיד注 20mg/2mL [ラックス]:1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day2 Day3 Day4
小児科	Rituximab(小児難治性B細胞性白血病)	抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤の処方が必要で (Infusion reaction予防)	1	6	リツキサン点滴静注:375mg g/m Day1 生食注:337.5m L/m Day1
眼科	眼科MMC (2019/10~ 医師限定)	(注意) 角膜に染み込ませ結膜下に2~3分 留めた後、除去、洗浄	1	0	(非売品) マイトマイシン注用 2mg:2mg g Day1
放射線治療科	RT-FN (5FU+CDGP)	放射線治療併用。24HrCl 70%/day ↓の人	4	0	アクチット輸液 500mL:1本 Day1 ブドウ糖輸液 500mL:1袋 Day1 ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg/2mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 フロセמיד注 20mg/2mL:1A Day1 アクブラ静注用:40mg g/m Day1 生食注(大塚) 500mL:500m L Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg g/m Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 1000mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 アクチット輸液 500mL:2本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day2 Day3 Day4 生食注 20mL 「CMX」:1A Day2 Day3 Day4
放射線治療科	weekly CDDP(子宮頸がん-RT)	イメンド、デカドロン8mg(day2-4)内服必要。	2	5	アクチット輸液 500mL:1本 Day1 Day2 フロセמיד注 20mg/2mL:1A Day1 ブドウ糖輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 シスプラチン注:40mg g/m Day1 生食注(大塚) 500mL:1本 Day1 アクチット輸液 500mL:2本 Day1
放射線治療科	RT-N (CDGP)	放射線治療との併用	1	6	アクチット輸液 500mL:1本 Day1 ブドウ糖輸液 500mL:1袋 Day1 ラモセトロン塩酸塩注射液 0.3mg/2mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 フロセמיד注 20mg/2mL:1A Day1 アクブラ静注用:30mg g/m Day1 生食注(大塚) 500mL:1本 Day1
放射線治療科	シスプラチン(頭頸部-RT)	イメンド処方必要。3週に1回予定。	4	16	アクチット輸液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 フロセמיד注 20mg/2mL:1A Day1 ブドウ糖輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 シスプラチン注:80mg g/m Day1 生食注(大塚) 500mL:1本 Day1 アクチット輸液 500mL:2本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day2 Day3 Day4

放射線治療科	FP (400,40)		4	9	<p>アクチット輸液 500mL:2本 Day1 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70μg]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 シスプラチン注:40mg/g/mi Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/g/mi Day1 Day2 Day3 Day4 アクチット輸液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day2 Day3 Day4</p>
腎臓移植外科	ハイリスク初回投与 (リツキサン)	リツキサンを使用	1	0	<p>リツキサン点滴静注:200mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>
リウマチ科	IVCY (リウマチ)		1	0	<p>グラニセトロン点滴静注"ツク" 1mg/50mL:1本 Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):750mg/g/mi Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1</p>
リウマチ科	レミケード (2回目以降)		1	0	<p>レミケード点滴静注用 100mg:200mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>
リウマチ科	レミケード (初回)		1	0	<p>レミケード点滴静注用 100mg:200mg Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1</p>
リウマチ科	アクテムラ		1	0	<p>アクテムラ点滴静注用 200mg/10mL:1mg Day1 アクテムラ点滴静注用 80mg/4mL:1mg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
リウマチ科	Rituximab (10倍希釈) (BS)	Rituximab(BS)	1	0	<p>リツキシマブBS点滴静注:375mg/g/mi Day1 生食注:337.5mL/mi Day1</p>
リウマチ科	リツキサン(SSc)	イブプロフェンとメキタジンによる前処置あり	1	0	<p>リツキサン点滴静注:375mg/g/mi Day1 生食注:337.5mL/mi Day1</p>
リウマチ科	オレンシア		1	0	<p>オレンシア点滴静注用 250mg:3V Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
リウマチ科	インフリキシマブBS (2回目以降)		1	0	<p>インフリキシマブBS点滴静注用 100mg:200mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>
リウマチ科	ベリムマブ点滴静注	1回10mg/kgを初回、2週後、4週後に点滴静注し、以後4週間の間隔で投与。5歳以上。	1	0	<p>ベンリスタ点滴静注用 120mg (冷):10mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 20mL:1A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>