

レジメン一覧

2023/12/19 時点

診療科	レジメン名	コメント	投与 日数	休薬 期間	薬剤情報 薬品名：数量 投与日
共通	キイトルーダ(MSI-High/200mg 3週間隔)	がん化学療法後に増悪した進行・再発の(MSI-High)を有する固形癌	1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1
共通	キイトルーダ(MSI-High/400mg 6週間隔)	がん化学療法後に増悪した進行・再発の(MSI-High)を有する固形癌	1	41	キイトルーダ点滴静注:400mg Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1
呼吸器内科	CBDCA+PTX		1	20	デキサート注射液 3.3mg/1mL:5A Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70特]:1袋 Day1 5%ブドウ糖液(大塚) 500mL:1本 Day1 バクリタキセル注:200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
呼吸器内科	CDDP (ショートパルス療法) +S-1		1	13	生食注(大塚) 500mL:1本 Day8 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day8 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70特]:1本 Day8 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day8 生食注(大塚) 500mL:250m L Day8 シスプラチン注「マルコ」:60mg/m ² Day8 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day8 生食注(大塚) 500mL:2本 Day8

呼吸器内科	CBDCA+S-1	CBDCA : day 1 AUC=5, S-1 : day 1-14	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷｼ]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
呼吸器内科	CDDP (ｼﾞｮｰﾄ) +VNR		8	13	生食注 (大塚) 500mL:250mL Day1 シスプラチン注「マルｺ」:80mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷｼ]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 ロゼウス静注液:25mg/m ² Day1 Day8 ソルテム3 A 200mL:1本 Day1 Day8 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 生食注 (大塚) 500mL:2本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day8 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day8
呼吸器内科	CDDP (ｼﾞｮｰﾄ) +VP16		3	18	生食注 (大塚) 500mL:2本 Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷｼ]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL「サンド」:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 500mL:250mL Day1 シスプラチン注「マルｺ」:80mg/m ² Day1 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day2 Day3 生理食塩液 P 50mL:1本 Day2 Day3
呼吸器内科	CBDCA+VP16		3	18	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷｼ]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day2 Day3 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL「サンド」:80mg/m ² Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day2 Day3 ヴァーノンD輸液 500mL:1袋 Day2 Day3
呼吸器内科	AMR div		3	18	生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 Day2 Day3 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1A Day1 Day2 Day3 カルセド注射液 50mg:40mg/m ² Day1 Day2 Day3

呼吸器内科	ハイカムチン		5	16	生食注（大塚） 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注射用 1.1mg:1mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
呼吸器内科	CDDP（シヨート）+PEM		1	20	生食注（大塚） 500mL:250mL Day1 シスプラチン注「マルコ」:75mg/m ² Day1 プロセド注 20mg/2mL:1A Day1 生食注（大塚） 500mL:2本 Day1 生食注（大塚） 500mL:1本 Day1 硫酸Mg補正液 20mL（1mEq/1mL）:1A Day1 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1 ペムトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 ソルデム3A 200mL:1本 Day1
呼吸器内科	DOC（呼吸器内科）	DOCは60mg/m ²	1	20	生食注（大塚） 100mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 5%ブドウ糖液（大塚）バッグ 250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注用:60mg/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
呼吸器内科	PEM		1	20	生食注（大塚） 100mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペムトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 ソルデム3A 200mL:1本 Day1
呼吸器内科	ピシバニール		1	0	リドカイン塩酸塩注射液1% 100mg/10mL:2A Day1 ピシバニール注射用:0.2KE Day1 生食注 20mL「CMX」:1A Day1

呼吸器内科	ハイポトニックCDDP		1	0	<p>リドカイン塩酸塩注射液1% 100mg/10mL:2A Day1 シスプラチン注「マルコ」:25m g Day1 注射用水（大塚） 500mL:500m L Day1 生食注 20mL「CMX」:20m L Day1</p>
呼吸器内科	ユニタルク		1	0	<p>リドカイン塩酸塩注射液1% 100mg/10mL:2A Day1 ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤 4g:4 g Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1</p>
呼吸器内科	CBDCA+PEM		1	20	<p>パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1 ペメトレキセド点滴静注液:500m g /m² Day1 5%ブドウ糖液（大塚）バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0m g /A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1</p>
呼吸器内科	CBDCA+PEM+BEV		1	20	<p>パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1 ペバシズマブB S点滴静注:15m g /kg Day1 ペメトレキセド点滴静注液:500m g /m² Day1 5%ブドウ糖液（大塚）バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0m g /A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1</p>
呼吸器内科	nab-PAC+CBDCA		15	6	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:100m g /m² Day1 Day8 Day15 生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:0m g /A Day1 5%ブドウ糖液（大塚）バッグ 250mL:1袋 Day1</p>

呼吸器内科	臨床試験 : PEM+Bev (TORG1323)		1	19	生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペムトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 ペバシズマブ B S 点滴静注:15mg/kg Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1
呼吸器内科	オブジーボ (NSCLC)		1	13	オブジーボ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
呼吸器内科	サイラムザ+DTX		1	20	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 サイラムザ点滴静注液:10mg/kg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 ドセタキセル点滴静注用:60mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
呼吸器内科	キイトルーダ(NSCLC/200mg 3週間隔)	キイトルーダ400mg 6週間隔と変更可能	1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1
呼吸器内科	キイトルーダ (NSCLC/400mg 6週間隔)	キイトルーダ200mg 3週間隔と変更可能	1	41	キイトルーダ点滴静注:400mg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1

呼吸器内科	テセントリク(NSCLC)	初回60分、忍容性良好2回目以降30分短縮可	1	20	テセントリク点滴静注 1200mg/20mL (冷):1200mg g Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
呼吸器内科	CBDCA+nab-PTX+Pembro (1~4コース目)	day1~day3は、アプレピタント併用を推奨 ★5コース目以降は、「キイトルーダ(NSCLC)」のレジメンを使用★	15	6	生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:100m g/m Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:0m g/A Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg g Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day8 Day15
呼吸器内科	CBDCA+PEM+Pembro (1~4コース目)	アプレピタント併用を推奨	1	20	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ペトレキセド点滴静注液:500m g/m Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0m g/A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg g Day1
呼吸器内科	PEM+Pembro (5コース目以降)		1	20	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペトレキセド点滴静注液:500m g/m Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg g Day1
呼吸器内科	CBDCA+PTX+BEV+ATZ (1~4コース目)	アプレピタント併用を推奨	1	20	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 バクシケル注:200mg g/m Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0m g/A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ペバシズマブB S点滴静注:15m g/kg Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL (冷):1200mg g Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:5A Day1 フモチン静注液 20mg/20mL:1A Day1

呼吸器内科	BEV+ATZ (5コース目以降/NSCLC)		1	20	<p>生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ペバシズマブB S点滴静注:15m g/kg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL (冷):1200m g Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>
呼吸器内科	CBDCA+VP-16+Atezo	導入21日×4コース 5コース目以降は「テセントリク(NSCLC)」	3	18	<p>生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL (冷):1200m g Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注液:0m g/A Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1 エトボシド点滴静注液 100mg/5mL:100m g/m² Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day2 Day3</p>
呼吸器内科	CBDCA+nab-PTX+Atezo (1~4コース目)	day1~day3は、アプレピタント併用を推奨 ★維持療法は、「テセントリク (NSCLC)」のレジメンを使用★	15	6	<p>生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:100m g/m² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:0m g/A Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL (冷):1200m g Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day8 Day15</p>
呼吸器内科	CBDCA+PEM+Atezo (1~4コース目)	アプレピタント併用を推奨 ★維持療法は PEM+Atezo (5コース目以降) レジメンを使用★	1	20	<p>パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ペムトレキセド点滴静注液:500m g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0m g/A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL (冷):1200m g Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>
呼吸器内科	PEM+Atezo (5コース目以降)		1	20	<p>生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペムトレキセド点滴静注液:500m g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL (冷):1200m g Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>

呼吸器内科	CDDP+VP16+durvalmab（導入療法）	ア°ルビ°タト併用、VP16：80-100mg/m ² で調整可 4サイクル以後は維持療法に移行	3	18	<p>イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1 生食注（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1 生食注（大塚） 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [ア°ルビ°]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL 「サンド」:100mg/g/m² Day1 Day2 Day3 生食注（大塚） 500mL:250mL Day1 シスプラチン注「マルコ」:80mg/g/m² Day1 フロゼド注 20mg/2mL:1A Day1 生食注（大塚） 500mL:2本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 生食注（大塚） 100mL:1本 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day2 Day3</p>
呼吸器内科	CBDCA+VP16+durvalmab（導入療法）	VP16：80-100mg/m ² で調整可 4サイクル以後は維持療法に移行	3	18	<p>生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1 生食注（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1 パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [ア°ルビ°]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 5%ブドウ糖液（大塚） 500mL:1本 Day1 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:100mg/g/m² Day1 Day2 Day3 生食注（大塚） 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 生食注（大塚） 100mL:1本 Day2 Day3</p>
呼吸器内科	CBDCA+PTX+Pembro（1～4コース目）	※初回はPTXアナフィラキシー厳重注意。AE高度の場合は早めに維持治療移行も検討可	1	20	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:5A Day1 ファミチン静注液 20mg/20mL:1A Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [ア°ルビ°]:1袋 Day1 バクシケル注:200mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液（大塚） 500mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 5%ブドウ糖液（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 キイトルーダ点滴静注:200mg/g Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1</p>
呼吸器内科	サイラムザ+EGFR-TKI（第1世代）併用	EGFR変異陽性患者	1	13	<p>ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 サイラムザ点滴静注液:10mg/g/kg Day1 生食注（大塚） バッグ 250mL:1本 Day1</p>
呼吸器内科	Ipi+Nivo併用 9LA(CBDCA+PTX)	CBDCA+PTX 2サイクルのみ化学療法併用（非腺癌）。以後はIpi+Nivo維持療法へ移行する。	22	20	<p>ヤーボイ点滴静注液:1mg/g/kg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day22 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 Day22 パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [ア°ルビ°]:1袋 Day1 Day22 5%ブドウ糖液（大塚） 500mL:1本 Day1 Day22 バクシケル注:200mg/g/m² Day1 Day22 5%ブドウ糖液（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1 Day22 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 Day22 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day22 オプジーボ点滴静注:360mg/g Day1 Day22 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:5A Day1 Day22 ファミチン静注液 20mg/20mL:1A Day1 Day22</p>

呼吸器内科	Ipi+Nivo併用 9LA (CBDCA+PEM)	CBDCA+PEM 2サイクルのみ併用(非扁平上皮癌)。以後はIpi+Nivo維持療法へ移行。	22	20	カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 Day22 5%ブドウ糖液(大塚)バッグ 250mL:1本 Day1 Day22 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70時]:1袋 Day1 Day22 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day22 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day22 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1 Day22 オブジーボ点滴静注:360mg Day1 Day22 ペムトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 Day22
呼吸器内科	Ipi+Nivo併用 9LA (CDDP+PEM)	CDDP+PEM 2サイクルのみ併用(非扁平上皮癌)。以後はIpi+Nivo維持療法へ移行する。	22	20	生食注(大塚) 100mL:1本 Day1 Day22 生食注(大塚) 500mL:1袋 Day1 Day22 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 Day22 ペムトレキセド点滴静注液:500mg/m ² Day1 Day22 ソルデム3A 200mL:1本 Day1 Day22 シスプラチン注:75mg/m ² Day1 Day22 生食注(大塚) 500mL:250mL Day1 Day22 フロセド注 20mg/2mL:1A Day1 Day22 生食注(大塚) 500mL:2本 Day1 Day22 オブジーボ点滴静注:360mg Day1 Day22 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day22 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70時]:1袋 Day1 Day22 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 Day22 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1
呼吸器内科	Ipi+Nivo併用 checkmate227 (9LA 維持療法)	Ipi+Nivo併用 9LAケモ2サイクル後の維持療法。PDまで	22	20	オブジーボ点滴静注:360mg Day1 Day22 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day22 生食注(大塚) 100mL:1瓶 Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1
呼吸器内科	CBDCA+AMR	アプロチン推奨 胸腺腫瘍(胸腺癌、胸腺腫) 前治療がある場合はAMR30mg/m ² 減量を検討すること	3	18	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day2 Day3 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70時]:1袋 Day1 カルセド注射用 50mg:35mg/m ² Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 生食注(大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day2 Day3
呼吸器内科	necitumumab+CDDP+GEM	アプロチン併用。1-4サイクルは併用、その後はnecitumumabのみの維持療法	8	13	生食注(大塚) 500mL:1本 Day1 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 ボートラザ点滴静注液 800mg/50mL(冷):800mg Day1 Day8 生食注(大塚) バッグ 250mL:200mL Day1 Day8 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70時]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 ゲムシタピン点滴静注用:1250mg/m ² Day1 Day8 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 シスプラチン注:75mg/m ² Day1 生食注(大塚) 500mL:250mL Day1 フロセド注 20mg/2mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day8

呼吸器内科	necitumumab維持療法	1-4サイクルはカモ併用、その後はnecitumumabのみの維持療法	8	13	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 ポートラーザ点滴静注液 800mg/50mL (冷):800mg Day1 Day8 生食注 (大塚) バッグ 250mL:200mL Day1 Day8
呼吸器内科	CBDCA+nab-PTX+DUR+トレメリムマブ (導入療法1~4コース目)	day1-3はアプレピタント併用を推奨 維持療法は「DUR+トレメリムマブ (維持療法の導入用) 」を使用	15	6	イジド点滴静注 : 75mg イミフィンジ点滴静注 : 1500mg Day1 アブラキサン点滴静注液 100mg/m ² Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液 AUC=6 Day1
呼吸器内科	CDDP+PEM+DUR+トレメリムマブ (導入療法1~4コース目)	day1-3はアプレピタント併用を推奨 維持療法は「DUR+トレメリムマブ (維持療法の導入用) 」を使用	1	20	イジド点滴静注 : 75mg Day1 イミフィンジ点滴静注1500mg Day1 ペメトレキセド点滴静注液 500mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注液 75mg/m ² Day1
呼吸器内科	DUR+トレメリムマブ (維持療法の導入用)		29	27	イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1 Day29 イジド点滴静注 : 75mg Day29
呼吸器内科	DUR (肺癌 維持療法)	根治的CRT後の維持療法に用いる際は投与期間は12か月までとする	1	27	イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1

呼吸器内科	CBDCA+PEM+DUR+トレメリムブ（導入療法1～4コース目）	day1-3はアプレピタント併用を推奨 維持療法は「DUR+トレメリムブ（維持療法の導入用）」を使用	1	20	イジド点滴静注：75mg Day1 イミフィンジ点滴静注：1500mg Day1 ペメトレキセド点滴静注液：500mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液：AUC=6 Day1
呼吸器内科	weekly nab-PAC（毎週投与）		15	6	アブラキサン点滴静注用：100mg/m ² Day1 Day8 Day15
消化器内科	（術後補助）S-1+DOC	2-7J-λDOC併用,S-1/1-7J-λ2投1休/8J-λ以降4投2休（手術1年後まで）	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 5%ブドウ糖液（大塚）バッグ 250mL:1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注用:40mg/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1
消化器内科	weekly PTX		15	13	デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注:80mg/m ² Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液（大塚）バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15
消化器内科	biweekly PTX		15	13	デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day15 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 Day15 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day15 パクリタキセル注:80mg/m ² Day1 Day15 5%ブドウ糖液（大塚）バッグ 250mL:1袋 Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day15

消化器内科	triweekly DOC (胃癌)	胃癌レジメン (DOCは60mg/m ²)	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドセタキセル点滴静注用:60mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	CPT-11 (weekly)	★CPT-11 3投1休 (28日1コース)	15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day8 Day15
消化器内科	Gem (膵癌)		15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15
消化器内科	Gem (膵癌・隔週)		15	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day15 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m ² Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day15
消化器内科	Gem/S-1	S-1 14日間内服あり (day1~14) 臨床試験	8	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8

消化器内科	mFOLFOX6		1	13	<p>グラニセトロン点滴静注パ[®] ヲガ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/g/m² Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
消化器内科	sLV5FU2		1	13	<p>グラニセトロン点滴静注パ[®] ヲガ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
消化器内科	mFOLFOX6/Bev		1	13	<p>グラニセトロン点滴静注パ[®] ヲガ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペバシズマブB S点滴静注:5mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/g/m² Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
消化器内科	sLV5FU2/Bev		1	13	<p>グラニセトロン点滴静注パ[®] ヲガ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペバシズマブB S点滴静注:5mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
消化器内科	FOLFIRI		1	13	<p>グラニセトロン点滴静注パ[®] ヲガ[®] 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 イリリデカン塩酸塩点滴静注液:150mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/g/m² Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>

消化器内科	FOLFIRI/Bev		1	13	<p>グラニセロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペバシズマブ B S 点滴静注:5m g/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m Day1 5%ブドウ糖液 (大塚)ﾊﾞｯｸﾞ 250mL:1袋 Day1 レボリナート点滴静注用:200m g/m Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):400m g/m Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400m g/m Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
消化器内科	IRIS/Bev	S-1 14日間内服 (day1~14)	15	13	<p>グラニセロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg/50mL:1本 Day1 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day15 ペバシズマブ B S 点滴静注:5m g/kg Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100m g/m Day1 Day15 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day15</p>
消化器内科	末梢SOX (大腸癌)	S-1 14日間内服 (day1夕~15朝)	1	20	<p>グラニセロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1</p>
消化器内科	triweekly DOC (食道癌)	食道癌レジメン (DOCは70mg/m ²)	1	20	<p>グラニセロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドセタキセル点滴静注用:70m g/m Day1 5%ブドウ糖液 (大塚)ﾊﾞｯｸﾞ 250mL:1袋 Day1</p>
消化器内科	CDDP+GEM		8	13	<p>パロセロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 0.75mg/50mL [ｱ0ｷ]:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 Day8 ソルデム1輸液 500mL:1本 Day1 Day8 シスプラチン注「マルコ」:25m g/m Day1 Day8 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m Day1 Day8 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 ソルデム 3 A 500mL:1本 Day1 Day8</p>

消化器内科	XELOX (大腸癌)	カペシタビン 14日間内服 (day1夕~15朝)	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	末梢XELOX (大腸癌)	カペシタビン 14日間内服 (day1夕~15朝)	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1
消化器内科	XELOX/Bev (大腸癌)	カペシタビン 14日間内服 (day1夕~15朝)	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペバシズマブB S点滴静注:7.5mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	末梢XELOX/Bev (大腸癌)	カペシタビン 14日間内服 (day1夕~15朝)	1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ペバシズマブB S点滴静注:7.5mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1
消化器内科	カペシタビン/Bev (大腸癌)	カペシタビン 14日間内服 (day1夕~15朝)	1	20	ペバシズマブB S点滴静注:7.5mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1

消化器内科	FOLFIRI/Pani		1	13	<p>グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL:6m g/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m² Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):400m g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400m g/m² Day1</p>
消化器内科	FOLFOX/Pani		1	13	<p>グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL:6m g/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85m g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m² Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):400m g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400m g/m² Day1</p>
消化器内科	Pani単独		1	13	<p>ベクティビックス点滴静注 100mg/5mL:6m g/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
消化器内科	レミケード		1	0	<p>ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 レミケード点滴静注用 100mg:300m g Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1</p>
消化器内科	ゾメタ (骨病変)	(注意) 外来化学療法センター用	1	20	<p>生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL:4m g Day1</p>

消化器内科	modified FOLFIRINOX		1	13	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85m g/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200m g/m ² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m ² Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400m g/m ² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
消化器内科	末梢G-SOX (胃癌)	S-1 14日間内服 (day1夕~15朝) ★アプレピタント処方してください	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1
消化器内科	G-SOX+HER (初回 ; 胃癌)	S-1 14日間内服 (day1夕~15朝) ★アプレピタント処方してください	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 トラスツマ`マ`BS点滴静注用 150mg (冷) [ﾊｰｼﾞ`ﾌﾝ] :8m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	G-SOX+HER (2回目以降 ; 胃癌)	S-1 14日間内服 (day1夕~15朝) ★アプレピタント処方してください	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 トラスツマ`マ`BS点滴静注用 150mg (冷) [ﾊｰｼﾞ`ﾌﾝ] :6m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	末梢G-SOX+HER(2回目以降 ; 胃癌)	S-1 14日間内服 (day1夕~15朝) ★アプレピタント処方してください	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130m g/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:500m L Day1 トラスツマ`マ`BS点滴静注用 150mg (冷) [ﾊｰｼﾞ`ﾌﾝ] :6m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1

消化器内科	末梢XELOX(胃癌)	カペシタビン 14日間内服 (day1夕~15朝) ★アプレピタント処方してください	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [アピシ]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1
消化器内科	XELOX+HER (初回 ; 胃癌)	カペシタビン14日間内服 (day1夕~15朝) ★アプレピタント処方してください	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [アピシ]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用 150mg (冷) [ハセツマ]:8mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	XELOX+HER (2回目以降 ; 胃癌)	カペシタビン14日間内服 (day1夕~15朝) ★アプレピタント処方してください	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [アピシ]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用 150mg (冷) [ハセツマ]:6mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	末梢XELOX+HER(初回 ; 胃癌)	カペシタビン14日間内服 (day1夕~15朝) ★アプレピタント処方してください	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [アピシ]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:500mL Day1 トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用 150mg (冷) [ハセツマ]:8mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1
消化器内科	末梢XELOX+HER(2回目以降 ; 胃癌)	カペシタビン14日間内服 (day1夕~15朝) ★アプレピタント処方してください	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [アピシ]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:500mL Day1 トラスツマ [®] マフ [®] BS点滴静注用 150mg (冷) [ハセツマ]:6mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1

消化器内科	GEM+アブラキサン		15	13	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:125m g/m² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m² Day1 Day8 Day15</p>
消化器内科	RAM/weeklyPTX		15	13	<p>ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 サイラムザ点滴静注液:8m g/kg Day1 Day15 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注:80m g/m² Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day8</p>
消化器内科	RAM+FOLFIRI		1	13	<p>パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 サイラムザ点滴静注液:8m g/kg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 イリテカン塩酸塩点滴静注液:150m g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボリナート点滴静注用:200m g/m² Day1 フルオロウラル注 1000mg/20mL (冷):400m g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオロウラル注 1000mg/20mL (冷):2400m g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
消化器内科	GEM+アブラキサン (隔週)		15	13	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day15 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:125m g/m² Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day15 ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/m² Day1 Day15</p>
消化器内科	TAS102/Bev	TAS102 (ロサ-フ) の内服と併用 TAS102は35mg/m ² /回 5日内服2日休 薬を2回繰り返すその後14日間休薬	15	13	<p>ペバシズマブ B S 点滴静注:5m g/kg Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day15</p>

消化器内科	ザノサー(weekly)		1	6	<p>生食注 1000mL:1000m L Day1 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9mg Day1 ザノサー点滴静注用 1g (冷):1000mg/ml Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1</p>
消化器内科	オブジーボ (胃がん/240mg2週間隔)		1	13	<p>オブジーボ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
消化器内科	オブジーボ (胃がん/480mg4週間隔)		1	27	<p>オブジーボ点滴静注:480mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
消化器内科	Avelumab(メルケル細胞癌)	抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤は別途処方が必要。	1	13	<p>バベンチオ点滴静注 200mg/10mL (冷):10mg/kg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1</p>
消化器内科	【2剤併用】オプジーボ/ヤーホイ(悪性黒色腫)	オプジーボとヤーホイを3週間間隔で4回点滴静注、その後オプジーボを2週間間隔で点滴静注(オプジーボ単独繰り返し)	1	20	<p>オブジーボ点滴静注:80mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 ヤーホイ点滴静注液:3mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:90m L Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1</p>

消化器内科	【オプジーボ単独】オプジーボ/ヤホイ(悪性黒色腫)	オプジーボとヤホイを3週間間隔で4回点滴静注、その後オプジーボを2週間間隔で点滴静注(オプジーボ単独繰り返し)	1	13	オプジーボ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1
消化器内科	(FOLFOX等併用限定)(胃癌)(初回)HER	FOLFOX等との併用に限り「併用可」にて適応とする/初回8mg/kg	1	20	トラスチマブBS点滴静注用 150mg(冷) [ルセチン] :8mg/kg Day1 注射用水(大塚) 100mL:1本 Day1 生食注(大塚) バッグ 250mL:1本 Day1
消化器内科	(FOLFOX等併用限定)(胃癌)(2回目以降)HER	FOLFOX等との併用に限り「併用可」にて適応とする/2回目以降6mg/kg	1	20	トラスチマブBS点滴静注用 150mg(冷) [ルセチン] :6mg/kg Day1 注射用水(大塚) 100mL:1本 Day1 生食注(大塚) バッグ 250mL:1本 Day1
消化器内科	RAM/nab-PTX		15	13	グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day15 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 生食注(大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15
消化器内科	ヨンデリス(Trabectedin)	★Day3にDex8mg(p.o)処方/アプレピタン使用不可(原則)	2	19	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [アピラ] :0.75mg Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:16.5mg Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1 ヨンデリス点滴静注用:1.2mg/m ² Day1 生食注(大塚) 500mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day2 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day2

消化器内科	キイトルーダ(悪性黒色腫/Adj/200mg3週間隔)	悪性黒色腫・術後補助療法★投与期間は12ヶ月間まで	1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1
消化器内科	キイトルーダ(悪性黒色腫/Adj/400mg6週間隔)	悪性黒色腫・術後補助療法★投与期間は12ヶ月間まで	1	41	キイトルーダ点滴静注:400mg Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1
消化器内科	サイラムザ(肝細胞癌)		1	13	ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 生食注(大塚) バッグ 250mL:1本 Day1
消化器内科	AFL/FOLFIRI		1	13	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70時]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 ザルトラップ点滴静注:4mg/kg Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 イリテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL(冷):400mg/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL(冷):2400mg/m ² Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1
消化器内科	mFOLFOX6(食道がん)	※シスプラチン不耐の緩和的治療もしくは再発例に限る	1	13	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70時]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m ² Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL(冷):400mg/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオウラシル注 1000mg/20mL(冷):2400mg/m ² Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1

消化器内科	オブジーボ（食道がん/240mg2週間隔）		1	13	オブジーボ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1
消化器内科	オブジーボ（食道がん/480mg4週間隔）		1	27	オブジーボ点滴静注:480mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1
消化器内科	nal-IRI+5-FU/LV		1	13	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 オニバイド点滴静注 43mg/10mL (冷):70mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液（大塚） 500mL:1本 Day1 レボホリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/m ² Day1 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
消化器内科	BEV+ATZ（肝細胞がん）	Child-Pugh分類A、全身化学療法歴なし の肝細胞がんを対象	1	20	生食注（大塚） 100mL:1本 Day1 アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 テセントリク点滴静注 1200mg/20mL (冷):1200mg Day1 生食注（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	エンハーツ（胃がん）		1	20	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1 エンハーツ点滴静注用 100mg (冷):6.4mg/kg Day1 注射用水（大塚） 100mL:1本 Day1

消化器内科	キイトルーダ(悪性黒色腫/200mg3週間隔)		1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1
消化器内科	キイトルーダ(悪性黒色腫/400mg6週間隔)		1	41	キイトルーダ点滴静注:400mg Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1
消化器内科	オプジーボ(悪性黒色腫/240mg2週間隔)		1	13	オプジーボ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1
消化器内科	オプジーボ(悪性黒色腫/480mg4週間隔)		1	27	オプジーボ点滴静注:480mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1
消化器内科	(初回; 2剤併用)Encorafenib+Cetuximab	Encorafenib(1回300mg1日1回); 既 治療BRAF変異mCRC	1	6	生食注(大塚) 100mL:1本 Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 アーピタックス注射液 100mg/20mL:400mg/m ² Day1 生食注(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1

消化器内科	(2回～ ; 2剤併用)Encorafenib+Cetuximab	Encorafenib(1回300mg1日1回) ; 既治療BRAF変異mCRC	1	6	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m ² Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	(初回 ; 3剤併用)Binimetinib+Encorafenib+Cetuximab	Binimetinib(1回45mg1日2回) Encorafenib(1回300mg1日1回) ; 既治療BRAF変異mCRC	1	6	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:400mg/m ² Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	(2回～ ; 3剤併用)Binimetinib+Encorafenib+Cetuximab	Binimetinib(1回45mg1日2回) Encorafenib(1回300mg1日1回) ; 既治療BRAF変異mCRC	1	6	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:250mg/m ² Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	Cet (500mg/m ² biweekly) +CPT-11		1	13	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70μg]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:500mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:150mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1
消化器内科	(臨床試験)DOC/RAM HGCSG1903	RAM,DOC (Lv0 8mg/kg,60mg/m ² Lv-1 6mg/kg,50mg/m ² Lv-2 5mg/kg,40mg/m ²)	15	13	グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day15 ドセタキセル点滴静注用:60mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1

消化器内科	Nivo+XELOX(胃癌)	カペシタビン 14日間内服 (day1夕~15朝) ★アプレピタント処方してください ※HER2陰性 確認必要	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 オブジーボ点滴静注:360mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1
消化器内科	Nivo+SOX (胃癌)	S-1 14日間内服 (day1夕-15朝) ★アプレピタント処方してください ※HER2陰性 確認必要	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 オブジーボ点滴静注:360mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1
消化器内科	未梢Nivo+SOX (胃癌)	S-1 14日間内服 (day1夕~15朝) ★アプレピタント処方してください ※HER2陰性 確認必要	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 オキサリプラチン点滴静注液:130mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day1 オブジーボ点滴静注:360mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1
消化器内科	Nivo+mFOLFOX6 (胃癌)	★アプレピタント処方してください ※HER2陰性 確認必要	1	13	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 レボリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液:85mg/m ² Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 オブジーボ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1
消化器内科	(臨床試験)AFL/FOLFIRI HGCSG1801		1	13	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 ザルトラップ点滴静注:4mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 イリリテカン塩酸塩点滴静注液:180mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 レボリナート点滴静注用:200mg/m ² Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):2400mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1

消化器内科	(3剤)Cet(500mg/m ² 隔週)+Binimetinib+Encorafenib	Binimetinib(1回45mg1日2回) Encorafenib(1回300mg1日1回) ; 既 治療BRAF変異mCRC	1	13	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:500mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1
消化器内科	(2剤)Cet(500mg/m ² 隔週)+Encorafenib	Encorafenib(1回300mg1日1回) ; 既 治療BRAF変異mCRC	1	13	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ボラミン注 5mg/1mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL:500mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1
消化器内科	Pembro+FP (食道癌)	※6サイクルまで。7サイクル目以降は Pembro+5FU (食道癌維持療法) へ。ア プレピタント処方必要。	5	16	アクチット輸液 500mL:2本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 アクチット輸液 500mL:1本 Day1 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70μg]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9mg Day1 シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL (冷):200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day2 Day3 Day4 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day5
消化器内科	Nivo+FP (食道癌Nivo4週)	アプレピタント処方必要。	5	23	アクチット輸液 500mL:2本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 アクチット輸液 500mL:1本 Day1 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1 パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70μg]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9mg Day1 シスプラチン注:80mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):800mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オブジーボ点滴静注:480mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day2 Day3 Day4 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day5
消化器内科	Ipi+Nivo (食道癌Nivo3週)		22	20	オブジーボ点滴静注:360mg Day1 Day22 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day22 生食注 (大塚) 100mL:1瓶 Day1 ヤーボイ点滴静注液:1mg/kg Day1

消化器内科	T-Mab+Pertuzumab (大腸癌初回)	Pertuzumab投与が6週間以上遅れた場合本レジメンを用いること	1	20	<p>パージェタ点滴静注 420mg/14mL:840mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射用 150mg <冷>:8mg/kg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1</p>
消化器内科	T-Mab+Pertuzumab (大腸癌2回目以降)		1	20	<p>パージェタ点滴静注 420mg/14mL:420mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射用 150mg <冷>:6mg/kg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1</p>
消化器内科	T-Mab+Pertuzumab (大腸癌2回目以降T-Mab遅延用)	T-Mab投与が1週間以上遅れた場合本レジメンを用いること	1	20	<p>パージェタ点滴静注 420mg/14mL:420mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 ハーセプチン注射用 150mg <冷>:8mg/kg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1</p>
消化器内科	オブジーボ (原発不明がん/240mg2週間隔)		1	13	<p>オブジーボ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
消化器内科	オブジーボ (原発不明がん/480mg4週間隔)		1	27	<p>オブジーボ点滴静注:480mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>

消化器内科	DUR (HCC)		1	27	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	DUR+GC	8サイクル投与後維持療法へ	8	13	生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 ソルデム1輸液 500mL:1本 Day1 Day8 シスプラチン注「マルコ」:25mg/m ² Day1 Day8 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 ソルデム3 A 500mL:1本 Day1 Day8 パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70μg]:1本 Day1 Day8 デキサト注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	DUR+GC (維持)	DUR+GC8サイクル後	1	27	生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
消化器内科	DUR+Tremelimumab(HCC)	初回のみ。以降DUR(HCC)を使用	1	27	イジド点滴静注 : 300mg Day1 イミフィンジ点滴静注:1500mg Day1
腎臓内科	Rituximab (難治性初回セ)		22	6	リツキサン点滴静注:375mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 生食注:337.5mL/m ² Day1 Day8 Day15 Day22

腎臓内科	Rituximab (10倍希釈) (BS)		1	0	リツキシマブBS点滴静注:375mg/m ² Day1 生食注:337.5mL/m ² Day1
腎臓内科	IVCY (腎内)		1	0	グラニセトロン点滴静注パツガ 1mg/50mL:1本 Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):750mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 ソルデム3 A 500mL:2本 Day1 フロセミド注 20mg/2mL:1 A Day1
糖尿病内分泌内科	EDP-M	オペプリム併用すること	4	24	生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 ドキシジピン塩酸塩注射液:40mg/m ² Day1 グラニセトロン点滴静注パツガ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day2 Day3 Day4 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL [サンド]:100mg/m ² Day2 Day3 Day4 シスプラチン注「マルコ」:40mg/m ² Day3 Day4 フロセミド注 20mg/2mL:1 A Day3 Day4 マンニトールS注射液 300mL:1袋 Day3 Day4 ソルデム3 A 500mL:1本 Day3 Day4
糖尿病内分泌内科	CVD (悪性褐色細胞腫)	アプレピタントカプセル、デカドロン 8mg(p.o.) Day3,4の処方をしてください	2	19	グラニセトロン点滴静注パツガ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day2 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9mg Day1 Day2 ダカルバジン注用 100mg (冷):600mg/m ² Day1 Day2 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 注射用エンドキサン 500mg (冷):750mg/m ² Day1 オンコピン注射用 1mg (冷):1.4mg/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2
血液内科	HD-LPAM+PBSCT		2	2	生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注パツガ 1mg/50mL:1 A Day1 Day2 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [フレパソ] :1 A Day1 Day2 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 Day2 アルケラン静注用 50mg:100mg Day1 Day2 アルケラン静注用 50mg:100mg/m ² Day1 Day2

血液内科	ABVD		15	13	<p>ビカーボン注 500mL:500m L Day1 Day15 ドキソルピシン塩酸塩注射液:25mg/m² Day1 Day15 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1 Day15 プレオ注射用 15mg:10mg/m² Day1 Day15 エクザール注射用 10mg:6mg/m² Day1 Day15 タカルバジン注用 100mg:375mg/m² Day1 Day15 グラネセロン点滴静注パッパ 1mg/50mL:1本 Day1 Day15</p>
血液内科	Rituximab (初回投与)	リツキサン投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬の前投薬を行うこと	1	0	<p>リツキシマブBS点滴静注:375mg/m² Day1 生食注:337.5m L/m² Day1</p>
血液内科	Rituximab (2回目以降)	リツキサン投与前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬の前投薬を行うこと	1	0	<p>リツキシマブBS点滴静注:375mg/m² Day1 生食注:337.5m L/m² Day1</p>
血液内科	IT-Triple		1	0	<p>メソトレキセート注射液:15mg Day1 水溶性プレドニン 20mg:20mg Day1 キロサイド注:40mg Day1 生食注 20mL「CMX」:3m L Day1</p>
血液内科	CHOP		5	9	<p>フロセミド注 20mg/2mL:20mg Day1 グラネセロン点滴静注パッパ 1mg/50mL:1本 Day1 ドキソルピシン塩酸塩注射液:50mg/m² Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンコビン注射用 1mg:1.4mg/m² Day1 注射用エンドキサン 500mg(冷):750mg/m² Day1 生食注(大塚) 500mL:500m L Day1 水溶性プレドニン 20mg:0.001mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ビカーボン注 500mL:500m L Day1</p>

血液内科	THP-COP		5	9	<p>フロセミド注 20mg/2mL:20m g Day1 グラニセトロン点滴静注ハッガ 1mg/50mL:1本 Day1 注射用テラルピシン:50m g/m² Day1 5%ブドウ糖液 100mL:100m L Day1 オンコピン注射用 1mg:1.4m g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用エンドキサ 500mg (冷):750m g/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 水溶性プレドニ 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ピカーボン注 500mL:500m L Day1</p>
血液内科	LSG-15		17	11	<p>オンコピン注射用 1mg:1m g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day8 Day15 Day16 Day17 注射用エンドキサ 500mg (冷):350m g/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 Day15 Day16 Day17 ドキシルピシン塩酸塩注射液:40m g/m² Day1 水溶性プレドニ 20mg:0.001m g Day1 Day8 Day15 Day16 Day17 グラニセトロン点滴静注ハッガ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day16 Day17 ドキシルピシン塩酸塩注射液:30m g/m² Day8 注射用サイタリン 50mg:60m g/m² Day8 カルボプラチン点滴静注液:250m g/m² Day15 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL 「サンド」:100m g/m² Day15 Day16 Day17 注射用フィルデシン:2.4m g/m² Day15</p>
血液内科	DHAP		4	17	<p>生食注 1000mL:1000m L Day1 Day2 マンニトールS注射液 300mL:300m L Day1 Day2 ピカーボン注 500mL:2000m L Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセトロン点滴静注ハッガ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液 3.3mg/1mL:33m g Day1 Day2 Day3 Day4 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL 「レルパソ」 :1 A Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン注「マルコ」:100m g/m² Day1 マンニトールS注射液 300mL:600m L Day1 シタラピン点滴静注液 1g/50mL:2000m g/m² Day2 Day3 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:500m L Day2 Day3</p>
血液内科	CHOP (VDS使用)		5	9	<p>フロセミド注 20mg/2mL:20m g Day1 グラニセトロン点滴静注ハッガ 1mg/50mL:1本 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射液:50m g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用フィルデシン:2m g/m² Day1 注射用エンドキサ 500mg (冷):750m g/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 水溶性プレドニ 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ピカーボン注 500mL:500m L Day1</p>
血液内科	THP-COP (VDS使用)		5	9	<p>フロセミド注 20mg/2mL:20m g Day1 グラニセトロン点滴静注ハッガ 1mg/50mL:1本 Day1 注射用テラルピシン:50m g/m² Day1 5%ブドウ糖液 100mL:100m L Day1 注射用フィルデシン:2m g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用エンドキサ 500mg (冷):750m g/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 水溶性プレドニ 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ピカーボン注 500mL:500m L Day1</p>

血液内科	ボルテゾミブ（皮下注）		11	10	生食注 20mL「CMX」:1.2mL Day1 Day4 Day8 Day11 ボルテゾミブ注射用 3mg:1.3m g/m ² Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	CAG療法		15	0	生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセトロン点滴静注ハック 1mg/50mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [フレール] :1A Day1 Day2 Day3 Day4 アクラシン注射用 20mg:14m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ノイトロジン注 100μg:100μ g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 キロサイド注:10m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15
血液内科	JALSGAML201 寛解導入（A）		7	0	生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 グラニセトロン点滴静注ハック 1mg/50mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [フレール] :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 イダマイシン注 5mg:12m g/m ² Day1 Day2 Day3 注射用水（大塚） 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 生食注（大塚） 500mL:500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 キロサイド注:100m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	JALSGAML201 寛解導入（B）		7	0	生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 グラニセトロン点滴静注ハック 1mg/50mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [フレール] :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 ダウノマイシン静注用 20mg:50m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注（大塚） 500mL:500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 キロサイド注:100m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
血液内科	JALSGAML201 地固めC（HDAC）		5	0	生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注ハック 1mg/50mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [フレール] :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注（大塚） 500mL:500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シタラピン点滴静注液 1g/50mL:2000m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

血液内科	JALSGAML201 地固めD群 I		5	0	<p>生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注パッガ 1mg/50mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [フレパソ] :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ノバントロン注 20mg/10mL:7mg/m Day1 Day2 Day3 生食注（大塚） 500mL:500m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注:200mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
血液内科	VAD		20	8	<p>グラニセトロン点滴静注パッガ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [フレパソ] :1A Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液 3.3mg/1mL:33mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day9 Day10 Day11 Day12 Day17 Day18 Day19 Day20 生理食塩液 P 50mL:48m L Day1 Day2 Day3 Day4 ドキソルビシン塩酸塩注射液:9mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 オンコピン注射用 1mg:0.4mg Day1 Day2 Day3 Day4 生食注（大塚） 100mL:100m L Day9 Day10 Day11 Day12 Day17 Day18 Day19 Day20</p>
血液内科	MTX大量療法	(注意) 2-4日目MTX濃度測定。 MTX0.1μMで10日ホリ終	5	9	<p>メイロン84(8.4%) 250mL:250m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注（大塚） 500mL:2000m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メソトレキセート注射液:4000mg/m Day2 生食注（大塚） 500mL:500m L Day2 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [フレパソ] :1A Day2 グラニセトロン点滴静注パッガ 1mg/50mL:1本 Day2 ロイコボリン注 3mg/1mL:24mg Day3 Day4 Day5</p>
血液内科	DeVIC		3	18	<p>生食注（大塚） 500mL:2000m L Day1 Day2 Day3 メイロン84(8.4%) 250mL:250m L Day1 Day2 Day3 ダイアモックス注射用 500mg:500mg Day1 Day2 Day3 生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/1mL:33mg Day1 Day2 Day3 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [フレパソ] :1A Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注パッガ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 カルボプラチン点滴静注液:300mg/m Day1 5%ブドウ糖液（大塚） パック 250mL:1袋 Day1 エトボシド点滴静注液 100mg/5mL [サンド]:100mg/m Day1 Day2 Day3 生食注（大塚） 500mL:500m L Day1 Day2 Day3 注射用イホマイド 1g:1.5g/m Day1 Day2 Day3 クロミテキサン注 100mg/1mL:300mg/m Day1 Day2 Day3</p>
血液内科	CHASE		3	18	<p>グラニセトロン点滴静注パッガ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/1mL:33mg Day1 Day2 Day3 注射用エンドキサン 500mg (冷):1200mg/m Day1 生食注（大塚） 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 100mg/5mL [サンド]:100mg/m Day1 Day2 Day3 ビカーボン注 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 シタラピン点滴静注液 1g/50mL:2000mg/m Day2 Day3</p>

血液内科	EPOCH		5	16	<p>塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [チムラ] :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注ハカ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトボシド点滴静注液 100mg/5mL [サンド]:50mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンコピン注射用 1mg:0.4m²/m² Day1 Day2 Day3 Day4 ドキソルビシン塩酸塩注射液:10mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルテム1輸液 500mL:2本 Day1 Day2 Day3 Day4 水溶性プレドニ 20mg:0.001m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルテム1輸液 500mL:3本 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):750m²/m² Day5</p>
血液内科	ベンダムスチン		2	19	<p>グラニセトロン点滴静注ハカ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 トレアキシン点滴静注液 100mg/4mL (冷):120m²/m² Day1 Day2 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day2</p>
血液内科	SMILE	day6からG-CSF開始	21	7	<p>ソルテム1輸液 500mL:4本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 メイロン84(8.4%) 250mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 メソリキセート注射液:2000m²/m² Day2 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注ハカ 1mg/50mL:1本 Day2 Day3 Day4 Day5 Day9 Day11 Day13 Day15 Day17 Day19 Day21 ダイアモグス注射用 500mg:1V Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day2 Day3 Day4 Day5 エトボシド点滴静注液 100mg/5mL [サンド]:100m²/m² Day3 Day4 Day5 デキサト注射液 3.3mg/1mL:33m² Day3 Day4 Day5 ロイコリン注 3mg/1mL:15m² Day3 Day4 Day5 Day6 注射用イホマイド 1g:1.5g/m² Day3 Day4 Day5 ウロミテキサン注 100mg/1mL:300m²/m² Day3 Day4 Day5 ロイナセ注用 5000単位:6000固単/m² Day9 Day11 Day13 Day15 Day17 Day19 Day21 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day9 Day11 Day13 Day15 Day17 Day19 Day21 生食注 20mL:5m² Day9</p>
血液内科	アザシチジン (皮下)		7	21	<p>アザシチジン注射用 100mg [t²ガ²サ²]:75m²/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 注射用水 (大塚) 20mL:20m² L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p>
血液内科	アザシチジン (点滴)		7	21	<p>アザシチジン注射用 100mg [t²ガ²サ²]:75m²/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 注射用水 (大塚) 20mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液 P 50mL:50m² L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p>

血液内科	ポテリジオ		50	6	ポテリジオ点滴静注 20mg/5mL:1m g/kg Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 生食注（大塚）バッグ 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50
血液内科	ゾメタ（骨病変）	（注意）外来化学療法センター用	1	20	生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 ゾレドロン酸点滴静注 4mg/5mL:4m g Day1
血液内科	ATO		5	2	トリセノックス点滴静注 12mg/6mL:0.15m g/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 5%ブドウ糖液（大塚）バッグ 250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
血液内科	ATO寛解導入用（連日静注）	寛解導入時の投与回数は60回まで。	14	0	トリセノックス点滴静注 12mg/6mL:0.15m g/kg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 5%ブドウ糖液（大塚）バッグ 250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14
血液内科	GDP（GEM+CDDP+Dexa）		8	13	生食注（大塚） 500mL:1本 Day1 マンニトールS注射液 300mL:1袋 Day1 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:10A Day1 Day2 Day3 Day4 生食注（大塚） 500mL:3本 Day1 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1000m g/mi Day1 Day8 生食注（大塚） 500mL:500m L Day1 シスプラチン注「マルコ」:75m g/mi Day1 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 Day2 Day3 ヴィーンD輸液 500mL:1袋 Day2 Day3 グラセトロン点滴静注「カク」 1mg/50mL:1A Day8 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day8 生食注（大塚）バッグ 250mL:1本 Day8

血液内科	GDP (GEM+CDDP+Dexa)		8	13	<p>シスプラチン注:75mg/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:10A Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m² Day1 Day8 生食注 (大塚) 100mL:1瓶 Day1 Day8 フルオロウラシル注10mEq/10mLト【フルオロウラシル注】:1K T Day1 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :8mL Day1 マンニトールS注射液 300mL:200mL Day1 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [704]:1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1A Day8 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day8</p>
血液内科	JALSG ALL202-O (60歳未満) 寛解導入		22	6	<p>水溶性ブレドニ 10mg:0.001mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 Day13 Day14 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 Day20 Day21 Day22 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [704]:1A Day1 Day2 Day3 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 注射用エンドキサン 500mg (冷):1200mg/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 ダウマイシン静注用 20mg:60mg/m² Day1 Day2 Day3 オンコビン注射用 1mg:1.3mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22 ロイナゼ注用 5000単位:3000国際/m² Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 生食注 20mL:5mL Day9</p>
血液内科	JALSG ALL202-O(地固め②) HdMTX phase)	0ケリ散25mg/m ² day1-21 分1眠前	19	3	<p>メイロン84(8.4%) 250mL:250mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 生食注 (大塚) 500mL:250mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day15 Day16 Day17 Day18 Day19 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [704]:1A Day2 Day16 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day2 Day16 オンコビン注射用 1mg:1.3mg/m² Day2 Day16 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day2 Day16 メトキシセト注射液:3000mg/m² Day2 Day16 生食注 (大塚) 500mL:500mL Day2 Day16 ロイコボリン注 3mg/1mL:48mg Day4 Day18 ロイコボリン注 3mg/1mL:24mg Day4 Day5 Day18 Day19</p>
血液内科	JALSG ALL202-O (地固め①) HdAC phase)		3	11	<p>グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [704]:1A Day1 Day2 Day3 デキサート注射液 3.3mg/1mL:33mg Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 500mL:500mL Day1 Day2 Day3 シタラピン点滴静注液 1g/50mL:2000mg/m² Day1 Day2 Day3 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day2 Day3 エトキシド点滴静注液 100mg/5mL [サンド]:100mg/m² Day1 Day2 Day3</p>
血液内科	JALSG ALL202-O (維持療法)		1	0	<p>グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 オンコビン注射用 1mg:1.3mg/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>

血液内科	JALSG ALL202-O (60歳以上) 寛解導入		22	6	<p>オンコピン注射用 1mg:1.3m g/m² Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day15 Day22 ダウマイシン静注用 20mg:30m g/m² Day1 Day2 Day3 水溶性ブレドニン 10mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 グラニセトロン点滴静注「サガ」 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [シムラ] :1A Day1 Day2 Day3 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 注射用エンドキサン 500mg (冷):800m g/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 生食注 20mL:5m L Day9 ロイナゼ注用 5000単位:3000国単/m² Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20</p>
血液内科	プレントキシマブ ベドチン		1	20	<p>アドセトリス点滴静注用 50mg:1.8m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 20mL:2A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
血液内科	VTD-PACE (1サイクル目)	day4-7 サト [®] 200mg/body 内服	11	17	<p>ボルテゾミブ注射用 3mg:1m g/m² Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL「CMX」:1.2m L Day1 Day4 Day8 Day11 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [704]:1本 Day4 デキサート注射液 3.3mg/1mL:10A Day4 Day5 Day6 Day7 シスプラチン注「マルコ」:10m g/m² Day4 Day5 Day6 Day7 注射用エンドキサン 500mg (冷):400m g/m² Day4 Day5 Day6 Day7 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL「サンド」:40m g/m² Day4 Day5 Day6 Day7 生食注 1000mL:1000m L Day4 Day5 Day6 Day7 ドキシルピリン塩酸塩注射液:10m g/m² Day4 Day5 Day6 Day7 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day4 Day5 Day6 Day7 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day5 Day6 Day7</p>
血液内科	VTD-PACE (2サイクル目)	Day1-4 サト [®] 200mg/body 内服	11	17	<p>ボルテゾミブ注射用 3mg:1m g/m² Day1 Day4 Day8 Day11 生食注 20mL「CMX」:1.2m L Day1 Day4 Day8 Day11 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [704]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:10A Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン注「マルコ」:10m g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 注射用エンドキサン 500mg (冷):400m g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL「サンド」:40m g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 1000mL:1000m L Day1 Day2 Day3 Day4 ドキシルピリン塩酸塩注射液:10m g/m² Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day2 Day3 Day4</p>
血液内科	CEOP	ラステットカプセル 100mg/m ² 経口 day2、3	5	16	<p>プロセド注 20mg/2mL:20m g Day1 グラニセトロン点滴静注「サガ」 1mg/50mL:1本 Day1 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:50m g/m² Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:250m L Day1 オンコピン注射用 1mg:1.4m g/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):750m g/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 水溶性ブレドニン 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ピカーボン注 500mL:500m L Day1</p>

血液内科	エロツズマブ (E-Ld C1-2) 【体重50kg~90kg】	レブラミド25mg/1× 内服 day1~21	22	6	デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day8 Day15 Day22 エムプリシティ点滴静注用 300mg (冷):10m g/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 (大塚) バッグ 250mL:250m L Day1 Day8 Day15 Day22 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	エロツズマブ (E-Ld C3以降) 【体重50kg未満】	レブラミド25mg/1× 内服 day1~21	15	13	デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day15 エムプリシティ点滴静注用 300mg (冷):10m g/kg Day1 Day15 生食注 (大塚) バッグ 250mL:150m L Day1 Day15 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day15
血液内科	CHOEP		5	16	水溶性プレドニン 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:100m g/m ³ Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 Day2 Day3 トキソルピシン塩酸塩注射液:50m g/m ³ Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):750m g/m ³ Day1 フロセミド注 20mg/2mL:20m g Day1 ピカーボン注 500mL:500m L Day1 オンコピン注射用 1mg (冷):1.4m g/m ³ Day1
血液内科	ICE	IFM投与後、充分量の補液について検討願 います	3	18	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL:100m g/m ³ Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day1 Day2 Day3 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [アホ]:1袋 Day2 カルボプラチン点滴静注液:0m g/A Day2 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day2 ウロミテキサン注 100mg/1mL:1000m g/m ³ Day2 生食注 (大塚) バッグ 250mL:250m L Day2 注射用イホマイド 1g:5 g/m ³ Day2 ウロミテキサン注 100mg/1mL:2000m g/m ³ Day2 Day3
血液内科	ボルテゾミブ (s.c, 週1回)	併用のDexaは別途入力。	22	13	生食注 20mL「CMX」:1.2m L Day1 Day8 Day15 Day22 ボルテゾミブ注射用 3mg:1.3m g/m ³ Day1 Day8 Day15 Day22

血液内科	VRD (s.c, 週2回)	Rev day1-14, Bor day1, 4, 8, 11。	11	10	生食注 20mL「CMX」:1.2mL Day1 Day4 Day8 Day11 ボルテゾミブ注射用 3mg:1.3mg/m ² Day1 Day4 Day8 Day11
血液内科	KRd (1サイクル)	レタミド 25mg/日day1~21内服 ; テカト ン40mg/日1、8、15、22内服 ; テカト ン4mgday2、9、16内服	16	12	カイロリス点滴静注用:20mg/m ² Day1 Day2 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖液 100mL:50mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイロリス点滴静注用:27mg/m ² Day8 Day9 Day15 Day16
血液内科	GCVP(1サイクル目)	PSL day1-5 50mg/m ²	8	13	グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:750mg/m ² Day1 Day8 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 オンコピン注射用 1mg (冷):1.4mg/m ² Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):750mg/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 ピカーボン注 500mL:1本 Day1
血液内科	オビヌツズマブ (ガザイバ)	★導入療法 : 1サイクル目 (day1,8,15) 、2 サイクル目以降(day1)、★維持療法 : 単独 投与1回/2ヶ月、最長2年	1	6	ガザイバ点滴静注 1000mg/40mL (冷):1000mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:210mL Day1
血液内科	ベスポンサ (寛解2~6サイクル目)	Day1, 8, 15 : カロナール(300) 2錠、メ キタジン(3) 1錠を前投与	15	13	ヒドコルチゾン酢酸エステルNa注射用 100mg:1V Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 ベスポンサ点滴静注用 1mg (冷):0.5mg/m ² Day1 Day8 Day15 注射用水 (大塚) 20mL:1A Day1 Day8 Day15

血液内科	ロミデプシン		15	13	<p>イストタックス点滴静注用 10mg:14m g/m² Day1 Day8 Day15 生食注（大塚） 500mL:1本 Day1 Day8 Day15 グラネセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15</p>
血液内科	エロツズマブ（E-Pd C1-2）【体重50kg未満】	ポマリドミド 4mg/1× 内服 day1～21	22	6	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 Day8 Day15 Day22 生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 Day8 Day15 Day22 エムプリシティ点滴静注用 300mg（冷）:10m g/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注（大塚） バッグ 250mL:150m L Day1 Day8 Day15 Day22 注射用水（大塚） 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22</p>
血液内科	エロツズマブ（E-Pd C3以降）【体重50kg未満】	ポマリドミド 4mg/1× 内服 day1～21	1	27	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 エムプリシティ点滴静注用 300mg（冷）:20m g/kg Day1 生食注（大塚） バッグ 250mL:150m L Day1 注射用水（大塚） 100mL:1本 Day1</p>
血液内科	エロツズマブ（E-Pd C1-2）【体重50kg～90kg】	ポマリドミド 4mg/1× 内服 day1～21	22	6	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 Day8 Day15 Day22 生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 Day8 Day15 Day22 エムプリシティ点滴静注用 300mg（冷）:10m g/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 注射用水（大塚） 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22</p>
血液内科	エロツズマブ（E-Pd C3以降）【体重50kg～90kg】	ポマリドミド 4mg/1× 内服 day1～21	1	27	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6m g Day1 生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 エムプリシティ点滴静注用 300mg（冷）:20m g/kg Day1 生食注（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1 注射用水（大塚） 100mL:1本 Day1</p>

血液内科	A+CHP	※最大8サイクルまで	5	16	<p>アドセトリス点滴静注用 50mg (冷):1.8mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 20mL:2A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 グラニセトロン点滴静注ハッガ 1mg/50mL:1本 Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射液:50mg/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):750mg/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:500mL Day1 プロセミド注 20mg/2mL:20mg Day1 ピカーボン注 500mL:500mL Day1 水溶性ブレドニ 20mg:0.001mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
血液内科	Kd (週1回 1サイクル目)	デカト [®] 40mg/日day1,8,15,22内服	15	13	<p>カイプロリス点滴静注用:20mg/m² Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 100mL:50mL Day1 Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用:70mg/m² Day8 Day15</p>
血液内科	Kd (週1回 2サイクル目以降)	デカト [®] 40mg/日day1,8,15,22内服	15	13	<p>カイプロリス点滴静注用:70mg/m² Day1 Day8 Day15 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 100mL:50mL Day1 Day8 Day15</p>
血液内科	A+AVD	※最大6サイクルまで	15	13	<p>アドセトリス点滴静注用 50mg (冷):1.2mg/kg Day1 Day15 注射用水 (大塚) 20mL:2A Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day15 ドキシルピシン塩酸塩注射液:25mg/m² Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 Day15 エクザール注射用 10mg:6mg/m² Day1 Day15 ダカルバジン注用 100mg:375mg/m² Day1 Day15 ピカーボン注 500mL:500mL Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注ハッガ 1mg/50mL:1本 Day1 Day15</p>
血液内科	ALL/MRD2019 寛解導入療法(16才以上35才以	PSL60mg/m ² (MAX100mg) day1-21	22	6	<p>パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70μg]:1袋 Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):1000mg/m² Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1本 Day1 ダウマイシン静注用 20mg:50mg/m² Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 オンコピン注射用 1mg:1.3mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 20mL:5mL Day9 ロイナセ注用 5000単位:6000国際/m² Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20 グラニセトロン点滴静注ハッガ 1mg/50mL:1本 Day9 Day11 Day13 Day16 Day18 Day20</p>

血液内科	ALL/MRD2019 地固め(B-1) (16才以上35才以	day1 MTX15mg/DEX3.3mg IT	5	0	パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70時]:1本 Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 シタラピン点滴静注液 1g/50mL:2000mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ノバントロン注 20mg/10mL:10mg/m ² Day2 Day3 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day4 Day5 ロイナゼ注用 5000単位 (冷):10000国単/m ² Day5 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day5 ヒトコルチコステロイドNa注射用 100mg:100mg Day5 生理食塩液 P 50mL:1本 Day5
血液内科	ALL/MRD2019 地固め療法 (C-1) (16才以上3	day1 MTX15mg/DEX3.3mg IT	18	0	オンコピン注射用 1mg (冷):1.3mg/m ² Day1 Day15 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day15 メトトレキセート注射用:2700mg/m ² Day1 Day15 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day15 メトトレキセート注射用:300mg/m ² Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day2 Day15 Day16 メイロン84(8.4%) 250mL:500mg L Day1 Day2 Day3 Day4 Day15 Day16 Day17 Day18 ヒトコルチコステロイドNa注射用 100mg:1V Day2 Day16 生理食塩液 P 50mL:1本 Day2 Day16 ロイナゼ注用 5000単位 (冷):10000国単/m ² Day2 Day16 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day2 Day16 ロイコリン注 3mg/1mL:15mg/m ² Day3 Day4 Day17 Day18
血液内科	IsaPd (1サイクル目)	POM day1-21/Dex day1,8,15,22/前 投薬 NSAIDs,H1,H2ブロッカー	22	6	サークリサ点滴静注:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	IsaPd (2サイクル目以降)	POM day1-21/Dex day1,8,15,22/前 投薬 NSAIDs,H1,H2ブロッカー	15	13	サークリサ点滴静注:10mg/kg Day1 Day15 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day15
血液内科	ALL/MRD2019維持療法(M-1)(16才以上35才以	6-MP50mg/m ² /day 1×vds / MTX20mg/m ² /week 1×vds / PSL60mg/m ² day1-5 Max100mg	1	27	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 オンコピン注射用 1mg:1.3mg/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 水溶性プレドニン 20mg:60mg/m ² Day1 ロイナゼ注用 5000単位 (冷):10000国単/m ² Day1 ヒトコルチコステロイドNa注射用 100mg:50mg Day1 ロカイン注1% 20mg/2mL:0.3mg L Day1 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1

血液内科	LEED		4	0	注射用エンドキサン:60mg/kg Day1 Day2 生食注(大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 ウロミデキサン注 100mg/1mL:24mg/kg Day1 Day2 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 Day2 生食注 1000mL:1000m L Day1 Day2 Day3 エトボシド点滴静注液 100mg/5mL:500mg/ml Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注パ"サ" 1mg/50mL:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサト注射液 3.3mg/1mL:33mg g Day1 Day2 Day3 Day4 パロ/セトロン点滴静注パ"ツ" 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day4 アルケラン静注用 50mg:130mg/ml Day4 生食注(大塚) 100mL:100m L Day4
血液内科	DLd (1~2サイクル目)	LEN Day1~21/Dex Day1,(2),8,(9),15,(16),22,(23)/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex/初回のみLT拮抗	22	6	ダラキユーロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day8 Day15 Day22
血液内科	DLd (3~6サイクル目)	LEN Day1~21/Dex Day1,(2),8,(9),15,(16),22,(23)/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	15	13	ダラキユーロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day15
血液内科	DLd (7サイクル目以降)	LEN Day1~21/Dex Day1,(2),8,(9),15,(16),22,(23)/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	1	27	ダラキユーロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1
血液内科	DBd (1~3サイクル目)	Dex day1,2,4,5,8,9,11,12/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex/初回のみLT拮抗	15	6	ダラキユーロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day8 Day15 生食注 20mL:1.2m L Day1 Day4 Day8 Day11 ポルテゾミブ注射用 3mg:1.3m g/ml Day1 Day4 Day8 Day11

血液内科	DBd (4~8サイクル目)	Dex day1,2,4,5,8,9,11,12/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	11	10	<p>ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1</p> <p>生食注 20mL:1.2m L Day1 Day4 Day8 Day11</p> <p>ボルテゾミブ注射用 3mg:1.3m g/m² Day1 Day4 Day8 Day11</p>
血液内科	DBd (9サイクル目以降)	前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	1	20	<p>ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1</p>
血液内科	DKd (3-6サイクル目)	Dex day1,2,8,9,15,16,22/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	16	12	<p>カイトロリス点滴静注用:56m g/m² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16</p> <p>注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16</p> <p>5%ブドウ糖液 100mL:50m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16</p> <p>ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day15</p>
血液内科	DKd (7サイクル目以降)	Dex day1,2,8,9,15,16,22/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	16	12	<p>カイトロリス点滴静注用:56m g/m² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16</p> <p>注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16</p> <p>5%ブドウ糖液 100mL:50m L Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16</p> <p>ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1</p>
血液内科	DMPB (1サイクル目)	アルケラン9mg/m ² day1-4/PSL60mg/m ² day2-4/Dex day1,8,15,22,29,36/前 投薬 NSAID・抗ヒス・Dex/初回のみLT拮抗	36	6	<p>生食注 20mL:1.2m L Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32</p> <p>ボルテゾミブ注射用 3mg:1.3m g/m² Day1 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29</p> <p>Day32</p> <p>ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day8 Day15 Day22 Day29</p> <p>Day36</p>

血液内科	DMPB (2~9サイクル目)	アルケラン9mg/m ² day1-4/PSL60mg/m ² day2-4/Dex day1,22/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	29	13	生食注 20mL:1.2m L Day1 Day8 Day22 Day29 ボルテゾミブ注射用 3mg:1.3m g/m ² Day1 Day8 Day22 Day29 ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day22
血液内科	DMPB (10サイクル目以降)	Dex day1/前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	1	27	ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1
血液内科	DA-EPOCH (1 st)		5	16	塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [ネバ [®] ラ] :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注 [®] ヲガ [®] 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL [サンド]:40m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンゴピン注射用 1mg:0.4m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ドキシリジン塩酸塩注射液:8m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液 500mL:2本 Day1 Day2 Day3 Day4 水溶性プレドニ 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):600m g/m ² Day5 ソルデム1輸液 500mL:3本 Day5
血液内科	DA-EPOCH (1 st)		5	16	塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [ネバ [®] ラ] :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注 [®] ヲガ [®] 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL [サンド]:50m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンゴピン注射用 1mg:0.4m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ドキシリジン塩酸塩注射液:10m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液 500mL:2本 Day1 Day2 Day3 Day4 水溶性プレドニ 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム1輸液 500mL:3本 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):750m g/m ² Day5
血液内科	DA-EPOCH (1 st)		5	16	塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [ネバ [®] ラ] :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注 [®] ヲガ [®] 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL [サンド]:60m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンゴピン注射用 1mg:0.4m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 ドキシリジン塩酸塩注射液:12m g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液 500mL:2本 Day1 Day2 Day3 Day4 水溶性プレドニ 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):900m g/m ² Day5 ソルデム1輸液 500mL:3本 Day5

血液内科	DA-EPOCH (1/3)		5	16	<p>塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [メトクロ] :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトボシド点滴静注液 100mg/5mL [サンド]:72mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンコピン注射用 1mg:0.4m g/m Day1 Day2 Day3 Day4 ドキソルビシン塩酸塩注射液:14mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液 500mL:2本 Day1 Day2 Day3 Day4 水溶性プレドニ 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):1080mg/m Day5 ソルデム1輸液 500mL:3本 Day5</p>
血液内科	DA-EPOCH (1/4)		5	16	<p>塩酸メトクロプラミド注射液 10mg/2mL [メトクロ] :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトボシド点滴静注液 100mg/5mL [サンド]:86mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンコピン注射用 1mg:0.4m g/m Day1 Day2 Day3 Day4 ドキソルビシン塩酸塩注射液:17mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液 500mL:2本 Day1 Day2 Day3 Day4 水溶性プレドニ 20mg:0.001m g Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用エンドキサン 500mg (冷):1290mg/m Day5 ソルデム1輸液 500mL:3本 Day5</p>
血液内科	Pola+BR 1コース目	リツキシマブ、ポライビー投与30分～1時間前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬を投与	3	18	<p>リツキシマブBS点滴静注:375mg/m Day1 生食注:337.5m L/m Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9mg Day2 Day3 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day2 Day3 ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day2 注射用水 (大塚) 20mL:1A Day2 生食注 (大塚) 100mL:1瓶 Day2 パロノセロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [アロキ]:1袋 Day2 トレアキシン点滴静注液 100mg/4mL (冷):90mg/m Day2 Day3 生理食塩液 P 50mL:1本 Day2 Day3</p>
血液内科	Pola+BR 2コース目以降	リツキサン投与30分～1時間前に抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬を投与	2	19	<p>リツキシマブBS点滴静注:375mg/m Day1 生食注:337.5m L/m Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9mg Day1 Day2 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day2 ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 20mL:1A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1瓶 Day1 パロノセロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [アロキ]:1袋 Day1 トレアキシン点滴静注液 100mg/4mL (冷):90mg/m Day1 Day2 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2</p>
血液内科	DCyBorD (1～2サイクル目)	Dex20mg day1,2,8,9,15,16,22,23/CPA内服 300mg/m ² day1,8,15,22 前投薬 NSAIDs・抗ヒ・Dex/初回のみLT拮抗	22	6	<p>ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day8 Day15 Day22 生食注 20mL:1.2m L Day1 Day8 Day15 Day22 ベルケイド注射用 3mg:1.3m g/m Day1 Day8 Day15 Day22</p>

血液内科	DCyBorD (3~6サイクル目)	Dex20mg day1,2,15,16/Dex40mg day8,22/CPA 内服300mg/m ² day1,8,15,22 前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	22	6	<p>ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1 Day15</p> <p>生食注 20mL:1.2m L Day1 Day8 Day15 Day22</p> <p>ヘルケイド注射用 3mg:1.3mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22</p>
血液内科	DCyBorD (7サイクル目以降)	前投薬 NSAID・抗ヒス・Dex	1	27	<p>ダラキューロ配合皮下注 1800mg/15mL (冷):15m L Day1</p>
血液内科	VEN/LDAC	ベネクレクタ 連日内服	10	18	<p>キロサイド注:20mg/ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day10</p>
血液内科	Isa+d (1サイクル目)	Dex day1,8,15,22/前投薬 NSAIDs,H1,H2受容体拮抗薬	22	6	<p>サークリサ点滴静注:20mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22</p> <p>生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22</p>
血液内科	Isa+d (2サイクル目以降)	Dex day1,8,15,22/前投薬 NSAIDs,H1,H2受容体拮抗薬	15	13	<p>サークリサ点滴静注:20mg/kg Day1 Day15</p> <p>生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day15</p>

血液内科	Isa単独（2サイクル目以降）	前投薬 NSAIDs,H1,H2受容体拮抗薬	15	13	<p>ソル・メドロール 125mg:1V Day1 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day15 サークリサ点滴静注:20mg/kg Day1 Day15 生食注（大塚）バッグ 250mL:1袋 Day1 Day15</p>
血液内科	IsaKd（1サイクル目）	Dex day1,2,8,9,15,16,22,23/前投薬 NSAIDs,H1,H2ブロッカー	22	6	<p>サークリサ点滴静注:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22 生食注（大塚）バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 カイトロリス点滴静注用:20mg/m² Day1 Day2 注射用水（大塚） 100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖液 100mL:50mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 カイトロリス点滴静注用:56mg/m² Day8 Day9 Day15 Day16</p>
血液内科	IsaKd（2サイクル目以降）	Dex day1,2,8,9,15,16,22,23/前投薬 NSAIDs,H1,H2ブロッカー	16	12	<p>カイトロリス点滴静注用:56mg/m² Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 注射用水（大塚） 100mL:1本 Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 5%ブドウ糖液 100mL:50mL Day1 Day2 Day8 Day9 Day15 Day16 サークリサ点滴静注:10mg/kg Day1 Day15 生食注（大塚）バッグ 250mL:1袋 Day1 Day15</p>
血液内科	Pola+CHP	ポライビー投与開始60分以上前にPSL投与、30分以上前に抗ヒスタミン薬、NSAIDsを投与	5	16	<p>水溶性プレドニン 20mg:0.001mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注（大塚） 100mL:100mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 ドキシルピジン塩酸塩注射液:50mg/m² Day1 注射用エンドキサン 500mg（冷）:750mg/m² Day1 生食注（大塚） 500mL:500mL Day1 ポライビー点滴静注用:1.8mg/kg Day1 注射用水（大塚） 20mL:1A Day1 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1</p>
血液内科	TBC	自家末梢血幹細胞移植	7	2	<p>リサイオ点滴静注液 100mg/2.5mL <冷> :5mg/kg Day1 Day2 生食注（大塚）バッグ 250mL:250mL Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブスルフェクス点滴静注用 60mg/10mL（冷）:0.8mg/kg Day3 Day4 Day5 Day6 生食注（大塚） 100mL:1本 Day3 Day4 Day5 Day6 注射用エンドキサン 500mg（冷）:60mg/kg Day6 Day7 生食注（大塚） 500mL:500mL Day6 Day7 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day6 Day7 生理食塩液 P 50mL:50mL Day6 Day7 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:0.75mg Day6 ウロミキサン注 100mg/1mL:24mg/kg Day6 Day7 生食注（大塚） 100mL:100mL Day6 Day7</p>

血液内科	リポゾーマルドキソルピシン		1	13	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 ドキシル注 20mg/10mL:20mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
外科・乳腺外科	3週毎ドセタキセル		1	20	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドセタキセル点滴静注用:75mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
外科・乳腺外科	Weeklyパクリタキセル		1	6	レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 パクリタキセル注:80mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1
外科・乳腺外科	3週毎トラスツズマブ (2回目以降)		1	20	トラスツズマブBS点滴静注用 150mg (冷) [ルセツチン] :6mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1
外科・乳腺外科	3週毎トラスツズマブ (初回)		1	20	トラスツズマブBS点滴静注用 150mg (冷) [ルセツチン] :8mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1

外科・乳腺外科	3週毎パクリタキセル		1	20	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:16.5mg Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:20mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 パクリタキセル注:175mg/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1</p>
外科・乳腺外科	GEM単剤 (乳癌)		8	13	<p>生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1250mg/m² Day1 Day8 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8</p>
外科・乳腺外科	3週毎Her+DTX (初回)		2	19	<p>トラスチマブBS点滴静注用 150mg (冷) [ルセチン] :8mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day2 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day2 ドセタキセル点滴静注用:75mg/m² Day2 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day2</p>
外科・乳腺外科	3週毎Her+DTX (2回目以降)		1	20	<p>トラスチマブBS点滴静注用 150mg (冷) [ルセチン] :6mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドセタキセル点滴静注用:75mg/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>
外科・乳腺外科	HER+Pertuzumab+DOC (初回)		2	20	<p>パージエタ点滴静注 420mg/14mL:840mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 トラスチマブBS点滴静注用 150mg (冷) [ルセチン] :8mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day2 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day2 ドセタキセル点滴静注用:75mg/m² Day2 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day2</p>

外科・乳腺外科	HER+Pertuzumab+DOC (2回目以降)		1	20	<p>パージェタ点滴静注 420mg/14mL:420mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 トラスチマブBS点滴静注用 150mg (冷) [ハセツチ] :6mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 ドセタキセル点滴静注用:75mg/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>
外科・乳腺外科	HER+Pertuzumab (2回目以降)		1	20	<p>パージェタ点滴静注 420mg/14mL:420mg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 トラスチマブBS点滴静注用 150mg (冷) [ハセツチ] :6mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 100mL:1本 Day1</p>
外科・乳腺外科	T-DM1		1	20	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:3.3mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 カドサイラ点滴静注用 100mg:3.6mg/kg Day1 注射用水 (大塚) 20mL:1A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>
外科・乳腺外科	TC (乳腺 DOC+CPA)		1	20	<p>グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1mg Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 ドセタキセル点滴静注用:75mg/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):600mg/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1</p>
外科・乳腺外科	AC		1	20	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1A Day1 生食注 (大塚) 100mL:1瓶 Day1 ドキシルビシン塩酸塩注射液:60mg/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):600mg/m² Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1</p>

外科・乳腺外科	Dose Dense AC		1	13	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1A Day1 生食注（大塚） 100mL:100m L Day1 ドキソルピシン塩酸塩注射液:60mg/g/m² Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 注射用エンドキサン 500mg（冷）:600mg/g/m² Day1</p>
外科・乳腺外科	Dose Dense PTX		1	13	<p>レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 パクリタキセル注:175mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液（大塚） 500mL:500m L Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:16.5mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1</p>
外科・乳腺外科	エンハーツ（乳がん）		1	20	<p>グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day1 エンハーツ点滴静注用 100mg（冷）:5.4mg/kg Day1 注射用水（大塚） 100mL:1本 Day1</p>
外科・乳腺外科	再発Pembro3週毎		1	20	<p>キイトルーダ点滴静注:200mg/g Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1</p>
外科・乳腺外科	Pembro+CBDCA毎週+PTX		15	6	<p>キイトルーダ点滴静注:200mg/g Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注:80mg/g/m² Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液（大塚） バッグ 250mL:1本 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 (車X)レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15</p>

産婦人科	TCweekly(PTX+CBDCA) (両剤分割腹膜癌)		15	6	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注:78mg/g/m ² Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
産婦人科	TC conventional(PTX+CBDCA) (腹膜癌)		1	20	レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 パクリタキセル注:175mg/g/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1
産婦人科	TP		2	19	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 パクリタキセル注:135mg/g/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 生食注 1000mL:1本 Day1 シスプラチン注「マルコ」:50mg/g/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:400mL Day1 アクチット輸液 500mL:1本 Day2
産婦人科	DC(DOC+CBDCA) (子宮体癌)		1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドセタキセル点滴静注用:60mg/g/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1
産婦人科	TC conventiona(PTX+CBDCA) (子宮体癌)		1	20	レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70粒]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 パクリタキセル注:175mg/g/m ² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1

産婦人科	CPT-P		15	13	<p>ビカーボン注 500mL:1本 Day1 Day2 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液:60mg/g/m² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day8 Day15 シスプラチン注「マルコ」:60mg/g/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:300mL Day1 アクチット輸液 500mL:1本 Day1 グラニセトロン点滴静注「サグ」 1mg/50mL:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day8 Day15</p>
産婦人科	DC(DOC+CBDCA) (卵巣癌)	DTXは75mg/m ² に変更されています (2017.7-)	1	20	<p>パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 トセタキセル点滴静注用:75mg/g/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1</p>
産婦人科	TC-ip(PTX+CBDCA)		3	18	<p>カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3.3mg/g Day1 生食注 20mL「CMX」:1A Day1 Day2 Day3 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1本 Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 バクリタキセル注:175mg/g/m² Day1 ソルデム3A 500mL:1本 Day1 ビカーボン注 500mL:1本 Day1 Day2 ファミチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day2 Day3</p>
産婦人科	CPT-11A (3投1休 ; A法)		15	13	<p>イリノテカン塩酸塩点滴静注液:100mg/g/m² Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注「サグ」 1mg/50mL:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15</p>
産婦人科	TC conventional(PTX+CBDCA)		1	20	<p>パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ファミチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 バクリタキセル注:175mg/g/m² Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1</p>

産婦人科	TC weekly(PTX+CBDCA) (両剤分割卵巣癌)		15	6	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注:78mg/g/m Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 Day8 Day15 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
産婦人科	BEP (産婦人科)	BLM累積投与量は360mg(BEP療法に限る)	16	5	ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day9 Day16 ソルデム3 A 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 マンニトールS注射液 300mL:100m L Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 シスプラチン注「マルコ」:20mg/g/m Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生食注 (大塚) 500mL:500m L Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9mg g Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL「サント」:100mg/g/m Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 プレオ注射用 15mg:20mg/g/m Day2 Day9 Day16 生理食塩液 P 50mL:1本 Day2 Day9 Day16 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1A Day2 Day3 Day4 Day5 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day6
産婦人科	NGT+BEV(tri)		5	16	グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注射用 1.1mg:1.25mg/g/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アバスチン点滴静注用:15mg/kg Day1
産婦人科	dd-TC(PTX+CBDCA)		15	6	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 Day8 Day15 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注:80mg/g/m Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day8 Day15
産婦人科	Ewing VDC		3	4	生食注 1000mL:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 Day2 生食注 20mL「CMX」:1A Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1本 Day1 オンゴピン注射用 1mg:1.5mg/g/m Day1 注射用エンドキサン 500mg (冷):1200mg/g/m Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 ウロミテキサン注 100mg/1mL:100mg Day1 ドキシルピリン塩酸塩注射液:37.5mg/g/m Day1 Day2 生理食塩液 P 50mL:48m L Day1 Day2 ウロミテキサン注 100mg/1mL:400mg Day1 ピカーボン注 500mL:1本 Day1 Day3 アクトット輸液 500mL:1本 Day1 Day2

産婦人科	TC+BEV(PTX+CBDCA+BEV)		1	20	<p>パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70時]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 フモチン静注液 20mg/20mL:1A Day1 レスタミンコーワ錠 10mg 5錠:1包 Day1 バクシキセル注:175mg/g/m Day1 生食注(大塚) 500mL:1本 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 生食注(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 ペバシズマブBS点滴静注用:15mg/g/kg Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1</p>
産婦人科	BEV		1	20	<p>生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 ペバシズマブBS点滴静注用:15mg/g/kg Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1</p>
産婦人科	PLD+BEV (投与量90mg未満)	PLDの総投与量が500mg/m ² を超えないように注意	15	13	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day15 トキシシル注 20mg/10mL:40mg/g/m Day1 5%ブドウ糖液(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 アバスチン点滴静注用:10mg/g/kg Day1 Day15 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1 Day15</p>
産婦人科	DC-BEV(DOC+CBDCA+BEV)		1	20	<p>パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70時]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 トセタキセル点滴静注用:75mg/g/m Day1 生食注(大塚) 500mL:1本 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/g/A Day1 アバスチン点滴静注用:15mg/g/kg Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1</p>
産婦人科	GEM+BEV		15	13	<p>グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/g/m Day1 Day8 Day15 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 アバスチン点滴静注用:15mg/g/kg Day1</p>

産婦人科	GC-BEV		8	13	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m ² Day1 Day8 生食注 (大塚) 100mL:1瓶 Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 アバチン点滴静注用:15mg/kg Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day8 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 Day8
産婦人科	PLD+CBDCA+BEV	PLDの総投与量が500mg/m ² を超えないように注意	1	27	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70ｷﾝ]:1本 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 ドキシル注 20mg/10mL:30mg/m ² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 アバチン点滴静注用:15mg/kg Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
産婦人科	パムパリスマ [®] 200mg 3週+レパチン [®] (子宮体癌)	※レンピマ (1日1回毎日服用) と併用	1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1
産婦人科	パムパリスマ [®] 400mg 6週+レパチン [®] (子宮体癌)	※レンピマ (1日1回毎日服用) と併用	1	41	キイトルーダ点滴静注:400mg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1
産婦人科	TC+BEV+Pembro		1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 バクリタキセル注:175mg/m ² Day1 カルボプラチン点滴静注液 : AUC=5 Day1 アバチン点滴静注用:15mg/kg Day1

産婦人科	セミアリマブ		1	20	リブタヨ点滴静注 : 350mg Day1
形成外科	CDDP-THPADM 静注 (C-T i.v.)		3	18	ソルデム3 A 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 ソルデム1輸液 500mL:4本 Day2 アスパキリン酸カリウム注10mEq/10mLキト【アスパカリウム注】:1KT Day2 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [アロキ]:1本 Day2 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day2 シスプラチン注「マルコ」:150mg Day2 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day2 注射用テラルピシン:50mg Day2 5%ブドウ糖液 100mL:1本 Day2 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day2
皮膚科	乾癬レミケード(4回目以降)		1	0	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 レミケード点滴静注用 100mg:5mg/kg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
皮膚科	乾癬インフリキシマブBS (4回目以降)		1	0	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 インフリキシマブBS点滴静注用 100mg:5mg/kg Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
泌尿器科	EP		9	12	グリーンF輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 ソルデム3 A 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 マンニトールS注射液 300mL:100mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 5%ブドウ糖液 (大塚) 500mL:1本 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 イトボシド点滴静注液 100mg/5mL 「サンド」:100mg/m Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 シスプラチン注「マルコ」:20mg/m Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生食注 (大塚) 500mL:300mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9mg Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生食注 20mL 「CMX」:17mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day6

泌尿器科	(尿路上皮癌) TIN		7	21	<p>ウロミテキサソ注 100mg/1mL:300mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 生食注 20mL「CMX」:1A Day1 Day2 Day3 Day4 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 注射用イホマイド 1g:1.5g/m² Day1 Day2 Day3 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 アクワ静注用:70mg/m² Day1 バクシケル注:175mg/m² Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:16.5mg Day1 パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 レスタミンコー錠 10mg 5錠:1包 Day1 ソルデム3 A 500mL:1本 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7</p>
泌尿器科	GC(3week)	3週1コースのレジメンです、アプレピタント処方必要	8	13	<p>生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 Day8 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m² Day1 Day8 ヴィーンD輸液 500mL:1000mL Day1 フィジオ140輸液500mL:500mL Day1 Day2 Day3 Day4 ヴィーンD輸液 500mL:500mL Day2 Day3 シスプラチン注「マルコ」:70mg/m² Day2 生食注 (大塚) 500mL:200mL Day2 フィジオ140輸液500mL:1袋 Day2 フロセミド注 20mg/2mL:10mg Day2 パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day2 デキサート注射液 3.3mg/1mL:9.9mg Day2 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day2</p>
泌尿器科	Doc		1	20	<p>生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1 グラネセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 ドセタキセル点滴静注用:70mg/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1</p>
泌尿器科	GCb(3week) (GEM+CBDCA)		8	13	<p>生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 Day8 パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:0.75mg Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3.3mg Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 ゲムシタピン点滴静注用:1000mg/m² Day1 Day8 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day8</p>
泌尿器科	CAZ (カバジタキセル)		1	20	<p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 ファモチジン静注液 20mg/20mL:1A Day1 ボララミン注 5mg/1mL:5mg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1 ジエブタナ点滴静注 60mg/1.5mL:25mg/m² Day1 5%ブドウ糖液 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1</p>

泌尿器科	オプジーボ (RCC/240mg2週間隔)		1	13	オプジーボ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
泌尿器科	オプジーボ (RCC/480mg 4週間隔)		1	27	オプジーボ点滴静注:480mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
泌尿器科	キイトルーダ(尿路上皮がん/200mg 3週間隔)	キイトルーダ400mg 6週間隔に変更可能	1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1
泌尿器科	キイトルーダ(尿路上皮がん/400mg 6週間隔)	キイトルーダ200mg 3週間隔に変更可能	1	41	キイトルーダ点滴静注:400mg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1
泌尿器科	Eribulin (悪性軟部腫瘍)		8	13	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 ハラヴェン静注 1mg/2ml:1.4mg/ml Day1 Day8 生理食塩液 P 50mL:25m L Day1 Day8

泌尿器科	オプジーホ®/ヤーホイ(RCC)【2剤併用4回まで】	オプジーホ®とヤーホイ®を3週間間隔で4回点滴静注、その後オプジーホ®単独療法へ	1	20	オプジーホ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1 ヤーホイ点滴静注液:1mg/kg Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1
泌尿器科	ゴナックス(2回目以降)【12週間間隔】		1	83	ゴナックス皮下注用 240mg:480mg Day1
泌尿器科	ドキシルピシン単回静注	最大投与回数:1回	1	0	ドキシルピシン塩酸塩注射液:40mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
泌尿器科	ドキシルピシン維持静注	週に1回、計8回	1	6	ドキシルピシン塩酸塩注射液:40mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
泌尿器科	ハムゾリスマブ(キイトルーダ® 200mg3週)+アキチニブ(インライタ)	※インライタ(1日2回毎日服用)と併用	1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1

泌尿器科	ハムロリスマブ（キイトルーダ 400mg6週）+アキシチニブ（インライタ）	※インライタ（1日2回毎日服用）と併用	1	41	キイトルーダ点滴静注:400mg Day1 生食注（大塚） 100mL:100m L Day1
泌尿器科	アベルマブ（バベンチオ）+アキシチニブ(インライタ)	※インライタ（1日2回毎日服用）と併用。 抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤は別途処方が必要。	1	13	バベンチオ点滴静注 200mg/10mL（冷）:10mg/kg Day1 生食注（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1
泌尿器科	CBDCA（単回、精巢）	アプレピタント併用	1	20	パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70時]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:1A Day1 カルボプラチン点滴静注液:0mg/A Day1 生食注（大塚） バッグ 250mL:1袋 Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1
泌尿器科	アベルマブ(尿路上皮癌)	抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤は別途処方が必要。	1	13	バベンチオ点滴静注 200mg/10mL（冷）:10mg/kg Day1 生食注（大塚） バッグ 250mL:1本 Day1
泌尿器科	カレメチクス+オプジーボ（RCC/240mg2週間隔）	カレメチクス 1日1回40mg 空腹時経口投与	1	13	オプジーボ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注（大塚） 100mL:1本 Day1

泌尿器科	エンホルツマブ ベドチン (尿路上皮癌)		15	13	生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 3.3mg/1mL:6.6mg Day1 Day8 Day15 パドセブ点滴静注用 30mg (冷):1.25mg/kg Day1 Day8 Day15 注射用水 (大塚) 20mL:20mL Day1 Day8 Day15
泌尿器科	ハムゾリスマブ (キイトルーダ 200mg3週) + レンバチニブ (レンビマ)	※レンビマ (1日1回毎日服用) と併用	1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50mL Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1
泌尿器科	ハムゾリスマブ (キイトルーダ 400mg6週) + レンバチニブ (レンビマ)	※レンビマ (1日1回毎日服用) と併用	1	41	キイトルーダ点滴静注:400mg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100mL Day1
泌尿器科	尿路上皮癌術後 オプジーボ240mg/2週間隔	投与期間は12ヶ月間まで	1	13	オプジーボ点滴静注:240mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
泌尿器科	尿路上皮癌術後 オプジーボ480mg/4週間隔	投与期間は12ヶ月間まで	1	27	オプジーボ点滴静注:480mg Day1 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1

泌尿器科	術後 ^ハ ム ^ノ リス ^マ マ ^ク (キイトル ^ダ 200mg 3週)	★投与期間は12ヶ月間まで	1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1
泌尿器科	術後 ^ハ ム ^ノ リス ^マ マ ^ク (キイトル ^ダ 400mg 6週)	★投与期間は12ヶ月間まで	1	41	キイトルーダ点滴静注:400mg Day1 生食注 (大塚) 100mL:100m L Day1
泌尿器科	IE	最大6コースまで	5	16	ウロミテキサン注 100mg/1mL:360mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトボシド点滴静注液 100mg/5mL「サンド」:100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フィジオ140輸液500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 注射用イホマイド 1g:1.8g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食注 (大塚) 500mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 フィジオ140輸液500mL:2袋 Day5 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day5
泌尿器科	VDC	最大6コースまで	3	18	ウロミテキサン注 100mg/1mL:240mg/m ² Day1 パロノセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1 デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1 Day2 オンコピン注射用 1mg:1.5mg/m ² Day1 生理食塩液 P 50mL:1瓶 Day1 Day2 注射用エンドキサン 500mg (冷):1200mg/m ² Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1 フィジオ140輸液500mL:1袋 Day1 ドキシルピジン塩酸塩注射液:37.5mg/m ² Day1 Day2 生食注 (大塚) 100mL:1瓶 Day1 Day2 ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1 Day2 フィジオ140輸液500mL:2袋 Day2 Day3
小児科	Rituximab(小児難治性初 ^ニ セ ^シ 症候群)	抗ヒスタミン剤、解熱鎮痛剤の処方が必要です (Infusion reaction予防)	1	6	リツキサン点滴静注:375mg/m ² Day1 生食注:337.5m L/m ² Day1

眼科	眼科MMC (2019/10～ 医師限定)	(注意) スポンジに染み込ませ結膜下に2～3分留めた後、除去、洗浄	1	0	(非売品) マイトマイシン注用 2mg:2mg Day1
放射線治療科	weekly CDDP (+RT)	アプレピタント、デカドロン8mg(day2-4)内服必要。	2	5	<p>アクチット輸液 500mL:1本 Day1 Day2</p> <p>フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1</p> <p>ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1</p> <p>硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1</p> <p>パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1本 Day1</p> <p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1</p> <p>シスプラチン注:40mg/m² Day1</p> <p>生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1</p> <p>アクチット輸液 500mL:2本 Day1</p>
放射線治療科	triweekly CDDP (+RT)	アプレピタント処方必要。3週に1回予定。	4	16	<p>アクチット輸液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4</p> <p>フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1</p> <p>ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1</p> <p>硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1</p> <p>パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1本 Day1</p> <p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1</p> <p>シスプラチン注:80mg/m² Day1</p> <p>生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1</p> <p>アクチット輸液 500mL:2本 Day1</p> <p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day2 Day3 Day4</p>
放射線治療科	FP (600,60)	アプレピタント処方必要。24HCrCl 70L/day以上。	4	16	<p>アクチット輸液 500mL:2本 Day1</p> <p>フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1</p> <p>ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1</p> <p>硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1</p> <p>パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1</p> <p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1</p> <p>シスプラチン注:60mg/m² Day1</p> <p>生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4</p> <p>フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):600mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4</p> <p>アクチット輸液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4</p> <p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day2 Day3 Day4</p>
放射線治療科	FP (400,40)		4	9	<p>アクチット輸液 500mL:2本 Day1</p> <p>フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1</p> <p>ヴィーンF輸液 500mL:1袋 Day1</p> <p>硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL) :1A Day1</p> <p>パロ/セトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70分]:1袋 Day1</p> <p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:3A Day1</p> <p>シスプラチン注:40mg/m² Day1</p> <p>生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4</p> <p>フルオロウラシル注 1000mg/20mL (冷):400mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4</p> <p>アクチット輸液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4</p> <p>デキサート注射液 3.3mg/1mL:2A Day2 Day3 Day4</p>

放射線治療科	Pembrolizumab(頭頸部がん/200mg 3週間隔)		1	20	キイトルーダ点滴静注:200mg Day1 生理食塩液 P 50mL:50m L Day1 生食注(大塚) 100mL:100m L Day1
放射線治療科	Pembro-CDDP-5FU(頭頸部がん)	※6サイクルまで。7サイクル目以降はPembrolizumab単剤へ。アプレピタント処方必要。	4	17	フルオロウラシル注 1000mg/20mL(冷):1000mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 生食注(大塚) 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 生理食塩液 P 50mL:1本 Day1 アクチット輸液 500mL:1本 Day1 Day2 Day3 Day4 フロセミド注 20mg/2mL:1A Day1 ブドウ糖輸液 500mL:1袋 Day1 硫酸Mg補正液 20mL (1mEq/1mL):1A Day1 パロセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL [70μg]:1袋 Day1 デキサメタゾン注 3.3mg/1mL:2A Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン注:100mg/m ² Day1 キイトルーダ点滴静注 100mg/4mL(冷):200mg Day1 アクチット輸液 500mL:2本 Day1
脳神経外科	BV10		1	13	アバスチン点滴静注用:10mg/kg Day1 生食注(大塚) 100mL:1本 Day1 生食注 20mL「CMX」:1A Day1
腎臓移植外科	ハイリスク初回投与(リツキサン)	リツキサンを使用	1	0	リツキサン点滴静注:200mg Day1 生食注(大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
リウマチ科	IVCY(リウマチ)		1	0	グラセトロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 注射用エンドキサン 500mg(冷):750mg/m ² Day1 生食注(大塚) 500mL:1本 Day1

リウマチ科	レミケード (2回目以降)		1	0	レミケード点滴静注用 100mg:200m g Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
リウマチ科	レミケード (初回)		1	0	レミケード点滴静注用 100mg:200m g Day1 生食注 (大塚) 500mL:1本 Day1
リウマチ科	アクテムラ		1	0	アクテムラ点滴静注用 200mg/10mL:1m g Day1 アクテムラ点滴静注用 80mg/4mL:1m g Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
リウマチ科	Rituximab (10倍希釈) (BS)	Rituximab(BS)	1	0	リツキシマブBS点滴静注:375m g/m ² Day1 生食注:337.5m L/m ² Day1
リウマチ科	リツキサン(SSc)	イブプロフェンとメキタジンによる前処置あり	1	0	リツキサン点滴静注:375m g/m ² Day1 生食注:337.5m L/m ² Day1

リウマチ科	オレンシア		1	0	オレンシア点滴静注用 250mg:3V Day1 生食注 (大塚) 100mL:1本 Day1
リウマチ科	インフリキシマブBS (2回目以降)		1	0	インフリキシマブBS点滴静注用 100mg:200m g Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1
リウマチ科	ベリムマブ点滴静注	1回10mg/kgを初回、2週後、4週後に点滴静注し、以後4週間の間隔で投与。5歳以上。	1	0	ベリスタ点滴静注用 120mg (冷):10m g/kg Day1 注射用水 (大塚) 20mL:1A Day1 生食注 (大塚) バッグ 250mL:1袋 Day1