

内視鏡的胃粘膜切開剥離術（当日ESD）を受けられる患者様へ

内視鏡的胃粘膜切開剥離術(ESD)当日入院/パス【O2004-04】

患者氏名： _____様 入院病棟： _____病棟 主治医： _____ 受け持ち看護師： _____ No1

日付	／		／	／	／ ～ ／	／
入院日数	1日目		2日目	3日目	4～5日目	6日目
イベント	入院日：手術当日		手術後1日目	手術後2日目	手術後3～4日目	退院日
目標 毎日看護師 と 評価します	☐ 治療計画がわかる		☐ 手術後に腹痛、嘔気、出血がない ☐ 脈と血圧に変化がない ☐ 安静と水分・食事の制限を守ることができる		☐ 退院後の生活で守らなければ ならないことがわかる	
内服 注射	- 持参の内服薬を確認させていただきます - 抗凝固剤や血糖降下剤/インスリンなど を使用している方は申し出てください - 抗凝固剤を飲み続けていると手術ができ ません 		- 午前中に点滴の管を入れ、12時頃から点滴を 開始します。点滴は24時間実施します - 心臓病、高血圧、脳梗塞、喘息の薬を 内服している方は看護師にお伝えください - 胃薬が開始になります 		- 点滴があります (点滴は翌日の午後 まで24時間行い ます) - 点滴終了後、抜針します - 抗凝固剤を以前から内服している方は医師の 指示が出るまで内服はしないでください	
検査	・身長/体重を測定します 		・採血、腹部レント ゲンがあります 			
治療 処置	- ペースメーカーや体内金属/アレルギー がある方は申し出てください - 弾性ストッキングの準備(足のサイズを 測 ります)		- 検査着に着替えてお待ちいただきます - 終了後はベッドで病室に戻ります - 術前に弾性ストッキングを装着し、 術後の安静解除後に脱ぎます 		退院基準：出血がない	
食事 飲水	- 血糖降下剤は内服しないでください - 手術後3時間は絶飲食です - その後飲水/内服(抗凝固剤・糖尿病治療薬以外)の み可となります		検査結果により昼 食より重湯が開始 なります 		朝食より潰瘍食 3分粥になります (結果により変更に なるときは看護師 から説明します)	
	・水分（水、スポーツドリンク、お茶）は検査直前まで飲みます				- 術後3日目:潰瘍7分粥 - 術後4日目:全粥	
清潔	・シャワー浴ができます		・術後は必要に応じてタオルで身体を拭きます		・シャワー浴の許可が出ます 	
排泄			・手術後、便に血が混ざる、お腹が張る、痛みがある時はすぐにお知らせください			
安静 活動	・制限はありません		- 手術前:自由 - 手術後:3時間は床上安静です。尿意があるときは しびんや差し込み便器を使用しますので、お知らせ ください - その後よりトイレ/洗面のみ可となります - 初めて歩く時は看護師が付きそいますので、ナース コールでお知らせください		病棟内自由(検査結果を確認し医師の許可がある場合)	
説明 指導	- 同意書を提出してください - 入院診療計画書をお渡しします - 心臓病、高血圧、緑内障、前立腺肥大の ある方は申し出てください		- 手術に行く時は貴金属や入れ歯を外してください - 手術後にお腹の痛み、吐き気や便に血が混ざってい るときはすぐに看護師に知らせてください		手術後の便に血が混じる、お腹が張る、 痛みがある時には看護師に知らせてくだ さい	
					- 退院後の生活の注意につ いてお渡しするパンフ レットに沿って説明致し ます - 手術後の便に血が混じ る、お腹が張る、痛みが ある時には看護師に知ら せてください	
					- 次回受診予約票をお渡ししま す - 退院手続きが終了しましたら お知らせ致します 	

注）現時点で考えられる予定であり変更になることがあります