

脛骨骨幹部骨折～足関節骨折の治療を受ける患者様へ

脛骨骨幹部～足関節骨折パス（骨粗鬆症31日間入院）【11012-02】

日付	／	／	／	／ ～ ／	／ ～ ／	／ ～ ／
入院日数	1日目	2日目	3日目	4～9日目	10～24日目	25～31日目
イベント	入院	手術当日	手術後1日目	手術後2～7日目	手術後8～22日目	手術後23～29日目 退院
目標 <small>毎日看護師と評価します</small>	<input type="checkbox"/> 手術について理解ができる	<input type="checkbox"/> 安全な体位で過ごせる <input type="checkbox"/> 知覚障害がない <input type="checkbox"/> 創部に問題がない <input type="checkbox"/> 痛みがコントロールできる	<input type="checkbox"/> 安全な体位で過ごせる <input type="checkbox"/> 知覚障害がない <input type="checkbox"/> 車椅子に移乗できる <input type="checkbox"/> 創部に問題がない <input type="checkbox"/> 痛みがコントロールできる	<input type="checkbox"/> 安全な体位で過ごせる <input type="checkbox"/> 車椅子に移乗できる <input type="checkbox"/> 創部に問題がない <input type="checkbox"/> 痛みがコントロールできる	<input type="checkbox"/> 安全な体位で過ごせる <input type="checkbox"/> 車椅子に移乗できる <input type="checkbox"/> 創部に問題がない <input type="checkbox"/> 痛みがコントロールできる <input type="checkbox"/> 退院後の生活について理解できる	
内服 注射	内服薬がありましたら看護師へ渡してください 場合によっては看護師が配薬します 	点滴をします 				
検査			手術後1日目に採血があります	手術後3日目に採血があります 7日目に採血とレントゲンがあります 		
治療 処置		場合によって手術部位を冷やします フットポンプ、酸素マスクがついてきます		手術後2日目・4日目に傷を消毒します 手術後7日目に絆創膏がとれます	手術後8日目からご自身で傷の観察をします 	
食事 飲水	時から食べることはできません	時より飲んだり食べたりできません 	治療食や制限食の場合は看護師より説明があります			
清潔	シャワー浴をします 場合によっては身体を拭きます 		退院基準：補助具を使用して移動ができる			
排泄		尿を排泄する管が入ってきます				
安静 活動		安静にお過ごしください				
説明 指導	主治医、麻酔科医師、手術室看護師より説明があります 安静度や禁忌肢位について説明があります 必要物品：ストロー付きコップ、T字帯を準備してください					

注) 現時点で考えられる予定であり変更になることがあります