

リツキサン投与を受ける患者様へ

リツキサンパス（腎移植用）【29008-00】

患者氏名： _____ 様

入院病棟： _____ 病棟

主治医： _____

受け持ち看護師： _____

No1

	／ 1 日目 入院日	／ 2 日目 退院日
目標 毎日看護師と評価します	☐ 点滴治療中に副作用がない	☐ 退院後の生活の注意点が理解できる
内服 注射	☐ 治療開始30分前に副作用を予防するための薬（ロキソプロフェン1錠とフェキソフェナジン1錠）を内服します ☐ リツキサンの点滴をします 	
検査	☐ 採血をします ☐ 身長・体重を計ります 	
治療 処置	☐ 検査室もしくは病室で点滴の針を刺して、お薬を投与します。開始後1時間は心電図モニターを装着し、問題なければ外します ☐ 治療は約6時間かかります ☐ 副作用がないようであれば、終了後に針を抜きます	退院基準：副作用（発熱・動悸・発疹・頭痛）がない
食事 飲水	☐ 特に制限はありません	☐ 特に制限ありません
清潔	☐ 治療中、シャワー浴をすることができません。汗をかいたらタオルでお拭きします	☐ 入浴できます 
排泄	☐ 蓄尿は不要です	
安静 活動	☐ 治療中、副作用が出現しないようであれば活動に制限はありません	☐ 特に制限ありません
説明 指導	☐ 病棟案内をします ☐ 医師、薬剤師より投与するお薬についての説明があります ☐ 次回の予約票と診察券をお渡しします	☐ 退院後の注意点について説明いたします ☐ 退院精算が終わりましたら、担当者よりお知らせいたします 

注) 現時点で考えられる予定であり変更になることがあります