

内視鏡的食道粘膜切開剥離術(当日入院ESD)を受けられる患者様へ

内視鏡的食道粘膜切開剥離術(ESD)当日入院パス【02006-03】

患者氏名：_____様 入院病棟：_____病棟 主治医：_____ 受け持ち看護師：_____ No1

日付	/	/	/	/ ~ /	/
入院日数	1日目 入院日粘膜切除当日	2日目	3日目	4~6日目	7日目
イベント	・治療計画がわかる ・心臓病、高血圧、脳梗塞、喘息の薬を内服している方は朝6時に少量の水で内服してください ・血糖降下剤を飲んでいる方は内服しないでください ・抗凝固剤や血糖降下剤・インスリンなどを使用している方は申し出て下さい。抗凝固剤を飲み続けていると手術ができません	・術後に腹痛、嘔気、出血がない ・脈と血圧に変化がない ・安静と水分・食事の制限を守ることができます	・腹痛・嘔気・出血なく過ごす事ができる ・脈と血圧に変化がない ・安静と水分・食事の制限を守ることができます	・退院後の生活で守らなければならないことがわかる	
内服 注射	・持参の内服薬を確認させていただきます ・点滴の針挿入し、12時前後より点滴開始し ・点滴は24時間行います ・胃薬が開始になります 	・点滴は翌日の午後まで24時間行います ・抗凝固剤を以前から内服している方は医師の指示が出るまで内服はしないで下さい 	・点滴終了後抜針します ・糖尿病治療薬、抗凝固薬の開始は医師の指示が出てからになります	・糖尿病治療薬、抗凝固薬の開始は医師の指示が出てからになります	退院基準：出血がない 
検査		・身長/体重測定を測定します 	・採血、胸部レントゲンがあります  		
治療 処置	・ペースメーカーや体内金属/アレルギーがある方は申し出て下さい	・弾性ストッキングの準備をします(足のサイズを測ります) ・検査着に着替えてお待ちいただきます。弾性ストッキングを履くをお手伝いさせていただきます ・終了後はストレッチャーで病室に戻ります			
食事 飲水	・前日21:00以降医師の許可があるまで絶食です  ・水分(水、スポーツドリンク、お茶)は検査直前まで飲めます	・手術後3時間は絶飲食です ・その後飲水/内服(抗凝固薬、糖尿病治療薬以外)のみ可となります	・検査結果により朝食から重湯が開始になります	・昼食から漬瘍食5分粥になります(結果により変更になるときは看護師から説明します)	・術後3日目:漬瘍7分粥 ・術後4日目:米飯
清潔	・手術前まで制限はありません	・術後は必要に応じてタオルで身体を拭きます	・シャワー浴の許可が出ます 		
排泄		・手術後、尿意があるときはしふんや差し込み便器を使用しますので、お知らせ下さい ・手術後、便に血が混ざる、お腹が張る、痛みがある時はすぐに看護師にお知らせ下さい	・手術後、便に血が混ざる、お腹が張る、痛みがある時はすぐに看護師にお知らせ下さい		
安静 活動	・手術前まで制限はありません	・手術後、3時間は床上安静です その後よりトイレ/洗面のみ可となります 初めて歩く時は看護師が付きそいますので、ナースコールでお知らせ下さい	・棟内自由 (検査結果を確認し医師の許可があれば)		・術後5日目～院内自由
説明 指導	・診断書が必要な方は、1階の文書センターで依頼して下さい ・心臓病、高血圧、緑内障、前立腺肥大のある方は申し出て下さい	・同意書を提出して下さい。入院診療計画書をお渡しします ・手術に行く時は貴金属や入れ歯を外してください ・手術後にお腹の痛み、吐き気や便に血が混ざっているときはすぐに看護師に知らせてください	・手術後の便に血が混じる お腹が張る、痛みがあるときには看護師に知らせてください	・退院後の生活の注意についてお渡しするパンフレットに沿って説明致します ・手術後の便に血が混じる、お腹が張る、痛みがあるときには看護師に知らせてください	・次回受診予約票をお渡しします ・退院手続きが終了しましたらお知らせ致します 

注) 現時点での考え方であり変更になることがあります

市立札幌病院 消化器内科・6階東病棟 2015年11月作成 2024年9月改訂