



札幌市 医療福祉マップ

白石区 豊平区



【 いつもと違う頭痛 】

今までに経験したことのないような激しい頭痛で嘔気、嘔吐を伴う場合は、くも膜下出血の可能性があります。即刻、専門の医療機関での受診が必要です。また、高熱や麻痺を伴ったり、呂律困難となった場合も、直ちに医療機関に相談してください。一瞬のためらいが手遅れをもたらす可能性があります。

はせがわ内科クリニック
Hasegawa internal medicine clinic 院長 長谷川浩一

診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00~12:00			●			●
9:00~12:30	●	●		●	●	
14:00~17:30	●	●	—	●	●	—
17:30~19:00	—	—	—	—	●	—

休診日 日曜・祝日
 受付時間 午前9時00分~12時20分 午後14時00分~17時20分
 金のみ 午後14時00分~18時50分
 水・土のみ 午前9時00分~11時50分

札幌市豊平区月寒西4条10丁目7-17
 TEL (011) 851-0610
www.k-hasegawa-clinic.com

内科・小児科
小笠原医院
 院長/柳田 康博

診療時間	月	水	金	土	日	祝
月・水・金 / 9:00AM~6:00PM	●	●	●	●	●	●
火・木・日 / 9:00AM~5:00PM	●	●	●	●	●	●
土 / 9:00AM~12:00PM	●	●	●	●	●	●
休診	—	—	—	—	—	—

札幌市豊平区平岸2条5丁目1-13
 TEL (011) 812-1788 FAX (011) 814-5888
www.ogasawara-clinic.com/
 ●地下鉄南北線「平岸」駅1番出口より徒歩5分 ●駐車場:7台
 ●各種クレジットカード利用可

医療マップ等



※この見開きは広告掲載ページです

恵佑会札幌病院



診療科目

外科 呼吸器腫瘍内科 腫瘍整形外科 放射線治療科 矯正歯科 呼吸器外科
形成外科 緩和ケア内科 頭頸部外科 気管食道外科 腫瘍内科 耳鼻咽喉科
麻酔科(小村好弘) 放射線診断科 病理診断科 歯科口腔外科
歯科 消化器外科 乳腺外科 泌尿器科 心療内科・精神科
消化器内科 循環器内科 アレルギー科

TEL 011-863-2101(代)

札幌市白石区本通9丁目南1番1号

ホームページはこちらから →



恵佑会第2病院



診療科目

内科
消化器内科
放射線診断科

TEL 011-863-2111(代)
札幌市白石区本通13丁目北7番1号

ホームページはこちらから →



社会医療法人 柏葉会

札幌柏葉会病院

SAPPORO HAKUYOKAI HOSPITAL



診療科

脳神経外科 脳神経内科 循環器内科
リハビリテーション科 放射線科 麻酔科
耳鼻咽喉科

外来治療

脳血管外科外来治療 血管内治療外来治療
顔の痛みとけいれん外来治療 ふるえの外科外来治療

部門

脳血管外科部門 脳血管内治療部門
脳医療研究部門 FUS(集束超音波)部門



ホームページ

〒062-0931 札幌市豊平区平岸1条12丁目1-25

代表 ☎011-876-9100 患者支援部門 ☎011-598-1777



かわしば記念クリニック(P57)の脳ドックは、
札幌柏葉会病院と連携しています

医療法人社団 南郷通り整形外科

理事長/院長 医学博士 杉本 禎志

診療科目 整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科

診療時間

	午前	昼休	午後
月・金	8:30~12:00	昼休	13:30~18:00
火・水	8:30~12:00	昼休	13:30~17:00
木・土	8:30~12:00	休	診

休診日/日曜日・祝日

〒003-0023

札幌市白石区南郷通8丁目北1-33

☎011-866-3555

<https://www.nangou-seikei.com>

いなとみ眼科 INATOMI EYE CLINIC

診療時間	月	火	水	木	金	土
9:00~12:00	○	○	○	○	○	※
14:00~18:00 受付時間17:30まで	○	/	★	○	○	/

★ 水曜のみ18:30まで(受付時間18:00まで) 休診日 火曜・日曜・祝日
※ 土曜は、第1、第3、第5の9:00~12:00診療 第2・第4土曜


〒062-0931 札幌市豊平区平岸1条12丁目1-30
メディカルスクエア南平岸1F

TEL.011-827-6632



歯周病とは?

健康な状態 ← 歯周病にかかった状態 →



▶ 歯に食べ物のカスが残っていると菌が繁殖して歯垢(プラーク)や歯石となり、歯周病菌の温床となる。

▶ 歯周病菌が原因で歯肉が腫れると、歯と歯ぐきの間に隙間(歯周ポケット)ができ、そこにさらにプラークが入り込んで歯肉が化膿する。

▶ 悪化すると歯を支える骨(歯槽骨)が溶けて歯がぐらつくようになり、最後には歯が抜けてしまう。

【歯周病は日頃の予防と、早期発見・早期治療が肝心です。】

日本人が歯をなくす原因は、20歳前後までは虫歯が圧倒的。しかし40歳くらいから歯周病(歯肉炎や歯周炎)が原因となるケースが急増します。歯をなくす原因の9割が虫歯と歯周病ですが、歯周病は全体の半数以上を占めています。日本では歯周病の罹患率は非常

に高く、なんと成人の約8割以上が罹患しているといえます。しかし、歯周病は虫歯と違ってあまり痛みがないため、気づいたときには手遅れになりがち。ですから、日頃からきちんとケアして予防することが大切なのです。

